SMITHSONIAN
LIBRARY

SMITHSONIAN INSTITUTION THE LIBRARY

SMITHSONIAN INSTITUTION THE LIBRARY

20 Scherdlin

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE

DE

COLMAR

NOUVELLE SÉRIE. — TOME XV.

1918 — 1919

1920

Bibl. Ste.
H.N. Colmar

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE

DE

COLMAR

NOUVELLE SÉRIE. — TOME XV.

1918 — 1919

COLMAR
IMPRIMERIE DECKER
1920

QL
591
F8S3
V.11
ENT.

DEUXIÈME SUPPLÉMENT

AU

CATALOGUE

DES COLÉOPTÈRES

DE

LA CHAINE DES VOSGES

ET DES

RÉGIONS LIMITROPHES

PAR

PAUL SCHERDLIN

Officier de l'Instruction publique,

Conservateur-adjoint au Musée zoologique de l'Université et de la Ville de Strasbourg,

Lauréat de la Société entomologique de France,

Membre a vie des Sociétés zoologique de France, Royale zoologique, et entomologique de Belgique,

Membre correspondant de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France,

Membre de la Société d'histoire naturelle de Colmar, de l'Association philomathique d'Alsace et de Lorraine.

A LA MÉMOIRE

DE

L'ABBÉ LÉON VOUAUX

Agrégé de l'Université,

Professeur au Collège de La Malgrange,

Membre de la Société entomologique de France.

ASSASSINÉ PAR LES ALLEMANDS A JARNY
LE 26 AOUT 1914.

L'Abbé Léon VOUAUX

ENTOMOLOGISTE FRANÇAIS

(1870 — 1914)

L'Abbé Léon VOUAUX

Le 26 août 1914, à Jarny (arrondissement de Briey), sans enquête, sans jugement, sans motif juridique, les Allemands fusillaient, avec 24 autres innocents, M. l'abbé Léon Vouaux, agrégé de l'Université, professeur de première au collège de La Malgrange.

Depuis trois semaines il remplaçait son frère dans la direction de la paroisse, prêchant à tous la confiance patriotique mais aussi la prudence vis-à-vis de l'ennemi, relevant le « moral », mais mettant en garde contre une dangereuse et inutile surexcitation. Si c'est là un crime, qu'on cite le code où il est catalogué !

Mais il fallait terroriser les pays envahis ! Et ce savant pacifique tomba victime d'un système qui soulève la réprobation de tout cœur droit, de toute conscience bien formée.

L'abbé Léon Vouaux, né le 25 février 1870 à Baccarat (Meurthe), professeur depuis 1892, après avoir longtemps accumulé les matériaux, commençait à publier les résultats de son travail intense.

En 1913, c'était, dans la collection des *Apocryphes du Nouveau Testament*, une étude sur *Les Actes de Paul*, in-8° de 384 pages sur *l'Une des légendes par lesquelles l'imagination populaire tenta dès le* 11e *siècle d'embellir la vérité*. [1]

En 1914, au moment de la déclaration de guerre par l'Allemagne, une autre étude sur *Les Actes de Pierre* était sous presse.

Dans le vaste domaine des sciences naturelles l'abbé Léon Vouaux avait déjà tracé son sillon. Son labeur *myco-*

[1] Cf. *Rapport sur les concours de l'année* 1915, par M. Etienne Lamy, secrétaire perpétuel de l'Académie française, lu dans la séance publique annuelle du 25 nov. 1915.

logique est condensé dans le *Synopsis des Champignons parasites des Lichens*, parue en 7 fascicules, comprenant ensemble 373 pages, de 1912 à 1914, dans le *Bulletin de la Société mycologique de France*. Le tome XXXI de ce Bulletin publie, sous la signature de M. P. Villemin, correspondant de l'Institut, une notice à laquelle j'emprunte les renseignements suivants :

« Ame paisible, ignorant la malice des hommes, l'abbé Léon Vouaux n'avait ambitionné, ni le laurier des héros, ni la palme des martyrs, ni la gloire des savants. Satisfait d'une existence modeste, il partageait son temps entre l'enseignement et les études propres à élever plus haut son esprit avide de vérité. Il est mort comme il a vécu, simplement, sans peur et sans reproche.

« L'abbé Vouaux avait coutume de passer les vacances auprès de son frère, M. le curé de Jarny. Lors de la mobilisation, il resta seul pour se consacrer au ministère de la paroisse. Bientôt l'envahisseur occupait la région et décidait la mort du curé de Jarny. Pourquoi ? Prétendait-il étonner les populations par une action d'éclat ? Voulait-il, par un exemple frappant, démontrer qu'il existe des surhommes bien au-dessus des sentiments d'humanité ? L'âme française, l'âme humaine ne parvient pas à comprendre de tels calculs. Innocente victime, notre confrère tendit sa généreuse poitrine aux balles destinées à son frère. L'exemple était donné. La conscience des peuples l'a déjà jugé.

L'abbé Vouaux avait beaucoup observé, beaucoup comparé, beaucoup compulsé les auteurs ; mais s'il élargissait indéfiniment, par un travail acharné, le champ de ses connaissances, il sut se soustraire à la décevante variété des publications hâtives. C'est seulement en 1912 que paraissent coup sur coup des œuvres de large envergure, dénotant un esprit en pleine maturité, rompu aux disciplines les plus variées.

Le nom de Vouaux n'était pas jusqu'alors inconnu des spécialistes. Depuis 1909 il est souvent cité dans les *Notes lichnélogiques* parues dans le *Bulletin de la Société botanique de France*. Il communiquait libéralement ses trouvailles à ceux qu'il appelait ses maîtres et accompagnait ses envois de remarques judicieuses montrant qu'il était passé maître à son tour. Aussi se vit-il confier par de nombreux correspondants le soin de déchiffrer les formes litigieuses qu'il était le plus apte à classer méthodiquement. L'abbé Vouaux était prêt à tirer le meilleur parti du riche matériel qui venait sans cesse accroître le produit de ses recherches assidues. Il avait en effet le rare avantage de connaître également bien les Lichens et les Champignons, deux groupes dont chacun suffit à défrayer l'activité d'une vie entière.

Une grande prudence est apportée dans les rectifications que les faits nouveaux imposent à la classification. L'abbé Vouaux adopte celle qui lui semble *la moins mauvaise*, montrant une fois de plus que l'esprit français, le premier ouvert à toutes les innovations, est le dernier à rompre avec les traditions. »

M. Villemin, dont je viens de citer la parole, conclut ainsi : « Les éminentes qualités reflétées dans le *Synopsis* permettent d'inscrire le nom de Léon Vouaux sur la liste des grands botanistes dont s'honore la science française. Devant cette figure modeste, nimbée de la gloire du héros et du martyr, nous nous inclinons avec un profond respect. »

A son tour *l'entomologie* n'aurait pas tardé à enregistrer ce même nom. Déjà l'abbé Vouaux avait collationné tout ce que les revues françaises, anglaises, italiennes, russes et allemandes (il lisait couramment ces langues, ainsi que l'espagnol et l'arabe), ont publié sur les *Cétonides*. Et la révision de ce groupe difficile devait occuper le repos des vacances de 1914. Bon nombre de ces notes

ont par malheur disparu dans le pillage du presbytère de Jarny.

Faut-il remarquer que le *Catalogue Bourgeois* avec ses *Suppléments* indiquent d'heureuses recherches des abbés L. et A. Vouaux ? Grâce à elles la faune de la Lorraine a été augmentée de beaucoup d'espèces et variétés nouvelles dont la présence en cette région fut signalée ou confirmée.

Mais plus encore que le savant les amis de l'abbé L. Vouaux regrettent en lui l'homme au commerce aimable, à l'attachement sûr et discret, à la complaisance inlassable. Hélas ! il n'est plus avec eux. Une mort brutale est venue tarir dans sa source une production des plus fécondes. Mais il a reçu du juste Juge des récompenses meilleures que celles qui l'attendaient ici-bas, car selon les termes mêmes de M. Étienne Lamy, « sa vie de 44 ans s'étendit comme un signe de paix entre deux dates de guerre, et il mourut de la haine que soulève chez les Allemands le patriotisme des prêtres français ».

PRÉFACE.

Mes nombreux collègues et amis seront certainement étonnés de me voir publier un deuxième Supplément au *Catalogue des Coléoptères de la Chaîne des Vosges et des régions limitrophes*. Après les difficultés que me causa la publication du premier Supplément (Fascicule X) et dont l'impression dura, par suite de la guerre, plus de deux ans, j'ai longtemps hésité à publier ce volume. Si je me suis néanmoins décidé à le faire, deux raisons en sont la cause. Ce sont d'abord les nombreuses et précieuses notes que m'ont envoyées mes savants collègues :

M. l'abbé A. Vouaux, curé de Jarny,

M. J. Sainte-Claire Deville, lieutenant-colonel d'artillerie, actuellement directeur des laboratoires d'essais mécaniques de l'Administration française des Mines de la Sarre, à Sarrebruck,

M. E. de Brunnier, capitaine auprès de l'état-major de la 4e brigade de dragons, à Metz,

M. L. Host, commis principal des postes et télégraphes à Nancy.

La deuxième raison d'avoir publié ce fascicule sont les nombreuses captures faites en Alsace par le naturaliste Bodo de Bodemeyer, qui en 1917 était attaché à l'Institut bactériologique de l'Université de Strasbourg. Parmi les sept mille coléoptères pris par lui se trouve une série d'espèces nouvelles ou très rares pour nos régions. Le tout était destiné au Musée zoologique de Berlin, les *Staphylins* furent déterminés par M. Bernhauer et les autres familles par M. Fleischer, deux autorités bien connues. Au dernier moment je suis arrivé à décider M. de Bodemeyer de ne pas vendre sa riche récolte de coléoptères alsaciens au Musée de Berlin. Il me la céda, et elle fut incorporée dans ma collection devenue depuis la propriété du Musée de Strasbourg.

Les notes que M. l'abbé A. Vouaux a bien voulu me faire parvenir se rapportent en grande partie aux captures et observations de M. l'abbé L. Vouaux, agrégé de l'Université et professeur au Collège de La Malgrange, dont la collaboration aux fascicules précédents m'a été si précieuse et si utile. Lorsque j'appris (en novembre 1918 !) la mort du distingué entomologiste, fusillé et *achevé à coups de crosse et de talon*, ce fut pour moi un devoir sacré de publier ses notes et de les dédier à la mémoire du grand savant mort en héros pour la patrie. Je prie M. l'abbé A. Vouaux, le frère éprouvé du regretté défunt, de ne voir dans cette modeste dédicace qu'une faible marque de reconnaissance envers mon excellent collègue et collaborateur, qui a facilité ma tâche d'une manière si remarquable et auquel je dois une profonde gratitude.

Je tiens également à exprimer mes remerciements les plus cordiaux à MM. J. Sainte-Claire Deville, E. de Brunnier et L. Host, qui s'intéressent tant à notre faune et qui m'ont amplement aidé de leurs remarquables observations. Des renseignements utiles et intéressants m'ont aussi été fournis par MM. F. Gruardet, colonel d'artillerie à Gien, J. Kraencker, professeur de sciences naturelles au Lycée Kléber, A. Burr, conservateur-adjoint au Musée zoologique, M. Klein, rédacteur à la Préfecture du Bas-Rhin, T. Boehé, étudiant en chimie à Strasbourg, et je considère comme un devoir de les remercier vivement de leur précieuse collaboration. Je dois aussi particulièrement mentionner avec reconnaissance M. le docteur A. Sicard, médecin-chef du secteur de Colmar, qui a bien voulu vérifier les Coccinelles de ma collection.

Strasbourg, le 1er mars 1920.

Paul Scherdlin

Abréviations :

Bod. = B. de Bodemeyer
Sch. = P. Scherdlin

Les noms précédés d'une * se rapportent à des espèces ou à des variétés non citées dans les fascicules précédents ou à des espèces ou variétés nouvelles pour la région.

CICINDELIDAE

Cicindela L.

SILVATICA L. — Saverne : au-dessus d'Otterstal ; Karlsprung, fin mai (Klein) ; côte de l'Elsberg, près de Saint-Nabor ; Sainte-Odile (Bod.).

SILVICOLA Latreille. — Côte de l'Elsberg, un ind. (Bod.). — La présence de cette espèce en Alsace est par conséquent confirmée, et les anciennes citations de Kampmann, Wencker et Claudon ainsi que celles de Sommereau ne paraissent pas invraisemblables. — Les exemplaires dans ma collection, obtenus jadis du pasteur Blind et étiquetés *Saverne*, proviennent des chasses du capitaine Giebeler (Cf. Suppl. I, p. 6).

HYBRIDA v. RIPARIA Latr. — Saverne, en forêt dans les chemins, fin mai (Klein).

CARABIDAE

CARABINI

Calosoma Weber

INQUISITOR L. — Strasbourg : forêt de la Robertsau, en nombre sur les chênes en mai (Klein) ; maison forestière de Baerenbach, près de Stambach (Host). — Epinal ; Sainte-Barbe (id.).

Carabus L.

Procrustes Bon.

CORIACEUS L. — Partout, jusqu'au sommet des Vosges, toujours épars. Sommet du Fayet, toute l'année. Pas de variations sensibles avec l'altitude (de Brunier).

Megodontus Sol

VIOLACEUS v. PURPURASCENS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.) ; Moulin de Donnenbach, près de Tiefenbach ; Zittersheim, fin mai (Kraencker) ; environs de Dabo et de La Hub (Host) ; Hœrdt ; Brumath ; Barr ; Guebwiller (Sch.). — Plateau d'Amance ♂ ♀ en juillet (Vouaux) ; Gérardmer ; Kichompré ; Le Rudlin (de Brunier).

Mesocarabus Thoms.

CATENULATUS Scop. — Molkenrain, à 1.100 d'altitude (Gruardet).

Chaetocarabus Thoms.

INTRICATUS L. — Zeinheim ; Mutzig ; Schirmeck ; Saint-Nabor (Sch.) ; Saverne : au-dessus d'Otterstal, sous des pierres, fin mai (Klein) ; Ranspach, près de St-Amarin janvier-février, dans la mousse au pied des chênes ; Kichompré, dans une souche de pin, en septembre (de Brunier).

Pseudocechenus Moraw.

IRREGULARIS F. — Molkenrain ; Ranspach (Gruardet) ; Donon; Hohneck; Metzeral (Sch.).

* v. BUCEPHALUS Kr. — Metzeral, un ind. ♀ (Sch.).

Chrysocarabus Thoms.

AURONITENS v. PERVIRIDIS Reitt. — Sommet du Hohneck en août ; Kichompré, dans une souche de sapin (de Brunier).

v. IGNIFER Haury. — Saverne ; Willgottheim (Sch.) ; mélangé au type et abondant dans les vieilles souches des bois à l'est de la Largue, tout l'hiver. Tranchées de Fulleren, de décembre à mars ; bois de Saint-Ulrich ; tranchées de Schœnholz, en novembre et décembre. — Ne semble pas avoir souffert des bombardements par obus toxiques (de Brunier).

Autocarabus Seidl.

* AURATUS v. BRULLEI Géh. — Entre-deux-Eaux, près de Saint-Dié, un ind. (de Brunier). [1]

v. LOTHARINGUS Dej. — Donon, versant sud-ouest, près de Grandfontaine (Sch.).

v. AURATOIDES Reitt. — Epinal (Host).

Carabus Thoms. s. str.

GRANULATUS L. — Strasbourg : La Robertsau, dans les souches de saules et dans le terreau, en hiver. Idem, en avril, au bas des murailles et grimpant jusqu'à une certaine hauteur (Klein) ; Saverne ; Zeinheim ; Haguenau ;

1 Dessus vert ou vert-bleu doré ou comme saupoudré de métal grossièrement pulvérisé. Tête et pronotum vermiculés-ridés. Elytres mats à ponctuation très fine et transversalement ridés. Les rides plus ou moins visibles sur les côtes et dans les intervalles. — M. E. Barthe (« Tableaux analytiques pour la détermination des Carabides de la région Franco-Rhénane », *in Miscellanea Entomologica*), fait remarquer que beaucoup d'entomologistes considèrent BRULLEI comme une forme anormale due à un froissement ou à un arrêt pendant le développement de la pupe ; les particularités qui caractérisent cet insecte sont souvent accompagnées d'autres déformations, telles que l'écartement des élytres, l'asymétrie du pronotum, etc. Mais d'autre part M. Barthe a constaté l'accentuation des rides du pronotum et des élytres chez des exemplaires absolument normaux ; il s'agit là de variations individuelles sans grande importance. Quand on trouve la forme BRULLEI, elle représente toujours une proportion assez considérable des individus, ce qui indiquerait la tendance à la formation d'une race. — Cette forme est très répandue depuis Lyon jusqu'à Epinal. On la rencontre également dans les Pyrénées.

Mutzig; Grendelbruch; Trois-Epis (Sch.); Muttersholz (Kraencker). — Laitre-sous-Amance (Vouaux) ; Charmois-l'Orgueilleux (Host).

v. RUBRIPES Géhin. — Strasbourg : La Robertsau, avec le type, mais plus rare (Klein) ; Saverne ; Schirmeck (Sch.).

CANCELLATUS Illig. — Mandray ; Etueffont, à découvert, au printemps, le long des talus et chemins où persiste la fraîcheur ; Tendon ; Laveline-du-Houx ; Grandvillars, en hiver, sous les écorces, sous la mousse au pied des arbres ou sur les rochers ; Froide-Fontaine, un ex. dans un nid de taupe, en janvier. — C'est le type qu'on rencontre en Lorraine comme en Alsace. Les épaules sont nettement crénelées ; la race est de taille plus robuste que dans le reste de la France (de Brunier) ; Laitre-sous-Amance, ♂ ♀ (Vouaux).

v. FEMORALIS Géhin. — En compagnie du type et aussi répandu (de Brunier).

ARVENSIS Herbst. — Saverne et environs, en forêt, dans les chemins, fin mai (Klein).

v. RUFICRUS Géhin. — Col de la Schlucht; Hohneck (Sch.). — Fulleren; Saint-Ulrich; Grandvillars (de Brunier).

v. SEILERI Heer. — Lac Blanc (Sch.). — Gérardmer; Kichompré; Le Rudlin (de Brunier).

v. SILVATICUS Dej. — Grendelbruch; Rothau; Orbey; Lac Blanc (Sch.). — Bains-les-Bains; forêt d'Uriménil (de Brunier).

v. ALPICOLA Heer. — Schneeberg ; Col de la Schlucht ; Hohneck; Rossberg (Sch.).

MONILIS v. INTERPOSITUS Géhin. — Moulin de Donnenbach (Kraencker).

v. CONSITUS Panz. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

NEMORALIS Müll. — Tendon, en février, des exemplaires à élytres presque noirs et à bordure bleue ou vert-bleue (de Brunier).

GLABRATUS Payk. — Saverne, en septembre; Aubure, mi-août (Boehé); Munster; Orbey (Sch.). — Dans les sapinières, de mai en septembre. Col de Sainte-Marie-aux-Mines; tête de Béhouille; Gérardmer; Mandray; Le Rudlin (de Brunier).

* CONCOLOR F. — Ballon de Guebwiller, forme typique (Sch.).

V. SILVESTRIS Panz. — Saverne; Grendelbruch (Sch.).

CONVEXUS F. — Strasbourg : au Polygone, fin avril (Klein). Saverne; Blaesheim; Molsheim (Sch.). — Kichompré, en août. Plus sombre et plus petit que la race de plaine (de Brunier).

Cychrus F.

ROSTRATUS L. — Saverne : près du Haut-Barr; Zeinheim; Brumath; Reichstett; Heiligenberg (Sch.). — Cleurie; Tendon; Etueffont, dans les souches (de Brunier); Molkenrain (Gruardet).

* V. CONVEXUS Heer. — Xonrupt : vers la côte 800 entre Gérardmer et Retournemer, deux ind. dans un pré marécageux en août (de Brunier).

ATTENUATUS F. — Saverne : vallée de Baerenbach; Schweizerhof, sous les pierres (Klein, Boehé); col de la Schlucht, versant est (Sainte-Claire Deville); Lac Blanc (Sch.). — Etueffont; Cleurie. Plus rare et plus estival que ROSTRATUS. Aux premières chaleurs on le trouve immobile sur la mousse, au pied des parois rocheuses d'où suinte l'eau. Aussi dans les souches, mais seulement dans les grands bois (de Brunier).

* V. INTERMEDIUS Heer. — Longemer, en abondance sur la rive droite de la Vologne; Le Rudlin, en août et septembre. Particulièrement abondant après la pluie, sous les petites pierres, dans les chemins ravinés des sapinières (de Brunier).

NEBRIINI

Leïstus Froelich

SPINIBARBIS F. — Strasbourg : Jardin botanique (Burr); id., forêt de La Robertsau (Sch.); La Wanzenau (id.); Achenheim (Bod.); Saverne : maison forestière de Haberacker (Sch.).

FERRUGINEUS L. — Strasbourg : La Robertsau, sous les écorces de saules, en hiver; id., Ile des Epis (Klein); Achenheim (Bod.); Plobsheim (Sch.).

RUFESCENS F. — Hoenheim, en nombre sur des poutres vermoulues et en partie pourries (Bod.).

Nebria Latr.

LIVIDA L. — Strasbourg : La Robertsau, six ind. sous deux pierres voisines, en mai 1916. Depuis je n'ai plus trouvé cette rarissime espèce (Sch.).

Notiophilus Duméril

PUSILLUS Waterh. — Forêt de Brumath, un ind. en mai (Sch.).

HYPOCRITA Putz. — Crête du Hohneck (Sainte-Claire Deville).

QUADRIPUNCTATUS Dej. — Ottrott (Bod.).

OMOPHRONINI

Omophron Latr.

LIMBATUM F. — Strasbourg : La Robertsau, dans les gravières en mai (Klein); Hoenheim, bord du canal sur de la vase (Sch.). — Messein, bords de la Moselle (Vouaux).

ELAPHRINI

Blethisa Bonelli

MULTIPUNCTATA L. — Dieuze, dans les terrains salifères (Sch.).

Elaphrus Fabr.

ULIGINOSUS F. — Muttersholz (Kraencker); Brumath (Sch.).

CUPREUS Duft. — Saverne : vallée de Baerenbach. — Rives du Lac de Longemer (Host).

RIPARIUS L. — Plobsheim, bords du Kraft-Bach (Sch.). — Nancy, bords de la Meurthe (Host).

AUREUS Müll. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

LOROCERINI

Lorocera Latr.

PILICORNIS R. — Ottrott; Achenheim (Bod.); Hohneck; Rothau; Lac Blanc (Sch.). — Saint-Georges (Vouaux); Bouzey (Host).

SCARTINI

Dyschirius Bonelli

NITIDUS Dej. — Marsal, mares salées, en mai (Vouaux).

* PUSILLUS Dej. — Klingenthal, plusieurs ind. (Bod.).

Clivina Lat.

COLLARIS Herbst. — Hoenheim (Bod.); Dingsheim; Reichstett (Sch.). — Raon-l'Etape, bords de la Meurthe (Vouaux); Grands-Sables, près d'Epinal (Host).

BROSCINI

Broscus Panz.

CEPHALOTES L. — Achenheim (Bod.). — Messein, en juin (Vouaux).

BEMBIDIINI

Tachypus Lap.

CARABOIDES Schrnk. — Stambach, bords du Baerenbach (Sch.).

FLAVIPES L. — Achenheim, bords du canal de la Bruche (Bod.); Muttersholz (Kraencker). — La Malgrange, en juillet (Vouaux).

Bembidion Latr.

Bracteon Bed.

LITORALE Oliv. — Strasbourg : Ile des Epis (Sch.); Achenheim (Bod.). — Messein, en avril (Vouaux).

Metallina Motsch.

V. PROPERANS Steph. — Hoenheim; Achenheim (Bod.); Fischerinsel (Sch.).

Princidium Motsch.

PUNCTULATUM Drap. — Messein, en mai (Vouaux).

Testedium Motsch.

BIPUNCTATUM L. — Epinal, rive de la Moselle, un ex. (Host).

Peryphus Steph.

ATROCOERULEUM Steph. — Messein, bords de la Moselle, dans des débris, en mars (Vouaux).

* REDTENBACHERI K. Dan. — Cleurie; Kichompré; Mandray (de Brunier).

FLUVIATILE Dej. — A rayer de notre faune jusqu'à plus ample informé (Suppl. I, p. 19). C'est une espèce essentiellement maritime (Com. de M. René Oberthür). — Il se pourrait, néanmoins, que les individus signalés de Metz par Géhin et ceux du Musée de Strasbourg étiquetés *Alsace* proviennent des *terrains salifères* de Dieuze, où l'on rencontre une série d'insectes maritimes.

ANDREAE v. DISTINGUENDUM Duv. — Strasbourg : La Robertsau (Kraencker).

v. FEMORATUM Strm. — Achenheim, bords du canal de la Bruche, en grand nombre (Bod.).

RUPESTRE L. — Strasbourg : au Wacken, deux ind. (Sch.). — Epinal, rive de la Moselle (Host).

LUNATUM Duft. — Strasbourg : Jardin botanique (Sch.). — Epinal, rive de la Moselle (Host).

Synechostictus Motsch.

RUFICORNE Strm. — Ottrott (Bod.). — Epinal, rive de la Moselle (Host).

ELONGATUM Dej. — Etival, en mai (Vouaux).

Emphanes Motsch.

MINIMUM F. — Marsal, dans les mares, en mai (Vouaux).

Lopha Steph.

QUADRIGÚTTATUM F. (*quadripustulatum* Serv.). — Strasbourg : forêt du Neuhof; Achenheim (Bod.). — Laitre-sous-Amance, en avril (Vouaux).

* v. Illigeri Net. — Achenheim, plusieurs ind. (Bod. Netolitzky *det.*).— Cf. *Koleopterolog. Rundschau*, Wien, Band 7 n° 3/8, 1918 : Dr Joseph Muller, *Bestimmungstabellen der Bembidion-Arten Europas und des Mittelmeergebietes.*

quadrimaculatum L. — Strasbourg : Jardin botanique (Burr); Rouffach (Sch.). — Environs de La Malgrange, en avril (Vouaux).

gilvipes Strm. — Laitre-sous-Amance, bords de l'Amezule, en avril (Vouaux); Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

Schueppeli Dej. — Ottrott (Bod.).

Trepanes Motsch.

Doris Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.); Achenheim, bords du canal de la Bruche (Bod.).

octomaculatum Goeze. — Nancy, bords de la Meurthe, en avril (Vouaux).

Phyla Motsch.

obtusum Serv. — Achenheim; Ottrott (Bod.); Rouffach (Sch.). — Nancy, bords de la Meurthe, en avril (Vouaux); Froidefontaine, en janvier et décembre (de Brunier).

Philochthus Steph.

Mannerheimi Sahlb. — Klingenthal (Bod.). — Gérardmer; Froidefontaine, en décembre (de Brunier).

lunulatum Fourcr. — Nancy (Vouaux).

Ocys Steph.

HARPALOIDES Serv. — Messein, dans des débris (Vouaux).

QUINQUESTRIATUS Gyllh. — Laitre-sous-Amance, dans le jardin du presbytère, en octobre (Vouaux).

Tachys Steph.

* SEXTRIATUS Duft. (*angustatus* Dej.). — Etueffont, en avril (de Brunier).

QUADRISIGNATUS Duft. — Moulin de Donnenbach (Kraencker). — Messein, bords de la Moselle, en mars (Vouaux).

PARVULUS Dej. — Saint-Nabor (Bod.). — Messein, bords de la Moselle, dans des débris, en mars et avril (Vouaux).

BISTRIATUS v. GREGARIUS Chaud. — La Malgrange; Messein, avec les précédents (Vouaux).

TRECHINI

Trechoblemus Ganglb.

MICROS Herbst. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

Lasiotrechus Ganglb.

DISCUS F. — Strasbourg : Ile des Epis, fin septembre, sous des pierres, au bord d'une flaque d'eau (Klein); Saverne (Boehé).

Trechus Clairv.

v. OBTUSUS Er. — Epinal (Host); Etueffont; Froidefontaine, toute l'année, en criblant les mousses et le terreau (de Brunier).

POGONINI

Pogonus Dej.

* IRIDIPENNIS Nic. — Terrains salifères près de Dieuze (Sch.). — Signalé aussi de la région du Harz.

PATROBINI

Patrobus Steph.

EXCAVATUS Payk. — Strasbourg : forêt de la Robertsau, La Montagne-Verte; Saverne; Vendenheim; Lingolsheim (Sch.). — Forêt de Mont-sur-Meurthe, en juin (Vouaux); Le Rudlin, fin août ; côtes 680 et 1.000, vers le gazon de Faing, une colonie nombreuse, dans une clairière humide; Kichompré, dans un pré (de Brunier).

PTEROSTICHINI

Platynus, Anchomenus Bonelli

Anchus Leconte

OBSCURUS Herbst. — Strasbourg : forêt du Rhin, près de La Robertsau, en hiver, abondant sous les écorces de saules vermoulus et sur le sol sous des amas de bois (Klein, Sch.); Hoenheim (Bod.); Oberhausbergen; Trois-Epis (Sch.). — Messein, bords de la Moselle, en avril (Vouaux).

Limodromus Motsch.

ASSIMILIS Payk. — Strasbourg : forêt du Rhin, en compagnie du précédent (Klein); Hoenheim (Bod.); Oberhaus-

bergen (Sch.). — Forêt de Champenoux, dans les fossés, en avril (Vouaux).

* LONGIVENTRIS Mannh. — Saverne, en mai (Sch.).

Batenus Motsch.

LIVENS Gyllh. — Muttersholz (Kraencker).

Agonum Bon.

SEXPUNCTATUS L. — Hoenheim; Ottrott (Bod.). — Forêt de Mont-sur-Meurthe, en juin (Vouaux).

* V. MONTANUS Heer. — Ottrott, trois ind. (Bod.).

VIRIDICUPREUS F. — Laitre-sous-Amance, dans le jardin du presbytère, en juillet (Vouaux).

MARGINATUS L. — Messein, bords de la Moselle, en avril (Vouaux).

MÜLLERI Herbst. — Achenheim; Ottrott (Bod.); Barr (Sch.). — Epinal (Host); La Malgrange, en avril (Vouaux).

* V. CHALYBAEUS Gradl. — Ottrott (Bod.).

VERSUTUS Gyllh. — Urmatt (Sch.). — Messein, en mai (Vouaux).

VIDUUS Panz. — Strasbourg : La Robertsau, en compagnie de P. ASSIMILIS (Klein); Muttersholz (Kraencker). — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

V. MOESTUS Duft. — Blainville, bords de la Moselle, en avril (Vouaux).

V. EMARGINATUS Gyllh. — Moulin de Donnenbach (Kraencker); Saverne (Sch.). — Blainville, bords de la Moselle, en avril (Vouaux).

DAHLI Borre. — La Malgrange, en avril (Vouaux).

Europhilus Chaud.

SCITULUS Dej. — Bosserville, bords de la Moselle, dans des débris, en avril (Vouaux).

MICANS Nicol. — Strasbourg : Fuchs-am-Buckel (Burr). — Blainville, bords de la Moselle, en avril (Vouaux).

THOREY Dej. — Ottrott (Bod.).

V. PUELLUS Dej. — Bords de l'étang de Champigneulles, en avril (Vouaux); Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

Idiochroma Bedel

(**Clibanarius** Gozis)

DORSALIS Pontopp. — Soultzbad (Sch.); Riquewihr, en grand nombre (Bod.).

Olistophus Dej.

ROTUNDATUS Payk. — La Malgrange ♂ ♀ ; Laitre-sous-Amance, en octobre (Vouaux).

Synuchus Gyllh.

(**Taphria** Dej.)

NIVALIS Panz. — Soultzbad (Sch.). — Etueffont-Haut, en juillet (de Brunier).

Poecilus Bonelli

KOYI Germ. — Rouffach (Sch.). — Haroué; Pont-Saint-Vincent (Host).

MARGINALIS Dej. — Nancy : ferme Sainte-Catherine; Champigneulles (Host).

COERULESCENS L. — Zeinheim (Sch.); Ottrott; Achenheim (Bod.); Hohneck, en juin (Vouaux). — Longemer (Host); Mandray; col des Arrentes-de-Corcieux (de Brunier).

Pterostichus Bonelli

Bothriopterus Chaud.

OBLONGOPUNCTATUS F. — Saverne; Urmatt (Sch.); Ottrott; côte de l'Elsberg; Saint-Nabor (Bod.). — Laitre-sous-Amance (Vouaux); roches de La Burre, entre Robache et Denipaire, près de Saint-Dié, en avril (Sainte-Claire Deville).

ANGUSTATUS Duft. — Hindisheim, bords de l'Andlau (Kraencker).

Platysma Bon.

VULGARIS F. — Col de la Schlucht, en juillet-août. Petite forme de montagne, analogue à celle du Lautaret (Sainte-Claire Deville).

ANTHRACINUS Illig. — Hoerdt (Sch.). — Laitre-sous-Amance, en avril (Vouaux); Epinal (Host); Petite-Fontaine, en nombre au pied d'un poirier, en janvier (de Brunier).

GRACILIS Dej. — Epinal (Host); Raon-l'Etape, bords de la Moselle, en avril (Vouaux).

MINOR Gyllh. — Idem; Messein (Vouaux).

Argutor Steph.

INTERSTINCTUS Sturm. — Côte de l'Elsberg, en tamisant, fin octobre (Bod.). — Bouzey (Host); La Malgrange, en avril (Vouaux); Grandvillars; Méroux (de Brunier).

STRENUUS Panz. — Achenheim; Barr (Bod.); Hohneck, com. juin (Sch.). — La Malgrange, en avril (Vouaux).

DILIGENS Sturm. — Hoerdt (Sch.); côte de l'Elsberg, en compagnie d'INTERSTINCTUS (Bod.). — Epinal (Host); La Malgrange; Laitre-sous-Amance (Vouaux).

Orites Schaum

* NEGLIGENS Sturm (*Sturmi* Dej., *silesiacus* Desbr.). — Cleurie, un ind. en mai; Saut-des-Cuves, près de Gérardmer, un ind. en septembre (de Brunier).

Haptoderus Chaud.

PUMILIO Dej. — Oberhausbergen; Grendelbruch; Barr (Sch.); côte de l'Elsberg; Klingenthal (Bod.). — Entre-deux-Eaux; Mandray; Etueffont (de Brunier).

Steropus Dej.

AETHIOPS Panz. — Grendelbruch; Schirmeck; Trois-Epis (Sch.). — Kichompré, en septembre (de Brunier).

MADIDUS F. — Barr, Munster (Sch.). — Laitre-sous-Amance (Vouaux).

V. CONCINNUS Sturm. — Ottrott; côte de l'Elsberg (Bod.). — Roches de la Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

Pterostichus s. str.

MELAS Creutz. — Chaudeney (Sainte-Claire Deville).

METALLICUS F. — Ottrott; côte de l'Elsberg; Saint-Nabor (Bod.); Saverne; Mutzig; Schirmeck; Nideck; Barr; Grendelbruch; Metzeral (Sch.). — Col de la Schlucht, en

juillet-août (Sainte-Claire Deville, Vouaux); Xonrupt; Kichompré; Le Rudlin (de Brunier).

CRISTATUS Duf. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.). — Plateau d'Amance, en avril (Vouaux); roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville); Etueffont-Haut (de Brunier).

Molops Bonelli

ELATUS F. — Côte de l'Elsberg, un ind. en septembre 1917 (Bod.); ballon de Guebwiller; Hohneck (Sch.). — La présence de cette espèce en Alsace, citée déjà par Kampmann est donc confirmée (Cf. Suppl. I, p. 30).

Stomis Clairv.

PUMICATUS Panz. — Strasbourg : forêt du Rhin, près de La Robertsau, sous les écorces des vieux saules, en février (Klein); Zeinheim (Sch.); Ottrott (Bod.). — Laitre-sous-Amance, sur la route, en novembre (Vouaux); Epinal (Host); Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville); Froidefontaine, dans un nid de taupe un ind. (immature), en janvier (de Brunier).

AMARINI

Amara Bonelli

Triaena Lec.

TRICUSPIDATA Dej. — Strasbourg : forêt du Neuhof, com. mai (Sch.). — Raon-l'Etape, bords de la Moselle, un ind. ♂, en avril (Vouaux).

PLEBEJA Gyllh. — Ottrott; Barr (Bod.); Zeinheim; Rouffach (Sch.). — La Malgrange, en mai (Vouaux).

Amara s. str.

MONTIVAGA Sturm. — Laitre-sous-Amance, en juin (Vouaux); Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

NITIDA Sturm. — Saint-Nabor (Bod.); col de La Schlucht, en juin (Vouaux).

COMMUNIS v. ATRATA Heer. — Muttersholz (Kraencker).

CONVEXIOR Steph. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Achenheim (Bod.). — Chaudeney, inondations de la Moselle, en mai (Sainte-Claire Deville).

LUNICOLLIS Schioedte. — Riquewihr (Bod.). — Raon-l'Etape, bords de la Moselle, en avril (Vouaux).

SCHIMPERI Wencker. — Achenheim, deux ind. (Bod.).

CURTA Dej. — Bussang, en avril (Vouaux).

SPRETA Dej. — Strasbourg : La Robertsau, près d'une gravière, en mai (Klein).

EURYNOTA Panz. — Saverne; Brumath, Zeinheim (Sch.). — Plateau d'Amance (Vouaux).

LUCIDA Duft. — Messein, bords de la Moselle, dans des débris, en avril (Vouaux); Chaudeney, dans les inondations de la Moselle, en mars (Sainte-Claire Deville).

TIBIALIS Payk. — Etival, en mai (Vouaux).

Celia Zimm.

ERRATICA Duft. — Hohneck, en juin (Vouaux).

BIFRONS Gyllh. — Achenheim, en grand nombre (Bod.); Zeinheim (Sch.).

Bradytus Zimm.

APRICARIA Payk. — Achenheim (Bod.). — La Malgrange, en avril (Vouaux).

CONSULARIS Duft. — Muttersholz (Kraencker). — Laître-sous-Amance, en août (Vouaux).

Zabrus Clairv.

TENEBRIOIDES Goeze. — Hœnheim; Zeinheim; Willgottheim, de août en septembre (Sch.). — Laître-sous-Amance, sous les pierres (Vouaux).

HARPALINI

Scybalicus Schaum

* OBLONGIUSCULUS Dej. — Laître-sous-Amance, fin octobre, dans un champ (Vouaux).

Ophonus Steph.

Ophonus s. str.

SABULICOLA Panz. — Saverne; Brumath; Mutzig; forêt de Haguenau (Sch.). — Epinal (Host).

OBSCURUS F. — Côte du Pain de sucre, entre les plateaux de Malzéville et d'Amance, en avril (Vouaux); entre Tendon et Laveline-du-Houx, sous la mousse d'une roche émergeant d'un pré tourbeux, un ind. en février (de Brunier).

DIFFINIS Dej. — Jarny, en avril (Vouaux).

RUPICOLA Sturm. — La Malgrange, en juin (Vouaux).

RUFIBARBIS F. — Hœnheim; Achenheim (Bod.).

PUNCTICOLLIS Payk. — Eschau (Sch.); Bollenberg, près de Rouffach (Fischer).

CORDATUS Duft. — Plateau d'Amance (Vouaux).

AZUREUS F. — Strasbourg : au Contades, La Montagne-Verte, Kronenbourg; Zeinheim; Dingsheim; Reichstett; colline de Hausbergen; Barr (Sch.). — Laître-sous-Amance; La Malgrange (Vouaux).

Parophonus Ganglb.

MACULICORNIS Duft.— Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Zeinheim, en mai (Sch.).

Platus auct.

(**Pardileus** Gozis)

CALCEATUS Duft. — Plateau d'Amance, en août (Vouaux).

Harpalus Latr.

* DISTINGUENDUS V. COERULEUS Schilsky. — Hœnheim (Bod.).

LAEVICOLLIS Duft. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Achenheim; Ottrott; côte de l'Elsberg (Bod.); Reichstett; Trois-Epis (Sch.). — Plateau d'Amance, en août (Vouaux); Epinal (Host).

V. NITENS Heer. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Achenheim (Bod.). — Etueffont, en mai (de Brunier).

RUFITARSIS Duft. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Zeinheim (Sch.).

V. IGNAVUS Duft. — Hohneck, en juillet (Vouaux).

* ATTENUATUS Steph. — Ottrott (Bod.).

MODESTUS Dej. — Achenheim (Sch.). — La Malgrange, en octobre (Vouaux); Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

SERVUS Duft. — Strasbourg : Meinau (Sch.); Ottrott (Bod.).

PICIPENNIS Duft. — Sundhausen (Sch.).

Diachromus Erichs.

GERMANUS L. — Riedisheim; Dornach (Klein). — Plateau d'Amance (Vouaux).

Dichirotrichus Duval

* OBSOLETUS Dej. — Dieuze, dans les terrains salifères (Sch.).

Bradycellus Erichs.

VERBASCI Duft. — Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

COLLARIS Payk. — Achenheim, avril-septembre (Bod.). — Epinal (Host).

V. HARPALINUS Dej. — Moulin de Donnenbach (Kraencker). — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

SIMILIS Dej. — Docelles, en mai (Vouaux).

Stenolophus Dej.

TEUTONUS Schrank. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.); Hœnheim (Bod.); Saverne (Host). — Epinal (id.); Baccarat, en octobre (Vouaux).

Acupalpus Dej.

Acupalpus s. str.

FLAVICOLLIS Sturm. — Strasbourg : La Robertsau, forêt du Neuhof; La Wanzenau, en mai (Sch.); Achenheim, en septembre (Bod.).

BRUNNIPES Sturm. — Jarny; La Malgrange, dans les détritus (Vouaux).

Balius Schioedte

CONSPUTUS Duft. — Heillecourt, au bord d'un ruisseau, en avril (Vouaux).

LICININI

Badister Clairv.

BIPUSTULATUS F. — Strasbourg : fossés de la Citadelle, La Robertsau, Ile des Epis, forêt du Neuhof; Eckbolsheim; Zeinheim; Brumath; Reichstett; Plobsheim; Holzheim; Artolsheim (Sch.); Ottrott (Bod.). — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

V. LACERTOSUS Sturm. — La Malgrange, en octobre (Vouaux).

Licinus Latr.

GRANULATUS Dej. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Plateau de Vandœuvre (Vouaux).

DEPRESSUS Payk. — Idem; Jarny (Vouaux); Epinal (Host).

HOFFMANNSEGGI Panz. — Ottrott, un ind. fin septembre (Bod.). — Saut-des-Cuves, près de Gérardmer, dans une sapinière un ind. sous une pierre, en août (de Brunier).

OODINI

Oodes Bon.

HELOPIOIDES F. — La Malgrange et environs, en avril (Vouaux); Epinal; Champigneulles (Host).

CHLAENIINI

Chlaenius Bon.

NIGRICORNIS F. — Strasbourg : forêt du Rhin, au pied des saules (Klein). — La Malgrange; Laître-sous-Amance (Vouaux).

v. MELANOCORNIS Dej. — Idem, avec le type (Vouaux).

NITIDULUS Schrank. — Hœnheim, en grand nombre, près du canal; Achenheim (Bod.); Saverne; Schirmeck; Saint-Nabor (Sch.); Muttersholz (Kraencker). — Epinal (Host).

v. TIBIALIS Dej. — Jarny (Vouaux); Epinal (Host).

VESTITUS Payk. — Bords de la Moselle (Vouaux).

* VELUTINUS Duft. — Metz, bords de la Moselle (Sch.). — Signalé aussi des environs de Coblence.

CAELATUS Weber (*quadrisulcatus* Payk.). — Lauterbourg (Winter).

PANAGAEINI

Panagaeus Latr.

CRUX-MAJOR L. — Strasbourg : La Robertsau, digue du Rhin, sous les écorces des vieux saules, en hiver; id. au pied des platanes, en mars (Klein); Hœnheim; Achenheim (Bod.); Kleinfrankenheim; Truchtersheim (Sch.). — Epinal (Host); Froidefontaine (de Brunier) .

BIPUSTULATUS F. — Plateau d'Amance, sous des pierres, en octobre (Vouaux).

LEBIINI

Lebia Latr.

CYANOCEPHALA L. — Saint-Nabor (Bod.). — Laître-sous-Amance, sous des pierres, en mars (Vouaux).

CHLOROCEPHALA Hoffm. — Ottrott; Boersch (Bod.). — Epinal (Host); Clefcy (Vouaux); Petite-Fontaine; vallée de la Madeleine (de Brunier).

CRUX MINOR L. — Blainville, dans des débris, en septembre (Vouaux); Petite-Fontaine; Etueffont (de Brunier).

Metabletus Schmidt-Goebel

OBSCUROGUTTATUS Duft. — Laître-sous-Amance, en août (Vouaux).

TRUNCATELLUS L. — Schirmeck; côte du Donon (Sch.). — Messein, bords de la Moselle, dans des débris, en octobre (Vouaux).

FOVEATUS Geoffr. — Ottrott (Bod.); versant du Hohneck, près de la ferme de Frankenthal (Sch.). — La Malgrange, en avril (Vouaux).

Blechrus Motsch.

(**Microlestes** Schmidt-Goebel)

MAURUS Sturm. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

Dromius Bon.

LINEARIS Oliv. — Epinal (Host).

AGILIS v. BIMACULATUS Latr. — Strasbourg : La Robertsau, avec le type (Klein). — Savigny, sous les mousses des chênes, commun avec le type (de Brunier).

SIGMA Rossi. — Strasbourg : La Robertsau, sous les écorces des platanes, commun, en mars (Boehé, Klein); forêt du Neuhof (Bod.).

Demetrias Bon.

Aëtophorus Schmidt-Goebel

IMPERIALIS Germ. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, près du Rhin, au bord d'une mare (Klein), Fuchs-am-Buckel (Burr).

Demetrias s. str.

MONOSTIGMA Sam. — Strasbourg : La Monatgne-Verte (Bod.); Hindisheim, bords de l'Andlau (Kraencker).

ATRICAPILLUS L. — Laître-sous-Amance (Vouaux).

Cymindis Latr.

HUMERALIS Latr. — Moulin de Donnenbach (Kraencker); Reichstett (Sch.); Ottrott ♂ ♀ (Bod.); ballon de Guebwiller, en juillet (Vouaux).

AXILLARIS F. — Plateau d'Amance, en septembre, assez commun (Vouaux).

Menas Motsch.

* VAPORARIORUM L. — Hohneck, deux ind. (Sch.). — Signalé aussi des environs de Vervier par M. Miedel, de Liége (Cf. *Ann. Soc. ent. Belg.* XI, p. 95).

ODACANTHINI

Odacantha Payk.

MELANURA L. — Ottrott; côte de l'Elsberg; Barr; Riquewihr (Bod.). — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

BRACHYNINI

Brachynus Weber

CREPITANS L.— Forêts de Brumath et de Haguenau; Dingsheim; côte du Maennelstein; colline de Molsheim (Sch.); Barr; Andlau (Bod.); Dornach (Klein). — Laître-sous-Amance (Vouaux); Epinal (Host).

SCLOPETA F. — Mulhouse, bords de l'Ill (Klein); Epinal (Host).

EXPLODENS Duft. — Strasbourg : au Wacken, Ile des Epis; Herrenwald, près de Vendenheim; Saverne; Zeinheim; Schlestadt; Artolsheim (Sch.).

DYTISCIDAE

HALIPLINI

Brychius Thoms.

ELEVATUS Panz. — Strasbourg : forêt du Neuhof: Ingwiller (Bod.). — Epinal (Host).

Haliplus Latr.

LINEATUS Aubé. — Rémilly (Sch.). — Laître-sous-Amance, dans l'Amezule, en août (Vouaux).

FULVUS F. — Brumath (Sch.).

FLAVICOLLIS Sturm. — La Malgrange, en avril (Vouaux).

LAMINATUS Schall. — Saverne (Sch.).

FLUVIATILIS Aubé. — Strasbourg : forêt du Neuhof, dans le Rhin-Tortu (Bod.).

IMMACULATUS Gerh. — Strasbourg : forêt du Rhin, près de La Robertsau, dans des eaux-mortes (Bod.). — C'est une espèce valable et non une variété du précédent (Cf. Suppl. I, p. 48).

Cnemidotus Illig.

ROTUNDATUS Aubé. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Messein, en juillet (Vouaux).

DYTISCINI

Hyphydrus Illig.

OVATUS L. — Barr (Bod.); Mulhouse (Klein).

Hygrotus Steph.

INAEQUALIS F. — Haguenau (Bod.); Mulhouse (Klein).

VERSICOLOR Schall. — Strasbourg : au Wacken, dans une mare (Sch.).

Coelambus Thoms.

IMPRESSOPUNCTATUS Schall. — Barr (Bod.); Mulhouse (Klein).

Deronectes Sharp

12 - PUSTULATUS F. — Strasbourg : forêt de la Robertsau, dans le Giessen (Klein). — Jarny, ruisseau du Fond-de-la-Cuve, fin août (Vouaux).

* DEPRESSUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

ELEGANS Sturm. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, dans le Giessen (Klein), Orangerie, dans le petit cours d'eau alimentant le lac (Sch.). — Est à considérer comme espèce valable et non comme variété du DEPRESSUS (Cf. Fasc. I, p. 69 et Suppl. I, p. 50).

ASSIMILIS Payk. — Lac Blanc, deux ind. (Sch.).

Hydroporus Clairv.

Graptodytes Seidl.

GRANULARIS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Muttersholz (Kraencker).

* v. FUNESTUS Schils. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

Hydroporus s. str.

UMBROSUS Gyllh. — Schirmeck (Sch.).

DISCRETUS Fairm. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Fléville, en mai (Vouaux).

Agabus Leach

Gaurodytes Thoms.

DIDYMUS Oliv. — Stambach (Sch.).

BIGUTTATUS Oliv. — Achenheim (Bod.); Schirmeck (Sch.).

MELANARIUS Aubé. — Hohwald (Sch.). — Roches de La Burre, dans les mares pluviales des carrières de grès, en avril (Sainte-Claire Deville).

* NEGLECTUS Er. — Côte du Mont Sainte-Odile (Bod.).

PALUDOSUS F. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, dans le Giessen, en avril (Klein); Kaysersberg (Sch.).

ULIGINOSUS L. — Strasbourg : forêt de la Robertsau et du Neuhof, au Wacken (Sch.); Achenheim (Bod.).

CONGENER Payk. — Ferme d'Altwasen, au sud du Lac Noir; côte du Hohneck (Sch.).

UNGUICULARIS Thoms. — Côte du Hohneck, en juin (Sch.).

Scytodytes Seidl.

STURMI Gyllh. — Strasbourg : forêt de la Robertsau, dans le Giessen, com. avril (Klein); Munster (Sch.).

Eriglenus Thoms.

UNDULATUS Schrank. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, avec le précédent, mais moins rare (Klein); Saverne; Rothau; Cernay (Sch.).

V. INTERRUPTUS Schils. — Muttersholz (Kraencker). — Est à considérer comme variété du précédent et non comme espèce distincte (Cf. Suppl. I, p. 54).

Platambus Thoms.

MACULATUS L. — Pairis, près d'Orbey; Rouffach; Thann (Sch.). — Mares de la forêt de Haye, en mai (Vouaux).

Ilybius Erichs.

FENESTRATUS F. — Strasbourg : forêt de la Robertsau, dans le Giessen (Klein); Schirmeck; Munster; Schmelzwasen, entre Stoswihr et La Schlucht (Sch.).

FULIGINOSUS F. — Strasbourg, avec le précédent (Klein); id., forêt du Neuhof (Bod.); Plobsheim, dans le Rhin-Tortu; Illkirch; Mutzig; Barr (Sch.).

ATER Deg. — Strasbourg, avec les précédents (Klein). — Jarny (Vouaux).

GUTTIGER Gyllh. — Schirmeck (Sch.).

Copelatus Erichs.

Liopterus Steph.

RUFICOLLIS Schall. — Strasbourg : forêt du Rhin, près de La Robertsau, en nombre durant l'hiver, sous les écorces et dans les fentes des vieux saules (Boché, Klein); id., La Montagne-Verte (Sch.).

Rhantus Lacord.

CONSPERSUS Gyllh. — Brumath (Sch.).

BISTRIATUS Er. — Epinal (Host).

EXOLETUS Forster. — Strasbourg : au Wacken (Sch.). — Jarny, en avril (Vouaux).

Cymatopterus Lacord.

STRIATUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

Dytiscus L.

LATISSIMUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, deux ind. dans une source (Bod.).

MARGINALIS v. ♀ CONFORMIS Kunze. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, dans le Giessen (Klein).

CIRCUMCINCTUS Ahr. — Barr (Bod.).

v. ♀ DUBIUS Gyllh. — Illkirch (Sch.).

GYRINIDAE

Gyrinus Geoffroy

BICOLOR Payk. — Barr (Bod.).

COLYMBUS Er. — Mutzig; Barr (Bod.).

MARINUS Gyllh. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Burr), forêt du Neuhof (Sch.); Ottrott; Saint-Nabor (Bod.); moulin de Donnenbach (Kraencker); Mulhouse (Sch.).

HYDROPHILIDAE

HYDROPHILINI

Hydrobius Leach

FUSCIPES v. PICICRUS Thoms. — Schirmeck (Bod.).

v. ROTTENBERGI Gerhardt. — Avec le précédent (Bod.).

Philydrus Solier

MINUTUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

Laccobius Erichs.

SCUTELLARIS Motsch. — Gérardmer, en septembre (Vouaux).

MINUTUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Mutzig (Bod.). — La Malgrange, en mars (Vouaux).

Limnebius Leach

TRUNCATELLUS Thunbg. — Saverne (Bod.).

NITIDUS Marsh. — Einvaux, en juin (Vouaux).

SPHAERIDIINI

Cercyon Leach

USTULATUS Preyssl. — Boersch (Bod.). — Froidefontaine (de Brunier).

OBSOLETUS Gyllh. — La Malgrange, en avril (Vouaux).

HAEMORRHOIDALIS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en très grand nombre sous le cadavre d'un lièvre (Sch.).

* V. ERYTHROPTERUS Muls. — Ottrott (Bod.).

LATERALIS Marsh. — La Malgrange (Vouaux).

UNIPUNCTATUS L. — Hindisheim (Kraencker); Willgottheim, fin février; Hangenbieten (Sch.). — Laître-sous-Amance (Vouaux).

QUISQUILIUS L. — Zeinheim (Sch.). — Jarny; Laître-sous-Amance (Vouaux).

PYGMAEUS Illig. — Muttersholz (Kraencker). — La Malgrange, en juillet et août (Vouaux).

* V. MERDARIUS Sturm. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

ANALIS Payk. — Idem (Bod.); au Wacken; forêt de Brumath (Sch.). — La Malgrange, en juin (Vouaux); Epinal (Host).

* BIFENESTRATUS Küst. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

GRANARIUS Er. — Idem (Bod.). — Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

Cryptopleurum Muls.

CRENATUM Panz. — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

MINUTUM F. (*atomarium* Oliv.). — Strasbourg : forêt du Neuhof, maison forestière Oberjaegerhof; Fessenheim; Dingsheim (Sch.).

HELOPHORINI

Helophorus F.

GRISEUS Herbst. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Sch.). — La Maix; Jarny, en juin (Vouaux).

* V. ELONGATUS Kuw. *non* Mot. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

NANUS Sturm. — Bosserville, bords de la Meurthe, dans des débris (Vouaux).

AFFINIS Marsh. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

* VIRIDICOLLIS Steph. (*aquaticus* Er.). — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Sch.).

V. AENEIPENNIS Thoms. — Strasbourg : au Wacken; forêt du Neuhof (Sch.).

* V. OBSCURUS Muls. — Ottrott (Bod.). — Signalé également sur la rive droite du Rhin.

Hydrochus Leach

BREVIS Herbst. — Forêt de Haguenau, un ind. (Sch.).

Ochthebius Leach

GIBBOSUS Germ. — Strasbourg : au Wacken (Sch.). — Messein, dans des débris, en mars (Vouaux).

BICOLON Germ. — Environs de La Malgrange, au vol, en mai (Vouaux).

MARGIPALLENS Latr. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

Hydraena Kugelann

PALUSTRIS Er. — Hohneck (Sch.).

RIPARIA Kugel. — Roches de La Burre (Sainte-Claire Deville).

* ANGUSTATA Sturm. — Un individu étiqueté *Mulhouse : Ill* dans la collection de la Société industrielle de Mulhouse (com. de M. Klein).

NIGRITA Germ. — Saverne (Sch.).

GRACILIS Germ. — La Malgrange, ruisseau de Montaigu, sous des pierres, en octobre (Vouaux).

ATRICAPILLA Waterh. — Ottrott (Bod.).

GEORYSSIDAE

Georyssus Latr.

CRENULATUS Ross. — Laître-sous-Amance, bords de l'Amezule, en août (Vouaux).

PARNIDAE

ELMINI

Limnius Müller

DARGELASI Latr. — Blainville, dans les ruisseaux, en avril (Vouaux).

Elmis Latr.

(**Latelmis** Reitter)

VOLKMARI Panz. — Mulhouse (Klein). — La Malgrange, ruisseau de Montaigu; Champigneulles, com. octobre (Vouaux).

Esolus Muls.

PARALLELEPIPEDUS Müll. — Saverne (Sch.). — Blainville, en avril (Vouaux).

Lareynia Duval

(**Helmis** Latr.)

LATREILLEI Bed. — Ruisseaux aux environs de La Schlucht (Vouaux).

MAUGETI Latr. — Blainville, en avril (Vouaux).

V. AENEA Mull. — Mulhouse (Klein); Hohneck (Sch.). — La Malgrange, ruisseau de Montaigu, en octobre (Vouaux). Est à considérer comme une variété de MAUGETI et non comme une espèce distincte.

* OBSCURA Müll. — La Malgrange, ruisseau de Montaigu, en mai (Vouaux).

Riolus Muls.

CUPREUS Müll. — Mulhouse (Klein). — La Malgrange; Blainville, en octobre (Vouaux).

Stenelmis Dufour

CANALICULATUS Gyllh. — Messein, dans des débris, en mars (Vouaux).

PARNINI

Parnus F.

(**Dryops** Olivier)

LURIDUS Er. — Laître-sous-Amance, dans l'Amezule, en août (Vouaux).

AURICULATUS Geoffr. (*prolifericornis* F.). — Bosserville, bords de la Meurthe, dans des débris (Vouaux).

OBSCURUS Duft. — Strasbourg : au Wacken et au Fuchs-am-Buckel, bords de l'Ill (Sch.). — Raon-l'Etape, bords de la Meurthe, en avril (Vouaux).

ERNESTI Gozis (*auriculatus* Panz., *Schneideri* Reitt.). — Plobsheim, bords du Rhin-Tortu (Bod.).

HETEROCERIDAE

Heterocerus F.

MARGINATUS F. — Marsal, dans les mares d'eau saumâtre, en mai (Vouaux).

SERICANS Kiesw. — Strasbourg : forêt du Neuhof, dans une mare (Sch.).

FUSCULUS Kiesw. — Laître-sous-Amance, en mai; Jarny, en juin (Vouaux).

LAEVIGATUS Panz. (*fenestratus* Thunbg.). — Vendenheim (Sch.). — Laître-sous-Amance (Vouaux).

* PARALLELUS Gebl. — Dieuze, dans les terrains salifères (Sch.).

STAPHYLINIDAE

ALEOCHARINI

Ocalea Er.

BADIA Er. — Mont-sur-Meurthe, sous les écorces, en mai (Vouaux).

RIVULARIS Mill. — Strasbourg : au Wacken, forêt de La Robertsau, dans des détritus (Sch.).

Ilyobates Kraatz

FORTICORNIS Lac. — Messein, dans des débris, en mars (Vouaux).

Chilopora Kraatz

LONGITARSIS Er. — La Malgrange, au vol, en octobre (Vouaux).

Phloeopora Er.

REPTANS Er. — Mont-sur-Meurthe, sous les écorces, en octobre (Vouaux).

CORTICALIS Grav. — La Malgrange, sous les écorces, en mai (Vouaux); Epinal (Host).

ANGUSTIFORMIS Baudi. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

Ocyusa Kraatz

INCRASSATA Rey. — Col de La Schlucht; roches de La Burre; Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

Ischnoglossa Kraatz

CORTICINA Er. — Mont-sur-Meurthe, sous les écorces, en octobre (Vouaux); Epinal (Host).

Stichoglossa Fairm.

SEMIRUFA Er. — Ottrott, un ind. (Bod).

Oxypoda Mannh.

RUFICORNIS Gyllh. — La Malgrange, un ex. au vol, en octobre (Vouaux).

LONGIPES Rey. — La Malgrange, en mai (Vouaux); Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

OPACA Grav. — Jarny; La Malgrange, en mai (Vouaux); Epinal (Host); Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

SERICEA Heer. — La Malgrange, au vol, en février (Vouaux).

* FORMOSA Kr. — La Malgrange, dans des champignons, en novembre (Vouaux).

ALTERNANS Grav. — Ottrott, en très grand nombre, fin septembre (Bod.).

HAEMORRHOA Mannh. — Vandœuvre, dans les fourmilières, en mars (Vouaux); Epinal (Host).

Aleochara Gravenhorst

LATA Grav. — Achenheim (Bod.). — Blainville, sur un cadavre de taupe (Vouaux).

CRASSICORNIS Lac. — Jarny; Blainville, dans des débris (Vouaux).

INTRICATA Mannh. (*bipunctata* Er., *biguttata* Heer). — Blainville, dans des débris; La Malgrange, en avril (Vouaux); Epinal (Host).

LAEVIGATA Gyllh. — Messein, dans des débris, en mars (Vouaux); Gérardmer (Host).

MYCETOPHAGA Kr. — Champigneulles, dans des débris (Vouaux).

LANUGINOSA Grav. — Col de La Schlucht, en juillet (Vouaux); Epinal (Host); Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

SPARSA Heer. — Ottrott, un ex. en tamisant, fin septembre (Bod.). — Bords de l'étang de Champigneulles, en octobre (Vouaux).

NITIDA Grav. — Laître-sous-Amance, en août (Vouaux); Epinal (Host).

Homoeusa Kraatz

ACUMINATA Maerk. — Laître-sous-Amance, dans les fourmilières, en avril (Vouaux).

Dinarda Mannh.

DENTATA Grav. — Heillecourt, près de Jarville, avec *Formica sanguinea,* com. mars (Vouaux).

V. MAERKELI Kiesw. — Vandœuvre, avec *Formica rufa* (Vouaux).

Lomechusa Gravenh.

STRUMOSA Grav. — Grand-Charmont, en avril (de Brunier).

Atemeles Steph.

EMARGINATUS Payk. — Côte du Donon, dans les fourmilières (Vouaux).

PARADOXUS Grav. — Molsheim, en grand nombre, avec *Myrmica rubra*; Saverne, dans les mêmes conditions (Sch.).

Zyras Steph.

HAWORTHI Steph. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.). — Froidefontaine, un ex. en janvier avec fourmis noires, dans une vieille souche de chêne, profondément enfouie dans un talus (de Brunier).

FULGIDA Grav. — Ottrott (Bod.).

Myrmedonia Erichs.

SIMILIS Maerk. — Brumath (Sch.).

LIMBATA Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

LATICOLLIS Maerk. — Champigneulles, fin avril (Vouaux).

Alianta Thoms.

* INCANA Er. — Col de La Schlucht, deux ind. (Sch.).

Notothecta Thoms.

FLAVIPES Grav. — Vandœuvre, avec *Formica rufa,* fin mars (Vouaux).

ANCEPS Er. — Idem (id.).

Thamiaraea Thoms.

CINNAMOMEA Grav. — Forêt de Champenoux, en avril (Vouaux).

Colpodota Rey

(**Coprothassa** Thoms.)

* MELANARIA Mannh. (*tenera* Sahlb., *testudinea* Er.). — Schirmeck, deux ind. (Sch.). — Messein, dans des débris, com. mars (Vouaux).

(**Acrotona** Thoms.)

PYGMAEA Grav. — Ottrott, un ex. en tamisant, fin septembre (Bod.).

PARVA Sahlb. — Ottrott; Saint-Nabor; côte de l'Elsberg (Bod.).

LATICOLLIS Steph. — Forêt de Champenoux, en avril (Vouaux).

Geostiba Thoms.

(**Sipalia** Rey)

CIRCELLARIS Grav. — Achenheim; Ottrott; Barr (Bod.). — Laître-sous-Amance (Vouaux).

Thectura Thoms.

CUSPIDATA Er. — Mont-sur-Meurthe, sous les écorces de hêtre, en octobre (Vouaux).

Dinaraea Thoms.

ANGUSTULA Gyllh. — Laître-sous-Amance; La Malgrange (Vouaux).

NIGELLA Er. — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

Liogluta Thoms.

BRUNNEA F. — La Malgrange, fin mai (Vouaux); Epinal (Host).

GRANIGERA Ksw. — Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville).

NITIDULA Kr.— Ottrott, un ind. (Bod.); Saint-Nabor (Sch.).

Atheta Thoms.

* EPISCOPALIS Bernh. — Ottrott, une dizaine d'individus (Bod., *det.* Bernhauer).

CASTANOPTERA Mannh. — Muttersholz (Kraencker); Ottrott; Saint-Nabor; Riquewihr (Bod.).

TRINOTATA Kr. — Blainville (Host); forêt de Champenoux (Vouaux).

XANTHOPUS Thoms. — La Malgrange, au vol, en octobre (Vouaux).

CRASSICORNIS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Saverne; Zeinheim (Sch.); Achenheim; Ottrott, en nombre (Bod.). — Houdemont, dans des excréments, en avril (Vouaux).

NIGRITULA F. — Ottrott, en grand nombre (Bod.). — La Malgrange, dans les *Russules,* en juillet (Vouaux).

PALLIDICORNIS Thoms. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

PARADOXA Rey. — Forêt de Haguenau (Sch.).

* SUBTERRANEA Rey. — Strasbourg : jardin de l'Hôpital civil (Bod.).

GAGATINA Baudi. — Ottrott (Bod.).

CORIARA Kr. — Mont-sur-Meurthe, sous les écorces, en octobre (Vouaux).

* TIBIALIS Heer (*nivalis* Kiesw., *picipennis* Rey). — Hohneck (Sch.).

* SEQUANICA Bris. — La Malgrange, dans des débris, en mars (Vouaux).

MELANOCERA Thoms. — Col de La Schlucht (Sainte-Claire Deville); Hohneck (Sch.).

MARCIDA Er. — Ottrott, en septembre (Bod.).

NIGRICORNIS Thoms. — Ottrott (Bod.). — Col de La

Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville); Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

PICIPES Thoms. — La Malgrange, à une plaie d'arbre, en mai (Vouaux); roches de La Burre, sous les écorces de sapin (Sainte-Claire Deville).

ANGUSTICOLLIS Thoms. — Vandœuvre, dans les champignons, en octobre (Vouaux); Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

CORVINA Thoms. — Ottrott, en nombre (Bod.).

* ARCANA Er. (*brevipennis* J. Sahlb.). — Col de la Schlucht (Vouaux).

* INHABILIS Kr. — Côte du Donon, deux ind. (Sch.).

SORDIDULA Er. — La Malgrange, dans des crottins, en juillet (Vouaux).

CELATA Er. — Ottrott, assez commun (Bod.).

* LUCTUOSA Rey (*picicornis* Rey, *Schneideri* Epp.). — Froidefontaine, un ex. dans un nid de taupe (de Brunier).

AEGRA Heer.— La Malgrange, au vol, en octobre (Vouaux).

GRACILICORNIS Er. — Messein, dans des débris, en avril (Vouaux).

Aloconota Thoms.

LANGUIDA Er. — Strasbourg : forêt du Rhin (Bod.).

* V. LONGICOLLIS Rey. — Donon, en mai; Messein, dans des débris(Vouaux).

GREGARIA Er. — Saverne (Sch.). — Messein, dans des débris, en automne (Vouaux).

Ischnopoda Thoms.

UMBRATICA Er. — Moulin de Donnenbach (Kraencker). — Bords de la Meurthe (Vouaux).

Tachyusa Er.

BALTEATA Er. — Saint-Nabor (Bod.). — Messein, en juillet (Vouaux).

CONSTRICTA Er. — Bords de la Meurthe (Vouaux).

COARCTATA Er. — Idem (id.); Epinal (Host).

Falagria Steph.

SULCATULA Grav. — Jarny, en août (Vouaux).

NIGRA Grav. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Mutzig; Barr; Brumath; Erstein (Sch.). — La Bouzule (Host).

Autalia Steph.

RIVULARIS Grav. — Strasbourg : au Wacken (Sch.); Ottrott (Bod.). — La Malgrange, dans des crottins (Vouaux).

Bolitochara Mannh.

LUCIDA Grav. — Strasbourg : La Montagne-Verte (Sch.); Ottrott (Bod.).

LUNULATA Payk. — Docelles, dans les champignons, en octobre (Vouaux).

Euryusa Erichs.

SINUATA Er. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; côte de l'Elsberg; Riquewihr (Bod.). — La Malgrange, dans des débris, en octobre (Vouaux).

Leptusa Kraatz

ANGUSTA Aubé. — La Maix, en mai (Vouaux).

HAEMORRHOIDALIS Heer. — Col de La Schlucht (Sch.). — Laître-sous-Amance; La Maix, en juin (Vouaux).

RUFICOLLIS Er. — Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

GLOBULICOLLIS Rey. — Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville).

Homalota Mannh.

PLANA Gyllh. — Reichstett (Sch.). — Mont-sur-Meurthe, sous les écorces de hêtre, en octobre (Vouaux).

Placusa Erichs.

COMPLANATA Er. — Riquewihr (Bod.). — Epinal (Host).

PUMILIO Grav. — La Malgrange, sous les écorces, fin mai (Vouaux).

Encephalus Westw.

COMPLICANS Westw. — Aydoilles, au pied d'un arbre, en avril (Vouaux).

Gyrophaena Mannh.

AFFINIS Sahlb. — Zeinheim (Sch.). — Epinal (Host); La Malgrange, dans les champignons, en juillet (Vouaux).

BIHAMATA Thoms. — Forêt de Champenoux, en août (Vouaux).

LUCIDULA Er. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, deux ind. dans un champignon arboricole (Sch.).

MINIMA Er. — Idem : forêt du Neuhof (Sch.). — Forêt de Champenoux, en mai (Vouaux).

POLITA Grav. — Idem, dans les champignons arboricoles, en août (Vouaux).

STRICTULA Er. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

Brachida Rey

NOTHA Er. (*exigua* Heer). — Ottrott, un ind. (Bod.). — La Malgrange, sur de la paille pourrie, en octobre (Vouaux).

Hygronoma Erichs.

DIMIDIATA Grav. — Messein, dans des débris, en avril (Vouaux).

Pronomaea Erichs.

ROSTRATA Er. — La Malgrange, sous les feuilles mortes, en mars (Vouaux).

Myllaena Erichs.

DUBIA Grav. — Hindisheim, bords de l'Andlau (Kraencker).

INTERMEDIA Er. — Messein, dans des débris, en avril (Vouaux).

BREVICORNIS Matth. — Hohneck (Sch.).

MINUTA Grav. — Champigneulles, en avril (Vouaux).

* INFUSCATA Kr. (*minima* Kr.). — Idem, dans des débris (Vouaux).

Gymnusa Gravenh.

BREVICOLLIS Payk. — Saint-Nabor; Andlau (Bod.).

Hypocyptus Mannh.

DISCOIDEUS Er. — Champigneulles, dans des détritus, en avril (Vouaux).

Trichophya Mannh.

PILICORNIS Gyllh. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

Tachinus Gravenh.

FLAVIPES F. — Blainville, en mai et septembre (Vouaux).

PROXIMUS Kr. — Schirmeck (Sch.). — Blainville, dans des débris, en mai (Vouaux).

HUMERALIS Grav. — Ottrott (Bod.). — Epinal (Host); Baccarat, dans les champignons, en octobre (Vouaux).

RUFIPENNIS Gyllh. — Froidefontaine, dans les nids de taupes, six ex. dont quatre par couples (de Brunier).

PALLIPES Grav. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof (Sch.). — Epinal (Host).

BIPUSTULATUS F. — Forêt de Champenoux, un ex. ♀, fin avril (Vouaux).

RUFIPES Deg. — Ottrott (Bod.). — Epinal (Host); Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

LATICOLLIS Grav. — Strasbourg : au Wacken (Sch.); côte de l'Elsberg (Bod.); Rothau (Sch.).

MARGINELLUS F. — La Malgrange, en mai (Vouaux); Epinal (Host).

COLLARIS Grav. — Messein, dans des débris, en mars (Vouaux).

SUBTERRANEUS L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Klein); Achenheim (Bod.); Willgottheim (Sch.). — La Malgrange, en novembre (Vouaux); Epinal (Host); Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

v. BICOLOR Grav. — La Malgrange, en novembre (Vouaux).

FIMETARIUS Grav. — Dingsheim, en grand nombre, dans un amas de feuilles pourries; Barr (Sch.). — Epinal (Host).

Tachyporus Gravenh.

ABDOMINALIS F. — Strasbourg : à l'Orangerie (Sch.).

FORMOSUS Matth. — Ottrott, en septembre (Bod.). — Messein, dans des détritus, en avril (Vouaux); Blainville (Host).

SOLUTUS Er. — Pompey, en fauchant, fin mai (Vouaux); Epinal (Host).

ATRICEPS Steph. — Ottrott, en nombre, en tamisant (Bod.) — Messein, dans des détritus, en mars (Vouaux).

MACROPTERUS Steph. — Messein, dans des débris, en avril; forêt de Champenoux (Vouaux).

PUSILLUS Grav. — Messein; La Malgrange, en mars (Vouaux).

TRANSVERSALIS Grav. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, près de la digue du Rhin, deux ind. (Sch.).

NITIDULUS F. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Hangenbieten; Châtenois; Thann (Sch.); Ottrott; Riquewihr, en grand nombre (Bod.).

RUFICOLLIS Grav. — Achenheim; Ottrott (Bod.). — Pompey, en mai (Vouaux); Epinal (Host).

Lamprinodes Luze

SAGINATUS Grav. — Epinal (Host).

Lamprinus Heer

ERYTHROPTERUS Panz. (*Lasserrei* Heer). — Frœschwiller (Winter).

Conurus Steph.

(**Conosoma** Kraatz)

PUBESCENS Grav.— Ottrott, deux ind. en septembre (Bod.). Laître-sous-Amance; Messein, dans des débris, en octobre (Vouaux).

IMMACULATUS Steph. — Strasbourg : au Wacken, La Montagne-Verte (Sch.); Ottrott (Bod.). — Petite-Fontaine, un ex. dans un nid de taupe (de Brunier).

PEDICULARIUS Grav. — Drusenheim (Sch.); Ottrott, en grand nombre (Bod.). — Epinal (Host).

BIPUSTULATUS Grav. — Docelles, dans les champignons (Vouaux).

BIPUNCTATUS Grav. — Epinal (Host).

Bolitobius Steph.

LUNULATUS L. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Herrenwald, près de Vendenheim (Sch.); Saint-Nabor; côte de l'Elsberg (Bod.). — Epinal (Host).

TRINOTATUS Er. — Wolfisheim; Saverne (Sch.).

EXOLETUS Er. — Ottrott; côte de l'Elsberg, en très grand nombre (Bod.); Avolsheim (Sch.).

PYGMAEUS F. (*thoracicus* F.). — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Saverne; forêt de Brumath; Holzheim; Erstein (Sch.); Ottrott (Bod.). — Louchpach, en avril (Vouaux); Epinal (Host); Froidefontaine (de Brunier).

Bryocharis Lacord.

ANALIS Payk. — Forêt de Haguenau (Sch.); Ottrott, deux ex. en tamisant (Bod.). — Blainville (Host).

* V. MERDARIA Gyllh. — Dinozé (Host).

INCLINANS Grav. — Blainville (Host).

FORMOSA Grav. — Forêt de Brumath, deux ind. (Sch.). — Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville).

Mycetoporus Mannh.

SPLENDIDUS Grav. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

RUFESCENS Steph. — Avec le précédent (Sainte-Claire Deville); Epinal (Host).

BRUNNEUS Marsh. — Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

NIGER Fairm. — Col de La Schlucht, en juin (Vouaux).

STAPHYLININI

Euryporus Er.

PICIPES Payk. — Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

Heterothops Steph.

PRAEVIA Er. — Ottrott, en tamisant, un ind. (Bod.). — La Malgrange, en mai (Vouaux); Froidefontaine, dans des nids de taupes (de Brunier).

QUADRIPUNCTULA Grav. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en avril (Sch.).

Quedius Leach

* LONGICORNIS Kr. — Côte de l'Elsberg, un ex. (Bod.). — Aydoilles, un ex. dans un nid de taupe, en mai (Vouaux).

BREVIS Er. — Blainville, sur *Salix*, en novembre (Vouaux).

* VEXANS Epp. — Hohneck, un ind. (Sch.).

OCHRIPENNIS Mén. — Idem, trois ind. (Sch.). — Froidefontaine; Petitefontaine, commun dans les nids de taupes (de Brunier); Epinal (Host).

v. NICROCOERULEUS Fauv. — Avec la forme typique et aussi commun (de Brunier).

* OTHINIENSIS Johans. 1907 (*talparum* Dev. 1910). — Les citations concernant le *talparum* Dev. dans le Supp. I (p. 89), se rapportent à cette espèce que M. Sainte-Claire Deville a capturée à Epinal dans des nids de taupes. Elle a été décrite par J. P. Johansen sur un individu découvert accidentellement aux environs d'Odense (Ile de Fynnen) et retrouvé depuis en nombre dans les nids de taupes dans l'ile de Sjaelland (Cf. *Bull. Soc. ent. Fr.* 1913, p. 270).

MESOMELINUS Marsh. — Saverne (Sch.); Ottrott (Bod.). — La Malgrange, dans un cellier obscur, en novembre (Vouaux); Epinal (Host).

CRUENTUS Oliv. — La Malgrange, dans des détritus, en automne (Vouaux); Houdemont (Host).

v. virens Rott. — Ottrott (Bod.). — Environs de La Malgrange; Montaigu, en juin (Vouaux).

xanthopus Er. — Docelles, en avril (Vouaux).

punctatellus Heer. — Hohneck, com. juin (Sch.); Col de La Schlucht (Sainte-Claire Deville).

laevigatus Gyllh. — Idem (Vouaux); Epinal (Host).

tristis Grav. — Côte du mont Sainte-Odile (Bod.).

fuliginosus Grav. — Ottrott; côte de l'Elsberg, en tamisant (Bod.). — Epinal (Host).

molochinus Grav. — Epinal (Host); forêt de Champenoux (Vouaux); Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

ochropterus Er. — Hohwald, maison forestière de la Rotlach; côte du mont Sainte-Odile (Sch.).

picipes Mannh. — Munster (Sch.).

fumatus Steph. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

dubius Heer. — Versant sud du Hengst (Sch.).

limbatus Er. — Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville, Host); Lac Blanc (Sch.).

* obliteratus Er. (*marginalis* Kr., *suturalis* Thoms., *mutatus* Kr.). — Strasbourg : forêt du Neuhof, un ex. sous des feuilles mortes, com. mai (Sch.).

lucidulus Er. — Saverne (Sch.). — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

* scintillans Grav. (*vicinus* Lac., *fuscipes* Steph.). — Epinal (Host).

* alpestris Heer (*aeneipennis* Heer, *satyrus* Kiesw., *biseriatus* Stierl.). — Col de La Schlucht, en juillet (Vouaux).

rufipes Grav. — Epinal (Host).

boops Grav. — Enzheim (Sch.).

Emus Curtis

hirtus L. — Saverne; Brumath; Still (Sch.). — La Bonzule (Host).

Leïstotrophus Kraatz

(**Ontholestes** Ganglb.)

NEBULOSUS F. — Saverne ; vallée de Baerenbach, dans les champignons pourris et les bouses (Klein); Ottrott (Bod.); Zeinheim; Gugenheim; Urmatt (Sch.). — Forêt de Champenoux (Vouaux).

Staphylinus L.

PUBESCENS Deg. — Ottrott, en nombre sous les amas de feuilles pourries (Bod.); Zeinheim; Stutzheim; Sundhausen; col de La Schlucht (Sch.). — Plateau d'Amance, en septembre (Vouaux); Vandœuvre; Houdemont (Host).

CHALCOCEPHALUS F. — Muttersholz (Kraencker). — Epinal (Host).

STERCORARIUS Oliv. — Saverne; Zeinheim; côte du Scharrach (Sch.). — Epinal (Host).

LATEBRICOLA Grav. — Epinal (Host).

FULVIPES Scop. — Riquewihr (Bod.). — Liverdun, en juin (Vouaux).

FOSSOR Scop. — Schirmeck; Châtenois; Türckheim (Sch.). Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville, Sch.). — Clefcy, sous les pierres, com. avril (Vouaux); Epinal (Host).

ERYTHROPTERUS L. — Nancy, en juin 1918, où plusieurs centaines d'exemplaires sont venus s'abattre sur les trottoirs de la place Stanislas; Epinal (Host).

Ocypus Kirby

TENEBRICOSUS Grav. — Dreispitz, près de Mutzig (Sch.).

* MACROCEPHALUS Grav. — Epinal (Host).

SIMILIS F. — Zeinheim; Hœrdt; Geispolsheim; Reichstett; Fessenheim (Sch.); Ottrott (Bod.). — Plateau d'Amance, sous les pierres, en avril (Vouaux); Epinal (Host).

PICIPENNIS F. — Berstett; Molsheim (Sch.). — Blainville, dans des détritus, en août (Vouaux).

FUSCATUS Grav. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Saverne; Saint-Nabor (Sch.).

FULVIPENNIS Er. — Strasbourg, avec le précédent (Sch.).

AENEOCEPHALUS Deg. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Saverne; Brumath; Sundhausen (Sch.); Ottrott (Bod.). — Bords de l'étang de Champigneulles, fin avril (Vouaux); Epinal (Host).

Pseudotasgius Seidl.

PEDATOR Grav. — Laître-sous-Amance, en juillet (Vouaux); Epinal (Host).

Anodus Nordm.

EDENTULUS Block (*globulifer* Geoffr.). — Ottrott (Bod.); Colmar (Jacobs). — Epinal (Host).

COMPRESSUS Marsh. — Epinal (Host).

Tasgius Steph.

ATER Grav. — Laître-sous-Amance, dans une cuisine (Vouaux).

Bisnius Thoms.

PROLIXUS Er. — Messein, dans des détritus, en mai (Vouaux).

Actobius Fauvel

RIVULARIS Kiesw. — Blainville, dans des débris, en avril (Vouaux).

Philonthus Curtis

SPLENDENS F. — Hohneck, en juin (Sch.). — Epinal, Blainville (Host).

INTERMEDIUS Lac. — La Malgrange, dans des bouses, en juin (Vouaux); Epinal; Blainville (Host).

LAMINATUS Creutz. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville); Epinal (Host).

CYANIPENNIS F. — Fréland (Sch.). — Epinal (Host).

CHALCEUS Steph. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Herrenwald, près de Vendenheim; Reichstett (Sch.); Ottrott, en nombre, dans les champignons, et en tamisant (Bod.).

POLITUS Epp. — Hœnheim; Ottrott; Saint-Nabor, dans les mêmes conditions que le précédent et en très grand nombre (Bod.); Reichstett (Sch.).

CARBONARIUS Gyllh. — Strasbourg : digue du Rhin, près de La Robertsau (Bod.); Stambach; Zeinheim; Willgottheim; Winzenheim (Sch.). — Epinal (Host).

* BODEMEYERI Epp. — Zeinheim, un ind. sous un amas de feuilles mortes (Sch.). — Cf. W. Hubenthal, *Bemerkungen und Berichtigungen, Ent. Blætter,* 5. Jahrg. nº 1, 2.

UMBRATILIS Grav. — Ottrott, un ind. en juillet (Bod.).

CEPHALOTES Grav. — Strasbourg : digue du Rhin, en compagnie de CARBONARIUS, mais beaucoup plus rare (Bod.).

SORDIDUS Grav. — Ottrott; côte de l'Elsberg (Bod.).

* Scribae Fauv. — Saverne, sous les mousses, deux ind. (Sch.).

* fuscus Grav. (*subuliformis, terminatus, fragilis* Grav.). — Wissembourg, sous une pierre, deux ind. (Sch.).

ventralis Grav. — Saverne (Sch.); Ottrott; côte de l'Elsberg (Bod.).

debilis Grav. — Ottrott, en tamisant, en septembre et octobre, en grand nombre (Bod.).

discoideus Grav. — Idem, un ex., fin septembre (Bod.).

ebeninus Grav. — Col de La Schlucht (Sch.). — La Malgrange, dans des détritus, en octobre (Vouaux); Epinal (Host).

coruscus Grav. — Forêt de Brumath (Sch.); Ottrott (Bod.).

immundus Gyllh. — Achenheim; Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

sanguinolentus Grav. — Hœnheim (Bod.). — La Malgrange, dans les crottins, en juillet (Vouaux); Epinal; Houdemont (Host).

laevicollis Lac. — Louchpach, fin avril (Vouaux).

* montivagus Heer. — Hohneck, sous une pierre, en juin, trois ind. (Sch.).

quisquiliarius Gyll. — Vendenheim (Sch.). — Epinal (Host).

rufimanus Er. — Messein, en mai (Vouaux).

Gabrius Steph.

astutus Er. — Champ-du-Feu, sous les mousses (Sch.).

* pennatus Sharp. — Chaudeney (Sainte-Claire Deville).

nigritulus Grav. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Trois-Epis; Hohneck (Sch.); Achenheim; Ottrott, en très grand nombre en tamisant (Bod.). —

Chaudeney (Sainte-Claire Deville); Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

EXIGUUS Nordm. — Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

Gefyrobius Thoms.

DECORUS Grav. — Achenheim (Bod.).

LUCENS Er. (*Mannerheimi* Fauv.). — Ottrott, un ex. en tamisant (Bod.). — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

VARIUS Gyllh. — Strasbourg et environs; Saverne; Barr; Ernolsheim; Colmar (Sch.).

V. BIMACULATUS Grav. — Epinal (Host).

MARGINATUS Stroem. — Versant sud du Hengst (Sch.).

CRUENTATUS Gmel. — Col de La Schlucht (Sch.). — Epinal (Host).

LONGICORNIS Steph. — Ottrott, en nombre (Bod.); Zeinheim; Willgottheim; Reichstett (Sch.). — Espèce cosmopolite (Cf. Fauvel, *Rev. d'ent.* 1903, p. 271).

ALBIPES Grav. — Ottrott, assez commun (Bod.).

LEPIDUS Grav. — Zeinheim, sous les pierres, dans les terrains calcaires, deux ind. (Sch.).

MICANS Grav. — Ottrott, en tamisant (Bod.). — Epinal (Host).

FULVIPES F. — Achenheim; côte de l'Elsberg (Bod.).

Rabigus Rey

PULLUS Nordm. — Epinal (Host).

Othius Steph.

FULVIPENNIS F. — Ottrott; Saint-Nabor; côte de l'Elsberg (Bod.). — Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

MELANOCEPHALUS Grav. — Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville); Saverne; Hohneck (Sch.).

MYRMECOPHILUS Kiesw. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Mundolsheim (Sch.); Ottrott, de nombreux ex. en tamisant (Bod.); Trois-Epis; Grand Hohnack (Sch.); col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville).

Baptolinus Kraatz

AFFINIS Payk. — Barr (Sch.). — Blainville, en septembre (Vouaux).

Leptacinus Erichs.

BATYCHRUS Gyllh. — Mont-sur-Meurthe, sous les écorces, en octobre (Vouaux).

LINEARIS Grav. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Ottrott (Bod.).

FORCIMETORUM Maerk. — La Malgrange, dans des débris, en automne (Vouaux).

Eulissus Eppelsh. nec Mannh.

(**Gauropterus** Thoms.)

FULGIDUS F. (*pyropterus* Grav., *angulatus* Küst., *intermedius* Küst.). — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Jarny (Vouaux).

Nudobius Thoms.

LENTUS Grav. — Versant du mont Sainte-Odile, au-dessous de la source (Sch.). — Docelles, sous les écorces de pins, fin septembre (Vouaux).

Xantholinus Serville

ATRATUS Heer. — Artolsheim; Colmar (Sch.).

GLABRATUS Grav. — Epinal (Host).

TRICOLOR F. — Strasbourg et environs; Saverne; Zeinheim; Molsheim; Haguenau (Sch.); Ottrott (Bod., Sch.).

LINEARIS Oliv.— Ottrott, en tamisant, fin septembre (Bod.). — Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

PAEDERINI

Cryptobium Mannh.

FRACTICORNE Payk. — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville); Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

* V. BREVIPENNE Rey. — Ottrott, un ex. en tamisant (Bod.).

Dolicaon Lap.

BIGUTTULUS Lac. — Zeinheim, deux ind. sous une pierre, près de la carrière, sur terrain calcaire (Sch.). — Les indications de Billot, d'après lequel cette rare espèce a été capturée à Haguenau, et celles de Kampmann, qui la cite de Colmar, paraissent justes. Par conséquent, les citations à la page 98 du Suppl. I sont à rayer.

Lathrobium Gravenh.

BRUNNIPES F. — Hoerdt; Sundhausen; Châtenois (Sch.); Boersch (Bod.). — Epinal (Host).

GEMINUM Kr. — Ottrott, en très grand nombre, sous les pierres, dans les détritus (Bod.).

ELONGATUM L. — Epinal (Host).

LAEVIPENNE Heer (*dentatum* Kelln.). — Hœnheim; Ottrott, avec le précédent (Bod.).

LONGULUM Grav. — Ottrott (Bod.). — Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

TERMINATUM Grav. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

MULTIPUNCTUM Grav. — Ottrott, en tamisant, fin septembre (Bod.). — Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

Medon Steph.

CASTANEUS Grav. — Riquewihr (Bod.). — Froidefontaine, deux ex. dans un nid de taupe (de Brunier).

BRUNNEUS Er. — Forêt de Champenoux, sous des feuilles mortes, en août (Vouaux); Froidefontaine, dans les nids de taupes, très commun (de Brunier).

FUSCULUS Mannh. — La Malgrange, sous les pierres, fin août (Vouaux); Epinal (Host).

RIPICOLA Kr. — Messein, un ex. dans des débris, com. mars (Vouaux); Epinal (Host).

APICALIS Kr. — La Malgrange, un ex. au vol, com. mai (Vouaux).

* PROPINQUUS Bris. (*vicinus* Bris., *melanocephalus* Duv., *laetus* Thoms.). — Froidefontaine, dans les nids de taupes, extrêmement commun (de Brunier).

BICOLOR Oliv. — Ottrott (Bod.). — Blainville, dans des débris, en mai (Vouaux).

MELANOCEPHALUS F. — Strasbourg : forêt du Rhin; Ottrott, en tamisant, en septembre (Bod.). — Epinal (Host).

OBSOLETUS Nordm. — La Malgrange, dans des détritus, com. mars; Montaigu (Vouaux); Epinal (Host).

OCHRACEUS Grav. — Ottrott (Bod.). — Epinal (Host).

Scopaeus Kraatz

LAEVIGATUS Gyllh. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, sur la vase le long de la digue du Rhin (Sch.). — Laître-sous-Amance, com. septembre (Vouaux).

MINIMUS Er. — Strasbourg : dans des détritus aux environs du couvent du Bon-Pasteur, deux ind. (Sch.).

Domene Fauvel

SCABRICOLLIS Er. — Achenheim, bords du canal de la Bruche (Bod.); Mutzig, un ind. (Sch.).

Stilicus Latr.

ANGUSTATUS Fourcr. — Messein, dans des débris, fin octobre (Vouaux); Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

SUBTILIS Er. — Ottrott (Bod.). — Epinal (Host).

SIMILIS Er. — Laître-sous-Amance, sous les pierres, fin avril (Vouaux); Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

RUFIPES Germ. — Hœnheim; Ottrott, en tamisant (Bod.); Zeinheim (Sch.). — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

ORBICULATUS Payk. — Avec le précédent, en très grand nombre (Bod.); Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Saverne; Avolsheim; Plobsheim; Barr (Sch.).

Astenus Steph.

FILIFORMIS Latr. — Strasbourg : au Wacken (Sch.). — Ottrott, en tamisant (Bod.).

Paederus Fabr.

LITORALIS Grav. — Ottrott; Saint-Nabor, sous des feuilles mortes humides, en grand nombre (Bod.). — Epinal (Host).

BREVIPENNIS Lac. — Ottrott, quelques ex. en tamisant fin septembre (Bod.). — Messein, sous des débris, com. mars (Vouaux).

RIPARIUS L. — Avec le précédent (Vouaux).

RUFICOLLIS F. — Hœnheim (Bod.). — Champigneulles (Host).

GEMELLUS Kr. — Plobsheim (Sch.).

STENINI

Dianous Samouelle

COERULESCENS Gyllh. — Zeinheim (Sch.).

Stenus Latr.

GUTTULA Müll. — Muttersholz (Kraencker). — Epinal (Host).

ATERRIMUS Er. — Blainville, avec *Formica rufa*, com. avril (Vouaux).

ASPHALTINUS Er. — Messein, sous des débris, en automne (Vouaux).

FOSSULATUS Er. — Trois-Epis (Sch.).

NANUS Steph. — Strasbourg : au Jardin botanique, sous les pierres, le long de l'étang (Sch.).

CIRCULARIS Grav. — Ottrott, en tamisant (Bod.).

* PUMILIO Er. — Epinal, détritus des bords de la Moselle (Host).

HUMILIS Er. — Bosserville, sous des débris, fin avril (Vouaux); Epinal (Host).

BIMACULATUS Gyllh. — Saverne (Sch.); Ottrott, en tamisant (Bod.). — Laître-sous-Amance (Vouaux).

CLAVICORNIS Scop. — Achenheim; Ottrott, en nombre (Bod.); col de La Schlucht (Sch.). — Epinal (Host).

PROVIDUS Er. — Hœnheim; Ottrott; Saint-Nabor; Boersch (Bod.). — Epinal (Host).

JUNO Payk. — Epinal (Host); Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

LONGITARSIS Thoms. — La Malgrange, un ex. com. mars (Vouaux).

MORIO Grav. — Col de La Schlucht (Sch.). — La Malgrange, dans des débris, com. novembre (Vouaux).

PALPOSUS Zett. — Strasbourg : Ile des Epis (Sch.).

FUSCIPES Grav. — Ottrott, en nombre (Bod.). — Epinal (Host); Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

Tesnus Rey

OPTICUS Grav. — Blainville, dans des débris, com. avril (Vouaux).

NIGRITULUS Gyllh. — Laître-sous-Amance, fin octobre; Jarny (Vouaux).

BRUNNIPES Steph. — Ottrott, en nombre (Bod.). — Champigneulles, dans des débris, en avril (Vouaux); Froidefontaine, dans des nids de taupes (de Brunier).

Hypostenus Rey

LATIFRONS Er. — Hœnheim, dans les détritus, le long du canal du Rhône au Rhin (Bod.). — Champigneulles, dans des débris, en avril (Vouaux); Epinal (Host).

FULVICORNIS Steph. — Champigneulles, dans des débris, en avril (Vouaux).

SIMILIS Herbst. — Hœnheim, avec le précédent (Bod.). —

SOLUTUS Er. — Champigneulles, dans des débris, en avril et mai (Vouaux).

CICINDELOIDES Schall. — Hœnheim (Bod.); Hangenbieten (Sch.). — Messein, en octobre; Epinal (Host).

Hemistenus Motsch.

PUBESCENS Steph. — Ottrott, en tamisant (Bod.).

PALLITARSIS Steph. — Jarny, fin juillet (Vouaux).

PICIPES Steph. — Ronchamp (Host).

BIFOVEOLATUS Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Roches de La Burre (Sainte-Claire Deville).

FLAVIPES Steph. — Epinal (Host).

Parastenus Heyden

(**Mesostenus** Rey)

SUBAENEUS Er. — Champigneulles, dans des débris en avril (Vouaux).

FUSCICORNIS Er. — Messein, en automne (Vouaux).

PALLIPES Grav. — Idem, en mai (idem); Epinal (Host).

ACERIS Steph. — Lauterbourg; forêt de Brumath (Sch.). — Champigneulles, dans des débris, en avril (Vouaux).

IMPRESSUS Germ. — Molsheim (Sch.).

PALUSTRIS Er. — Messein, dans des débris, en mars (Vouaux).

ERICHSONI Rey. — Saverne (Sch.). — Messein, dans des débris, en mars (Vouaux); Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

MONTIVAGUS Heer. — Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville).

EUAESTHETINI

Euaesthetus Gravenh.

BIPUNCTATUS Ljungh. — La Malgrange; Laître-sous-Amance, dans des débris (Vouaux).

RUFICAPILLUS Lac. — Champigneulles, dans des débris, en avril (Vouaux).

OXYTELINI

Oxyporus F.

RUFUS L. — Enzheim; Geispolsheim (Sch.); Ottrott; côtes de l'Elsberg et du mont Sainte-Odile, très commun dans les champignons (Bod.). — Epinal, idem (Host).

MAXILLOSUS F. — Saverne; Heiligenberg, dans les *Pleurotus ostreatus*, en nombre (Sch.); col de La Schlucht (Sainte-Claire Deville). — Epinal, dans les champignons (Host).

Platystethus Mannh.

CORNUTUS Grav. — Saverne : côte du Brotschberg (Sch.) — Epinal (Host).

v. alutaceus Thoms. — Forêt de Brumath (Sch.). — Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

Oxytelus Gravenh.

rugosus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Ribeauvillé; Colmar; Thann (Sch.); Ottrott; Barr (Bod.).

insecatus Grav. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Reichstett (Sch.).

fulvipes Er. — Grendelbruch (Sch.).

piceus L. — Saverne (Sch.). — Epinal (Host).

inustus Grav. — Sundhausen (Sch.). — La Malgrange, au vol, en octobre (Vouaux); Epinal (Host).

* Saulcyi Pand. — Froidefontaine, dans des nids de taupes (de Brunier).

clypeonitens Pand. — Barr, côte du Kirchberg, un ind.

hamatus Fairm. — La Malgrange, sur peupliers, en mai (Vouaux).

Haploderus Steph.

caelatus Grav. — Ottrott, en grand nombre, en tamisant (Bod.). — Epinal (Host).

Bledius Mannh.

spectabilis Kr. — Riquewihr (Bod.). — Epinal (Host).

opacus Block. — Sundhausen (Sch.). — La Malgrange, au vol, com. mai (Vouaux).

* atricapillus Germ. — Grendelbruch, en août (Sch.).

* v. nanus Er. — Terrains salifères de Dieuze (Sch.).

* DEFENSUS Fauv. — Hohneck (Sch.). — Signalé aussi de Hesse.

FRACTICORNIS Payk. — Messein, com. juin (Vouaux).

* LONGULUS Er. (*ruficornis* Rey). — Strasbourg : forêt du Rhin (Reiber, Sch.).

DISSIMILIS Er. — Laître-sous-Amance, dans le jardin de la cure, en mai (Vouaux).

SUBTERRANEUS Er. — Messein, fin avril (Vouaux).

Trogophloeus Mannh.

Thinodromus Kraatz

DILATATUS Er. — Messein, dans des détritus, com. mars (Vouaux).

Trogophloeus in sp.

BILINEATUS Steph. — Froidefontaine, dans un nid de taupe (de Brunier).

RIVULARIS Motsch. — Blainville, dans des débris, en avril (Vouaux).

* HALOPHILUS Kiesw. — Laneuveville, dans les mares salées, en mars (Vouaux).

Taenosoma Mannh.

PUSILLUS Grav. — Epinal (Host).

GRACILIS Mannh. — Strasbourg : à l'Orangerie, sur sol sablonneux (Sch.).

Thinobius Kiesw.

LONGIPENNIS Heer. — Messein, dans des débris, en mars (Vouaux).

* MINUTISSIMUS Fauv. — Etueffont, un ex. en criblant le terreau d'une souche de chêne (de Brunier). — Cette rare espèce capturée par le Dr Skalitzky à Brandeis près de Prague, au bord de l'Elbe, a été également trouvée près de Gien, au bord de la Loire, par M. Pyot.

Coprophilus Latr.

STRIATULUS F. — Achenheim (Bod.). — Epinal (Host).

Syntomium Curtis

AENEUM Müll. — Etueffont, assez commun en criblant la mousse des rochers, des souches, le bois pourri. Printemps et automne (de Brunier).

Deleaster Er.

DICHROUS Grav.— Forêt de Champenoux, en mai (Vouaux); Epinal (Host).

OMALINI

Anthophagus Gravenh.

BICORNIS Block. — Col de La Schlucht, en juillet (Vouaux).

* V. NIVALIS Rey. — Avec la forme typique (id.).

PRAEUSTUS Müll. — Epinal (Host).

Lesteva Latr.

PUBESCENS Mannh. — Jarny, dans le jardin de la cure (Vouaux); Epinal (Host).

LONGELYTRATA Goeze. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Brumath; Mutzig; Scherwiller (Sch.).

Orochares Kraatz

ANGUSTATA Er. — Stambach; maison forestière de Haberacker (Sch.).

Olophrum Er.

PICEUM Gyllh. — Colline de Molsheim (Sch.). — Laître-sous-Amance, dans des détritus, com. avril (Vouaux); Roches de La Burre, en avril (Sainte-Caire Deville).

Lathrimaeum Er.

UNICOLOR Marsh. — La Malgrange, dans des débris, fin octobre (Vouaux); Epinal (Host).

ATROCEPHALUM Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); col de La Schlucht. — La Malgrange, dans des débris, en avril (Vouaux); Epinal, en compagnie du précédent (Host).

MELANOCEPHALUM Illig. — Ottrott (Bod.). — La Malgrange, dans des débris, en novembre (Vouaux).

Xylodromus Heer

* AFFINIS Gerh. — Le Rudlin; Froidefontaine, dans les nids de taupes, en hiver, sept ex. dont deux couples (de Brunier).

TESTACEUS Er. — Hohneck, en juin (Sch.).

Omalium Grav.

PLANUM Payk. — Schirmeck (Sch.). — Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

MONILICORNE Gyllh. — La Maix, sous des écorces, en mai (Vouaux).

PUSILLUM Grav. — Laître-sous-Amance, sous des écorces, en septembre (Vouaux).

MINIMUM Er. — Mont-sur-Meurthe, sous des écorces de hêtre et de chêne, en octobre (Vouaux).

ALLARDI Fairm. — Epinal (Host).

* LATICOLLE Kr. (*cordicolle* Fauv.). — Saint-Nabor (Bod.).

NIGRICEPS Kiesw. — Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville).

CAESUM Grav. — Saverne (Sch.); Ottrott, en nombre, en tamisant (Bod.). — Epinal (Host).

VILE Er. — Plateau d'Amance, en novembre (Vouaux).

IOPTERUM Steph. — La Malgrange, dans les mousses, en automne (Vouaux); Froidefontaine (de Brunier).

FLORALE Payk. — Laître-sous-Amance (Vouaux).

STRIATUM Grav. — Mollkirch (Sch.).

Anthobium Steph.

Eusphalerum Kraatz

ABDOMINALE Grav. — Forêt de Brumath; Truchtersheim (Sch.). — Vallée de la Madeleine, sur les fleurs à ombelles (de Brunier).

SIGNATUM Maerk. — La Maix, en mai (Vouaux).

ATRUM Heer. — Laître-sous-Amance, dans un grenier, en novembre (Vouaux).

MINUTUM F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Hohneck, en juin (Sch.).

MARSHAMI Fauv. — Blainville, en mai (Vouaux).

OPHTHALMICUM Payk. — Barr, en très grand nombre (Sch.).

Anthobium in sp.

LONGIPENNE Er. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

MONTIVAGUM Heer. — Hohneck, en grand nombre, sur différentes fleurs, en juin (Sch.).

ALPINUM Heer. — Col de La Schlucht, en juin (Vouaux); Hohneck, avec le précédent (Sch.).

ANALE Er. — Idem, en juillet (Vouaux).

PROTEINI

Proteinus Latr.

OVALIS Steph. — Ottrott, en nombre, en tamisant (Bod.).

BRACHYPTERUS F. — Avec l'espèce précédente et aussi abondant (id.).

* LIMBATUS Maekl. (*crenulatus* Pand., *Maeklini* Fauv.). — Col de La Schlucht, un ind. ♂ (Sainte-Claire Deville).

MACROPTERUS Gyllh. — La Malgrange, dans des détritus, en automne (Vouaux).

ATOMARIUS Er. — Ottrott, en tamisant (Bod.).

Megarthrus Steph.

DENTICOLLIS Beck. — Ottrott (Bod.). — La Malgrange, au vol, en octobre (Vouaux).

HEMIPTERUS Ill. — La Malgrange, dans les champignons (Vouaux).

PHLOEOCHARINI

Phloeocaris Mannh.

SUBTILISSIMA Mannh. — Forêt de Haguenau, sous des amas de bois mort; Molsheim (Sch.).

PIESTINI

Siagonium Kirby

(**Prognatha** Latr.)

QUADRICORNE Kirby. — La Malgrange, sur les ormes, com. mars (Vouaux).

MICROPEPLIDAE

Micropeplus Latr.

FULVUS Er. — La Malgrange, au vol ,en octobre (Vouaux).

LONGIPENNIS Kr. — Saverne; Barr, dans des débris (Sch.).

PSELAPHIDAE

EUPLECTINI

Trimium Aubé

BREVICORNE Reichb. — Forêt de Champenoux, dans les mousses, com. avril (Vouaux).

Euplectus Leach

Fischeri Aubé. — Etueffont, en mai; pentes du Fayet, en criblant la mousse des souches de hêtres (de Brunier).

nanus Reichb. — Laître-sous-Amance; La Malgrange (Vouaux); Etueffont, en criblant les vieilles souches (de Brunier).

signatus Reichb. — Laître-sous-Amance, dans des détritus, fin septembre (Vouaux).

Karsteni Reichb. — Grand-Charmont, au printemps; Nommay, en automne, en criblant la vermoulure des arbres fruitiers (de Brunier).

ambiguus Reichb. — Laître-sous-Amance; La Malgrange (Vouaux); Froidefontaine, durant l'hiver 1915-16 extraordinairement abondant en criblant la mousse des chênes (de Brunier).

minutissimus Aubé. — Avec le précédent et presque aussi abondant (de Brunier).

TRICHONYCHINI

Amauronyx Reitter

Maerkeli Aubé. — La Malgrange, dans un saule, en juin (Vouaux).

BATRISINI

Batrisus Lap.

Batrisodes Reitter

* adnexus Hampe. — Forêt de Champenoux, dans du bois pourri avec fourmis, com. octobre (Vouaux).

BRYAXINI

Bryaxis Leach

LEFEBVREI Aubé. — Laître-sous-Amance, bords de l'Amezule, com. avril (Vouaux).

HAEMATICA Reichb. — Ottrott (Bod.). — Laître-sous-Amance, dans le jardin du presbytère (Vouaux).

JUNCORUM Leach. — Ottrott (Bod.). — Laître-sous-Amance, en septembre (Vouaux).

SANGUINEA L. — Vendenheim (Sch.).

BYTHININI

Bythinus Leach

BAUDUERI Reitt. — La Malgrange, sur de la paille pourrie, en août (Vouaux).

COLLARIS Baudi. — Etueffont, dans le terrain d'une souche de chêne, un ex. (de Brunier).

CURTISI Leach. — Strasbourg : La Montagne-Verte; La Wanzenau (Sch.). — Etueffont, dans les vieilles souches (de Brunier); plateau d'Amance, en septembre (Vouaux).

SECURIGER Reichb. — La Malgrange, en août (Vouaux); Etueffont; Froidefontaine, toute l'année dans la mousse des chênes (de Brunier).

DISTINCTUS Chaud. — Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

BURELLI Denny. — Etueffont, en mai; vallée de la Madeleine, une colonie nombreuse dans la mousse et les champignons d'une souche d'aune; Froidefontaine (de Brunier).

VALIDUS Aubé. — Champigneulles, en avril (Vouaux).

PUNCTICOLLIS Denny. — Laître-sous-Amance, dans des débris, en août (Vouaux).

Tychus Leach

NIGER Payk. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof (Sch.). — Etueffont (de Brunier).

V. DICHROUS Schmidt. — Avec la forme typique (de Brunier).

PSELAPHINI

Pselaphus Herbst

HEISEI Herbst. — Strasbourg : Ile Jars, au Wacken (Sch.); Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

DRESDENSIS Herbst. — Environs de La Malgrange, dans des détritus, com. mars (Vouaux).

CTENISTINI

Tyrus Aubé

MUCRONATUS Panz. — Kichompré, en septembre; La Vologne, dans une souche de sapin (de Brunier).

CLAVIGERIDAE

Claviger Preyssler

TESTACEUS Preyssl. — Côte du Schneeberg; maison forestière de Kreuzweg, avec *Lasius flavus* (Sch.).

SCYDMAENIDAE

CEPHENNIINI

Euthia Stephens

SCYDMAENOIDES Steph. — La Malgrange, sur de la paille pourrie, en octobre (Vouaux); Froidefontaine, en criblant la mousse d'un chêne, en décembre (de Brunier).

Cephennium Müller

* PERISPINCTUM Kolen. — Etueffont, en été; Froidefontaine, en criblant la mousse des arbres, en hiver (de Brunier).

GALLICUM Ganglb. — Jarny, dans les mousses, en avril (Vouaux); Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

CYRTOSCYDMINI

Neuraphes Thoms.

ELONGATULUS Müll. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

LONGICOLLIS Mots. — Riquewihr, un ind. (Bod.). — Forêt de Champenoux, en avril (Vouaux).

SPARSHALLI Denny. — Etueffont; bords de la Madeleine (de Brunier).

Cyrtoscydmus Mots.

GODARTI Latr. — Etueffont (de Brunier).

SCUTELLARIS Müll. — Froidefontaine, toute l'année, commun dans les mousses (de Brunier).

COLLARIS Müll. — La Malgrange, dans les mousses, en novembre (Vouaux); Etueffont (de Brunier).

PUSILLUS Müll. — La Malgrange, dans des débris, en octobre et novembre (Vouaux).

Euconnus Thoms.

DENTICORNIS Müll. — Vendœuvre, un ♂ avec *Formica rufa*, fin avril (Vouaux).

WETTERHALLI Gyllh. — Environs de La Malgrange, dans les débris des inondations, com. mars (Vouaux).

SCYDMAENINI

Scydmaenus Latr.

TARSATUS Müll. — Hœnheim; Saint-Nabor (Bod.). — Etueffont, en été, dans le terreau (de Brunier).

HELLWIGI F. — Lauterbourg; Barr, bord de la route vers la maison forestière de Moenkalb (Sch.).

SILPHIDAE

LEPTININI

Leptinus Müller

TESTACEUS Müll. — La Madeleine, en juin, sous la mousse d'un rocher (de Brunier).

CHOLEVINI

Choleva Latr.

ANGUSTATA Er. — Plateau d'Amance, com. juillet (Vouaux); Froidefontaine; Petite-Fontaine, en hiver, dans les nids de taupes (de Brunier).

CISTELOIDES Frœl. — Strasbourg : jardin de l'Hôpital civil (Bod.). — Messein, en octobre (Vouaux); Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

AGILIS Illig. — Laître-sous-Amance, un ex. (Vouaux).

Nargus Thoms.

WILKINI Spence. — La Malgrange, dans des débris, com. avril (Vouaux); Froidefontaine, dans les nids de taupes et en criblant la mousse des chênes (de Brunier).

ANISOTOMOIDES Spence. — La Malgrange, dans des débris, en mars (Vouaux).

Sciodrepa Thoms.

WATSONI Spence. — Strasbourg : Ile Jars; forêt de La Robertsau (Sch.); id., forêt du Neuhof; Achenheim, en grand nombre (Bod.). — Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

Catops Payk.

CORACINUS Kellh. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

— Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

TRISTIS Panz. — Ottrott, en grand nombre (Bod.). — Etueffont, sous un cadavre de taupe, en juillet (de Brunier).

* DORNI Reitt. — Epinal, dans un nid de taupe (Sainte-Claire Deville).

Nemadus Thoms.

COLONOIDES Kr. — Etueffont; Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

Ptomaphagus Illig.

SERICEUS Panz. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod). — Laître-sous-Amance, dans un jardin, en avril (Vouaux).

SERICATUS Chaud. — Ottrott (Bod.). — Laître-sous-Amance; Messein, en mars (Vouaux); Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

Colon Herbst

BRUNNEUM Latr. — Laître-sous-Amance, en été (Vouaux).

SILPHINI

Necrophorus Fabr.

GERMANICUS L. — Strasbourg : place de Haguenau, près de la Porte de Pierres, un ind. au vol (Sch.); Achenheim (Bod.); Zeinheim; Dreispitz, près de Mutzig (Sch.); Mulhouse : au Rebberg (Klein).

HUMATOR Goeze. — Strasbourg : forêt du Rhin; Achenheim; (Bod.); Brumath; Winzenheim; Gugenheim; Reitwiller (Sch.); Mulhouse : au Tannenwald (Klein).

INTERRUPTUS Steph. — Hoerdt; Urmatt (Sch.).

INVESTIGATOR Zett. — Ottrott (Bod.); Brumath; Erstein (Sch.); Mulhouse : au Tannenwald (Klein).

SEPULTOR Charp. — Achenheim (Bod.); Plobsheim, sous le cadavre d'un lièvre (Sch.).

VESTIGATOR Herschel. — Achenheim (Bod.); Mulhouse : au Tannenwald (Klein).

Thanathophilus Leach

LITTORALIS L. — Zeinheim; Reichstett; colline de Hausbergen; Urmatt (Sch.).

DISPAR Herbst. — Saverne : côte du Brotschberg (Sch.).

Oeceoptoma Leach

THORACICA L. — Strasbourg : Fuchs-am-Buckel, sur un cadavre d'*Arion empiricorum*, com. mai (Kraencker); id., La Robertsau, sur le cadavre d'un lapin; id., forêt du Rhin (Klein); id., forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Saverne : vallée de Baerenbach, dans des champignons pourris, en août (Klein); id., forêt du Haut-Barr, dans des excréments humains (Host);[1] Urmatt; côte du Scharrach (Sch.); Pulversheim (Klein). — Blainville, dans des champignons pourris (Host).

Blitophaga Reitter

OPACA L. — Plobsheim, fin mai; Dingsheim (Sch.).

1 Godron a, il y a soixante ans, observé le même fait. Il cite cette espèce comme « assez commune dans les cadavres et *surtout dans les excréments humains* ». Ce fait a été longtemps contesté.

Aclypea Reitter

UNDATA Müll. — Zeinheim, Dingsheim; colline de Hausbergen; Mittelschaeffolsheim (Sch.).

Xylodrepa Thoms.

QUADRIPUNCTATA Schreber. — Strasbourg : forêt du Rhin (Bod); id., forêt de La Robertsau, sur un chêne abattu et en battant les coudriers (Boehé, Klein); Saverne, maison forestière de Haberacker; côte du Scharrach; Schirmeck; Urmatt (Sch.); Mulhouse : forêt de la Hardt (Klein). — Forêt de Vitrimont, en juin; forêt de Champenoux, com. juillet (Vouaux).

Silpha L.

CARINATA Herbst. — Muttersholz (Kraencker).

TYROLENSIS Laich. — Hohneck; ballon de Guebwiller (Sch.).

V. NIGRITA Creutz. — Hohneck (Sch.).

Phosphuga Leach

V. BRUNNEA Herbst. — Hœnheim (Bod., Sch.); Brumath; Vendenheim; Zeinheim (Sch.). — Laître-sous-Amance, en sept. (Vouaux).

Ablattaria Reitter

LAEVIGATA F. — Strasbourg : La Robertsau, dans une

gravière, mi-avril (Klein), forêt du Neuhof (Sch.); forêt de Brumath; Kriegsheim; Geudertheim; Kleinfrankenheim; colline de Hausbergen; Holzheim (Sch.); Saint-Nabor (Bod.). — Epinal (Host).

Necrophilus Latr.

SUBTERRANEUS Dahl. — Strasbourg : La Robertsau, forêt du Rhin, 2 ex. dans un piège contenant le cadavre d'un moineau, fin septembre; id., dans un piège sur le cadavre d'un lapin, fin juin (Klein). [1] — Longemer (Host).

Sphaerites Dufts.

GLABRATUS F. — Col de La Schlucht, fin juin (Vouaux); Mandray; Entre-deux-Eaux, en mai, au vol et sur les graminées; Kichompré, en septembre, dans les champignons pourris des sapinières (de Brunier).

ANISOTOMIDAE

LIODINI

Colenis Erichs.

IMMUNDA Sturm. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

Liodes Latr.

PARVULA Sahl. — Nancy : Fond-de-Toul, un ex. com. juillet (Vouaux).

1 Il est à remarquer que déjà Wencker signalait cette rare espèce des bords du Rhin et amenée par le fleuve, mais sans indication de localité. Les captures de notre ami et collègue, M. Klein, montrent que cette espèce n'est pas exclusivement montagneuse.

BADIA Sturm. — Ottrott (Bod.). — La Malgrange, fin mai (Vouaux).

OVALIS Schmidt. — Strasbourg : près du Wacken; Barr (Sch.).

CALCARATA Er. — Jarny, dans le jardin du presbytère, en juin (Vouaux).

RUBIGINOSA Schmidt. — La Malgrange, com. mai (Vouaux).

* CURTA Fairm. — La Malgrange, ♂ ♀ , com. juin (Vouaux).

Cyrtusa Erichs.

MINUTA Ahrens. — Pompey, fin mai (Vouaux).

AGATHIDIINI

Anisotoma Illiger

HUMERALIS Kugel. — Muttersholz (Kraencker). — Etueffont (de Brunier).

* V. GLOBOSA Payk. (*armata* Steph.). — Blainville, en mai (Vouaux).

AXILLARIS Gyllh. — Strasbourg : La Robertsau, sur *Carex* (Sch.).

GLABRA Kugel. — Vallée de la Madeleine (de Brunier).

ORBICULARIS Herbst. — Blainville, dans les champignons, en mai (Vouaux); Etueffont (de Brunier).

Agathidium Illig.

NIGRIPENNE Kugel. — Roches de la Burre, en avril (Sainte-Claire Deville); Grandvillars (de Brunier).

SEMINULUM L. — Strasbourg : à la Tour-Verte (Sch.). — Etueffont; Froidefontaine (de Brunier).

LAEVIGATUM Er. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Etueffont; Froidefontaine (de Brunier).

BADIUM Er. — Etueffont; Froidefontaine. Commun toute l'année (de Brunier).

MARGINATUM Sturm. — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

NIGRINUM Sturm. — Ottrott (Bod.).

CLAMBIDAE

CLAMBINI

Clambus Fisch.

MINUTUS Sturm. — Riquewihr (Bod.). — Blainville, dans des débris, en avril (Vouaux); Epinal (Host); Etueffont; Froidefontaine. Aussi dans les nids de taupes (de Brunier).

ARMADILLO Deg. — Laître-sous-Amance, sous les écorces pourries, en août (Vouaux); Epinal (Host); avec le précédent (de Brunier).

PUBESCENS Redtb. — Jarny, dans le jardin du presbytère (Vouaux).

CYBOCEPHALINI

Cybocephalus Erichs.

POLITUS Germ. — Cleurie; Mandray (de Brunier).

CORYLOPHIDAE

Sericoderus Steph.

LATERALIS Gyllh. — Epinal, sur les champignons (Host).

Corylophus Steph.

CASSIDOIDES Marsh. — Strasbourg : digue du Rhin, près de l'Altenheimerhof (Sch.).

* SUBLAEVIPENNIS Duv. — Blainville, bords de la Meurthe, dans les débris des inondations, fin avril (Vouaux).

Orthoperus Steph.

BRUNNIPES Gyllh. — Strasbourg : La Montagne-Verte; Fischerinsel (Sch.). — La Malgrange, sur chêne, fin mars (Vouaux).

ATOMUS Gyllh. — Id., com. mai (Vouaux).

ATOMARIUS Heer. — Laître-sous-Amance, dans une cave (Vouaux).

TRICHOPTERYGIDAE

PTENIDIINI

Ptenidium Er.

PUSILLUM Gyllh. — Etueffont, en été, commun; Froidefontaine, en hiver, dans les nids de taupes (de Brunier).

* NITIDUM Heer (*pusillum* Er.). — Laître-sous-Amance, sous les écorces de peuplier, fin mai (Vouaux); Etueffont (de Brunier).

PTILIINI

Ptilium Er.

MINUTISSIMUM Ljungh. — La Malgrange, au vol, com. mai (Vouaux).

EXARATUM Allib. — Vendenheim (Sch.). — Plateau d'Amance, dans des débris, en septembre (Vouaux).

NEUGLENINI

Neuglenes Thoms.

APTERUS Guér. — Plateau d'Amance, sous les écorces (Vouaux).

Aderces Thoms.

SUTURALIS Heer.— Strasbourg : au Wacken et à l'Ile Jars, La Montagne-Verte (Sch.). — Froidefontaine; Etueffont, très commun dans les nids de taupes (de Brunier).

TRICHOPTERYGINI

Trichopteryx Kirby

MONTANDONI Allib. — Vandœuvre, avec *Formica rufa,* en mars (Vouaux).

ATOMARIA Deg. — Etueffont, en été, au vol (de Brunier).

FASCICULARIS Herbst. — Froidefontaine, très commun dans les nids de taupes (de Brunier).

BREVIPENNIS Er. — La Malgrange, sur de la paille pourrie, en octobre (Vouaux).

SERICANS Heer. — Etueffont (de Brunier).

SCAPHIDIIDAE

Scaphidium Oliv.

QUADRIMACULATUM Oliv. — Blainville, sur champignons ligneux (Host).

Scaphosoma Leach

AGARICINUM L. — Blainville, dans les détritus d'inondations, en avril (Vouaux).

ASSIMILE Er. — Bords de l'étang de Champigneulles, en avril et mai (Vouaux).

BOLETI Panz. — Laître-sous-Amance; Messein (Vouaux).

PHALACRIDAE

Phalacrus Payk.

* GROSSUS Er. — Laître-sous-Amance, dans le jardin du presbytère (Vouaux).

* HYBRIDUS Flach. — La Malgrange, en juin (Vouaux).

CORUSCUS Panz. — Schlestadt : route de Châtenois, en grand nombre sous les écorces de platanes, en décembre (Sch.). — Epinal; Remiremont, très commun sur les *Renoncules* (Host).

SUBSTRIATUS Gyllh. — Strasbourg : Ile des Epis, deux ind. sous une écorce de hêtre (Sch.).

Olibrus Erichs.

MILLEFOLII Payk. — La Malgrange; Laître-sous-Amance (Vouaux).

BICOLOR F. — Willgottheim, com. mars (Sch.). — La Malgrange; forêt de Champenoux (Vouaux).

LIQUIDUS Er. — La Malgrange; Laître-sous-Amance (Vouaux); Epinal (Host).

AFFINIS Sturm. — Jarny; La Malgrange (Vouaux); Froidefontaine (de Brunier).

PYGMAEUS Sturm. — La Malgrange; Laître-sous-Amance (Vouaux); Malzéville (Host).

FLAVICORNIS Sturm. — Messein; La Malgrange; Champigneulles (Vouaux).

CORTICALIS Panz. — Jarny; Laître-sous-Amance (Vouaux).

Stilbus Seidlitz

TESTACEUS Panz. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; forêt de Brumath; Donnenheim; Rhinau (Sch.). — La Malgrange; Laître-sous-Amance (Vouaux).

ATOMARIUS L. — Idem. (Vouaux); Houdemont (Host).

OBLONGUS Er. — Strasbourg : digue du Rhin, près de la Robertsau (Sch.). — Champigneulles ; Vandœuvre (Vouaux).

EROTYLIDAE

DACNINI

Dacne Latr.

(**Engis** Payk.)

RUFIFRONS F. — Saverne (Sch.).

TRIPLACINI

Triplax Payk.

COLLARIS Schall. — Colmar (Sch.).

ENDOMYCHIDAE

DAPSINI

Lycoperdina Latr.

BOVISTAE F. — Ottrott; côte du Maennelstein (Bod.).

Mycetina Muls.

CRUCIATA Schall. — Saint-Nabor, sous du vieux bois, un ind. (Bod.).

ENDOMYCHINI

Endomychus Panz.

COCCINEUS L. — Forêt de Champenoux (Vouaux).

CRYPTOPHAGIDAE

TELMATOPHILINI

Telmatophilus Heer

BREVICOLLIS Aub. — Strasbourg : digue du Rhin, près de La Robertsau (Sch.). — Muttersholz (Kraencker). —

Laître-sous-Amance, com. juin (Vouaux).

CRYPTOPHAGINI

Emphylus Er.

GLABER Gyllh. — Blainville, avec *Formica rufa*, com. avril (Vouaux).

Paramecosoma Curtis

MELANOCEPHALUM Herbst. — Raon-l'Etape, bords de la Meurthe, com. avril (Vouaux).

Cryptophagus Herbst

Cryptophagus in sp.

LYCOPERDI Herbst. — Zeinheim (Sch.).

PILOSUS Gyllh. — La Malgrange, dans des détritus, avril (Vouaux).

* PUNCTIPENNIS Bris. — Strasbourg : dans une cave sur de la paille pourrie (Sch.).

SETULOSUS Sturm. — La Malgrange, au vol, en octobre (Vouaux).

AFFINIS Sturm. — Laître-sous-Amance (Vouaux).

CELLARIS Scop. — Strasbourg : dans des pommes pourries et desséchées (Sch.). — Saint-Georges, en novembre (Vouaux).

ACUTANGULUS Gyllh. — La Malgrange, au vol, en octobre (Vouaux).

BADIUS Sturm. — Moulin de Donnenbach (Kraencker). — Laître-sous-Amance, en septembre (Vouaux).

DISTINGUENDUS Sturm. — Idem (Vouaux).

DORSALIS Sahlb. — Jarny, dans le jardin du presbytère (Vouaux).

* FUSCICORNIS Sturm. — La Malgrange, dans des détritus, en novembre (Vouaux).

* LABILIS Er. — Avec le précédent (Vouaux).

DENTATUS Herbst. — La Malgrange; Jarny, en juillet (Vouaux).

HIRTULUS Kr. — La Malgrange (Vouaux).

Micrambe Thoms.

VINI Panz. — Zeinheim, 4 ind. sous un amas de feuilles mortes (Sch.).

ATOMARIINI

Atomaria Steph.

FIMETARII Herbst. — Ludres (Host).

LINEARIS Steph. — Mittelschaeffolsheim; Fessenheim, sous des débris de végétaux en décomposition (Sch.).

MESOMELAENA Herbst. — Blainville, en avril (Vouaux).

GUTTA Steph. — Strasbourg : dans des détritus, derrière l'Orangerie (Sch.).

GRAVIDULA Er. — Chaudeney (Sainte-Claire Deville).

NITIDULA Heer. — Strasbourg : La Montagne-Verte, sous du bois mort, un ind. (Sch.).

ATRICAPILLA Steph. — Ottrott; Saint-Nabor; Barr (Bod.).

ATRA Herbst. — La Malgrange, dans les mousses, en novembre (Vouaux).

PELTATA Kr. — Jarny, en mai (Vouaux).

PUSILLA Payk. — Laître-sous-Amance, dans un grenier (Vouaux).

* VERSICOLOR Er. (*ornata* Reitt.). — Ottrott (Bod.).

ORNATA Heer (*contaminata* Er.). — Achenheim (Bod.).

APICALIS Er. — Plateau d'Amance, en septembre (Vouaux).

RUFICORNIS Marsh. — Ottrott (Bod.). — La Malgrange, dans des détritus (Vouaux).

ANALIS Er. — Ottrott (Bod.). — Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

* GIBBULA Er. — Vandœuvre, dans des détritus, fin avril (Vouaux).

* RUBRICOLLIS Bris. — Jarny, en avril (Vouaux).

Ephistemus Steph.

GLOBULUS Payk. — Achenheim; Ottrott (Bod.). — La Malgrange, dans des débris, en octobre (Vouaux).

EXIGUUS Er.— Messein, dans des débris, en mars (Vouaux).

LATHRIDIIDAE

DASYCERINI

Dasycerus Brongniart

SULCATUS Brongn. — Plobsheim, sous des amas de feuilles mortes (Sch.).

LATHRIDIINI

Lathridius Herbst

LARDARIUS Deg. — Strasbourg : au Wacken, deux ind. dans des débris d'inondation (Sch.).

ANGUSTICOLLIS Gyllh. — Achenheim; Ottrott; Riquewihr (Bod.).

PANDELLEI Bris. — Barr, deux ind. (Sch.).

RUGICOLLIS Oliv. — Schirmeck (Sch.).

Coninomus Thoms.

CONSTRICTUS Gyllh. — Côte de l'Elsberg (Bod.).

NODIFER Westw. — Barr (Sch.). — Laître-sous-Amance, en septembre (Vouaux).

Cartodere Thoms.

* ELEGANS Aubé. — Laître-sous-Amance, dans une souche pourrie du jardin du presbytère (Vouaux).

ELONGATA Curtis. — Laître-sous-Amance (Vouaux).

RUFICOLLIS Marsh. — Saint-Georges (Vouaux).

FILIFORMIS Gyllh. — La Malgrange (Vouaux).

FILUM Aubé. — Idem, dans les champignons, en octobre (Vouaux).

CORTICARINI

Corticaria Marsh.

PUBESCENS Gyllh. — Laître-sous-Amance, dans les greniers, en avril (Vouaux).

CRENULATA Gyllh. — La Malgrange, en octobre (Vouaux).

FULVA Comolli. — Strasbourg : Ile des Epis, dans des débris (Sch.). — Laître-sous-Amance, sur de la paille pourrie (Vouaux).

UMBILICATA Beck. — Idem, dans des débris, en août (Vouaux).

IMPRESSA Oliv. — Idem, en avril (Vouaux).

* ROBUSTA Ganglb. — Strasbourg : derrière l'Orangerie, dans des débris (Sch., Reitter, *det.*).

SERRATA Payk. — Ottrott (Bod.).

ELONGATA Gyllh. — Hœnheim; Ottrott; Saint-Nabor (Bod.); Zeinheim (Sch.). — La Malgrange, dans les mousses, en octobre (Vouaux).

Melanophthalma Motsch.

DISTINGUENDA Comolli. — Laitre-sous-Amance, dans des débris, en août (Vouaux).

Corticarina Reitter

GIBBOSA Herbst. — Bouxières-aux-Bois (Host); Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

SIMILATA Gyllh. — La Malgrange, en octobre (Vouaux).

FUSCULA Gyllh. — Vendenheim (Sch.); Ottrott, en grand nombre (Bod.).

TRUNCATELLA Mannh. — Moulin de Donnenbach (Kraenecker). — Jarny, en septembre; La Malgrange, en octobre (Vouaux).

* FULVIPES Comolli. — Plateau d'Amance, en novembre (Vouaux).

MYCETOPHAGIDAE

Pseudotriphyllus Reitter

* SUTURALIS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

Mycetophagus Hellwig

QUADRIPUSTULATUS L. — Forêt de Champenoux (Host).

PICEUS F. — La Malgrange (Vouaux).

* v. HISTRIO Sahlb. — Strasbourg : au Wacken, le 18 février (Sch.).

NITIDULIDAE

BRACHYPTERINI

Heterhelus Duval

SOLANI Heer. — Jarny, en juillet (Vouaux).

Brachypterus Kugelann

GLABER Steph. — La Malgrange, en juin (Vouaux).

URTICAE F. — Dreispitz, près de Mutzig (Sch.). — La Malgrange, en juin (Vouaux).

CARPOPHILINI

Carpophilus Leach

DECIPIENS Horn. — Cette espèce importée d'Amérique (Cf. Suppl. I, p. 145), s'acclimate de plus en plus à Strasbourg. Depuis 1906, on la retrouve chaque année.

NITIDULINI

Epuraea Erichs.

MELINA Er. — Hindisheim (Kraencker); Klingenthal (Bod.).

DELETA Er. — Strasbourg : sur une plaie d'un aune, près du couvent du Bon-Pasteur (Sch.).

NEGLECTA Heer. — Bosserville, dans les champignons (Host).

OBSOLETA F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Vandœuvre (Host).

BOREELLA Zett. — Champigneulles (Vouaux).

PYGMAEA Gyllh. — Col de La Schlucht (Vouaux). — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

PUSILLA Illig. — Ottrott (Bod.).

Micrurula Reitter

MELANOCEPHALA Marsh. — La Malgrange et environs, au vol, en juin (Vouaux).

Nitidula Fabr.

BIPUNCTATA L. — Strasbourg : prés du Wacken; Saverne (Sch.).

FLAVOMACULATA Rossi. — Zeinheim (Sch.).

RUFIPES L. — La Malgrange, en avril (Vouaux); Epinal (Host).

Omosita Erichs.

DEPRESSA L. — Ottrott, un ex. (Bod.). — Docelles, dans les champignons, en avril (Vouaux).

Amphotis Erichs.

MARGINATA F. — Riquewihr, en grand nombre (Bod.). — Bords de l'étang de Champigneulles, en avril (Vouaux).

Meligethes Steph.

HEBES Er. — Docelles (Vouaux).

LUMBARIS Sturm. — La Malgrange (Vouaux).

CORACINUS Er. — Idem (Vouaux).

VIRIDESCENS v. AZUREUS Heer. — Dorlisheim; Grendelbruch (Sch.).

GRACILIS Bris. — Idem (Vouaux).

SYMPHYTI Heer. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

CORVINUS Er. — La Malgrange, en mai; Jarny (Vouaux).

SUBRUGOSUS Gyllh. — Moulin de Donnenbach (Kraencker).

v. SUBSTRIGOSUS Er. — Blainville, en avril (Vouaux).

VIDUATUS Sturm. — La Malgrange (Vouaux).

* ROTUNDICOLLIS Bris. — Laître-sous-Amance, sur *Taraxacum officinale*, fin avril (Vouaux).

CYCHRAMINI

Cychramus Kugelann

QUADRIPUNCTATUS Herbst. — Entre-deux-Eaux; Kichompré, dans les champignons des sapinières (de Brunier).

LUTEUS F. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Barr; Ribeauvillé (Sch.). — Epinal; Chavigny (Host).

v. FUNGICOLA Heer. — Strasbourg, avec le type (Sch.). — Entre-deux-Eaux; Kichompré, dans les champignons des sapinières (de Brunier).

Cyllodes Erichs.

ATER Herbst. — Côte du Maennelstein, dans *Boletus edulis* (Sch.).

PITYOPHAGINI

Cryptarcha Shuckard

STRIGATA F. — Forêt de Champenoux, sous les écorces, en août (Vouaux); Froidefontaine, en hiver, sous les mousses sèches (de Brunier).

IMPERIALIS F. — Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

Glischrochilus Murray

QUADRIPUNCTATUS Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Stambach (Host); Schirmeck (Sch.). — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville); Epinal (Host).

QUADRIGUTTATUS Oliv. — Faymont (Host).

QUADRIPUSTULATUS L. — Saverne : vallée de Baerenbach (Host); côte du Mont Sainte-Odile (Sch.).

Pityophagus Shuckard

FERRUGINEUS L. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville); Entre-deux-Eaux (de Brunier); Epinal (Host).

RHIZOPHAGINI

Rhizophagus Herbst

DEPRESSUS L. — La Malgrange, sur conifères, en avril (Vouaux); roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

FERRUGINEUS Payk. — Trois-Epis (Sch.). — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

PERFORATUS Er. — La Malgrange, sur hêtre, fin mars (Vouaux).

NITIDULUS F. — La Malgrange, sur conifères, en avril (Vouaux).

DISPAR Payk. — Herrenwald, près de Vendenheim (Sch.). — Epinal (Host).

AENEUS Richter. — Strasbourg : au Wacken, dans une vieille souche de pin (Sch.).

TEMNOCHILIDAE

TEMNOCHILINI

Tenebroides Piller

MAURITANICUS L. — Strasbourg : Manutention militaire, en quantité innombrable dans la balayure, com. octobre 1917, en compagnie de CALANDRA GRANARIA L. et ORYZAE L.

COLYDIIDAE

ORTHOCERINI

Diodesma Latr.

SUBTERRANEA Er. — Aydoille (Vouaux).

COXELINI

Coxelus Latr.

PICTUS Sturm. — Baccarat, sous les écorces de chêne (Vouaux).

CERYLONINI

Cerylon Latr.

DEPLANATUM Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Epinal (Host).

CUCUJIDAE

CUCUJINI

Phloeostichus Redtenb.

DENTICOLLIS Redtb. — Au Molkenrain, dans les Hautes-Vosges, fin décembre 1915, sur la neige, un ex. (Gruardet).

Laemophloeus Steph.

MONILIS F. — Strasbourg : digue du Rhin, près de La Robertsau, sous une écorce d'aune (Sch.).

TESTACEUS F. — Blainville, en septembre (Vouaux).

DUPLICATUS Waltl. — Forêt de Champenoux, en août (Vouaux).

FERRUGINEUS Steph. — Strasbourg : en très grand nombre dans de la balayure provenant de la Manutention militaire, en mai 1917 (Sch.). — La Malgrange, sous les écorces de *Pinus strobus,* fin février (Vouaux).

ULEIOTINI

Dendrophagus Schoenh.

CRENATUS Payk. — Faymont (Host).

Uleiota Latr.

PLANATA L. — Pompey, sous les écorces de sapin, en mai (Vouaux).

PSAMMOECINI

Psammoecus Latr.

BIPUNCTATUS F. — Messein, dans des débris, en mai (Vouaux).

SILVANINI

Airaphilus Redtb.

GEMINUS Kr. — Côte du Climont, deux ind. (Sch.).

Silvanus Latr.

SURINAMENSIS L. — Strasbourg : à la Manutention militaire, en quantité innombrable, durant la guerre (Sch.).

UNIDENTATUS F. — Forêt de Champenoux, en août (Vouaux).

BIDENTATUS F. — Strasbourg : La Robertsau (Sch.). — Blainville, dans des détritus, en septembre (Vouaux).

FAGI Guér. — Thann, dans un amas de vieux bois (Sch.).

MONOTOMINI

Monotoma Herbst

CONICICOLLIS Guér. — Vandœuvre, avec *Formica rufa*, en mars (Vouaux).

ANGUSTICOLLIS Gyllh. — Idem, en juin (Vouaux).

SPINICOLLIS Aubé. — Laître-sous-Amance, en septembre (Vouaux).

QUADRICOLLIS Aubé. — Idem (Vouaux).

PICIPES Herbst.— La Malgrange, au vol, en mai (Vouaux).

LONGICOLLIS Gyllh. — Idem, sous les écorces de peuplier, en mai (Vouaux).

BREVIPENNIS Kunze. — Strasbourg : au Wacken, sous un amas de feuilles mortes (Sch.).

DERMESTIDAE

Dermestes L.

FRISCHII Kugel. — Strasbourg : forêt du Rhin, sous de petits cadavres (Bod.); Saverne; Brumath (Sch.). — La Malgrange, en avril (Vouaux).

LANIARIUS Illig. — Strasbourg : Kronenbourg; Mundolsheim; Urmatt; Sainte-Odile (Sch.). — Laître-sous-Amance, sur la route, en juin (Vouaux).

MUSTELINUS Er. — Idem, en mai (Vouaux).

TESSELLATUS Er. — Hoenheim (Sch.).

CADAVERINUS F. — Strasbourg : au Wacken, forêt de La Robertsau; Herrenwald, près de Vendenheim; Drusenheim (Sch.).

BICOLOR F. — Aubure, Hohneck (Sch.). — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

Trogoderma Latr.

VERSICOLOR Creutz. — Strasbourg : La Meinau, deux ind., sur *Cynara cardunculus,* dans un jardin (Sch.).

* MEGATOMOIDES Reitter. — La Malgrange, le 21 juillet 1914 (Vouaux). [1] — C'est une espèce très nuisible aux collections d'insectes et qui nous vient probablement du Mexique.

GLABRUM Herbst. — La Malgrange, dans des débris; Jarny (Vouaux).

Ctesias Steph.

SERRA F. — Laître-sous-Amance; environs de La Malgrange, en juin (Vouaux).

Anthrenus Fabr.

PIMPINELLAE F. — Froidefontaine. Très abondant l'hiver dans les vieux nids d'hirondelles, où vit la larve (de Brunier).

BYRRHIDAE

NOSODENDRINI

Nosodendron Latr.

FASCICULARE Oliv. — Strasbourg : au Wacken, aux plaies des aunes (Weigand); id., forêt du Neuhof (Sch.). — Avenue de La Malgrange (Vouaux); roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

1 Trouvé par l'abbé L. Vouaux dans sa chambre. C'était la dernière capture intéressante du savant entomologiste. Quelques jours plus tard, l'abbé Vouaux vint à la cure de Jarny remplacer son frère mobilisé, où il fut fusillé par des Bavarois commandés par le MAJOR VON KAYSER.

BYRRHINI

Syncalypta Steph.

PALEATA Er. — Plobsheim, dans des débris d'inondation, sur terrain sablonneux (Sch.).

STRIATOPUNCTATA Steff. — Strasbourg : digue du Petit-Rhin en amont du pont (Sch.). — Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

SPINOSA Rossi. — Laître-sous-Amance, sur le sable, de mars en mai (Vouaux).

Porcinolus Muls.

MURINUS F. — Plateau d'Amance, dans l'herbe, com. avril (Vouaux).

Byrrhus L.

GLABRATUS Heer. — Ottrott (Bod.); Heiligenberg; Urmatt; Rothau; col de La Schlucht (Sch.). — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

LUNIGER Germ. — Avec le précédent, mais en beaucoup plus grand nombre (Bod.).

FASCIATUS Forst. — Plobsheim (Sch.). — Alberschwiller (Sch.).

PUSTULATUS Forst. — Strasbourg : La Montagne-Verte; Saint-Blaise; Schlestadt; Barr (Sch.).

Cytilus Erichs.

SERICEUS Forst. — Strasbourg : au Wacken (Sch.); Hoenheim; Ottrott; Saint-Nabor (Bod.); Waltenheim; Drusenheim; Mollkirch (Sch.).

Pedilophorus Steffahny

NITENS Panz. — Barr (Sch.).

Simplocaria Marsham

SEMISTRIATA F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod. Sch.).

LIMNICHINI

Limnichus Latr.

SERICEUS Duft. — Strasbourg : Ile Jars, deux ind. dans des débris d'inondation (Sch.).

HISTERIDAE

HOLOLEPTINI

Hololepta Payk.

PLANA Sulz. — Scierie de Nomexy (Host).

HISTERINI

Platysoma Leach

FRONTALE Payk. — Lac Blanc (Sch.). — Houdemont, sous les écorces, en avril; Laître-sous-Amance (Vouaux).

COMPRESSUM Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Sch.). — Forêt de Lauw, très commun au premier printemps, sous les écorces des chênes (de Brunier).

OBLONGUM F. — Geudertheim, fin janvier, sous une écorce de *Pinus silvestris,* un ind. (Loppinet). — Jarny, en mai (Vouaux).

Hister L.

INEQUALIS Oliv. — Col de La Schlucht; Hohneck (Sch.).

MERDARIUS Hoffm. — La Vancelle (Sch.). — Méroux, en criblant le guano d'un poulailler (de Brunier).

SUCCICOLA Thoms. — La Maix, au vol, en mai (Vouaux).

TERRICOLA Germ. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Forêt de Champenoux (Vouaux).

STERCORARIUS Hoffm.— Ottrott (Bod.). — Petite-Fontaine; Froidefontaine, dans les prés, au pied des arbres fruitiers isolés, en arrachant les mottes de gazon (de Brunier).

FIMETARIUS Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Schirmeck (Sch.).

PURPURASCENS Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Saverne (Sch.). — Messein, dans des détritus, com. mai (Vouaux).

MARGINATUS Er. — Petite-Fontaine; Froidefontaine, en criblant les nids de taupes (de Brunier).

NEGLECTUS Germ. — Strasbourg : forêt de La Robertsau; forêt de Brumath (Sch.). — Laître-sous-Amance, dans les petits cadavres, en avril (Vouaux); Froidefontaine, au pied des arbres fruitiers, en arrachant les mottes de gazon (de Brunier).

VENTRALIS Marsh. — La Malgrange, en avril (Vouaux).

QUADRINOTATUS Scriba. — Dingsheim ; Mittelschaeffolsheim; Vendenheim; Brumath; Plobsheim; Stambach;

Schlestadt (Sch.). — Messein; La Malgrange, en juillet (Vouaux).

DUODECIMSTRIATUS Schrank. — Strasbourg : La Robertsau, dans des détritus, en grand nombre, en février (Klein).

BIMACULATUS L. — Avec le précédent et dans les mêmes conditions (Klein).

* PRAETERMISSUS Peyr. — Marsal, près d'une mare saumâtre, fin mai (Vouaux).

BIMACULATUS L. — Strasbourg : au Wacken, dans une bouse (Sch.).

CORVINUS Germ. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Blainville (Host).

Dendrophilus Leach

PUNCTATUS Herbst. — Méroux, dans la vermoulure des pommiers creux. Trouvé aussi dans du vieux guano de poulailler en compagnie de HISTER MERDARIUS Hoffm. (de Brunier).

PYGMAEUS L. — Blainville. avec *Formica rufa,* en avril (Vouaux).

Carcinops Marseul

QUATUORDECIMSTRIATA Steph. — Avenue de La Malgrange. dans les champignons, en juin (Vouaux).

Paromalus Erichs

COMPLANATUS Panz. — Blainville, en juin (Vouaux).

FLAVICORNIS Herbst. — Idem, dans des débris, en septembre (Vouaux).

HETAERIINI

Hetaerius Erichs.

FERRUGINEUS Oliv. — Idem. avec *Formica rufa,* en avril (Vouaux).

SAPRININI

Saprinus Erichs.

DETERSUS Illig. — Muttersholz, digue de l'Ill (Kraenecker).

* SUBNITIDUS Mars. — Laître-sous-Amance, dans le jardin du presbytère, en mai (Vouaux).

NITIDULUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Herrenwald, près de Vendenheim; côte du Scharrach (Sch.). — Champigneulles (Vouaux).

PULCHERRIMUS Weber. — Souffelweyersheim (Sch.).

RUGIFRONS Payk. — Epinal (Host).

Gnathoncus Duval

ROTUNDATUS Kugel. — Laître-sous-Amance, jardin du presbytère, en mai (Vouaux).

PUNCTULATUS Thoms. — Strasbourg : au Wacken (Sch.). [1]

1 Ici viendrait :

* GNATHONCUS BUYSSONI Auzat, pris par M. DE BRUNIER à Grand-Charmont (Doubs), un peu en dehors de la région, fin avril, dans un pommier creux où les oiseaux n'avaient pas encore niché. Cette rare espèce a été décrite en 1917 par le docteur AUZAT, d'après les individus pris par M. DU BUYSSON à Brout-Vernet, dans les arbres creux habités par les oiseaux. Ce GNATHONCUS se distingue à première vue de ses congénères par sa strie suturale bien nette. — A rechercher dans nos régions.

Myrmetes Marseul

PICEUS Payk. — Blainville (Host).

ABRAEINI

Teretrius Erichs.

PICIPES F. — Friauville, près de Jarny, un ex. sur du lierre, en mai (Vouaux).

Plegaderus Erichs.

CAESUS Illig. — La Malgrange, en fauchant, fin avril (Vouaux); Jarville (Host).

Onthophilus Leach

SULCATUS F. — Hœnheim, deux ind. (Bod.).

STRIATUS F. — Bourbach; Etueffont, tout l'été dans les fumiers et les cadavres; Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier); plateau d'Amance (Vouaux).

Acritus Leconte

NIGRICORNIS Hoffm. — La Malgrange, au vol, en mai et octobre (Vouaux).

LUCANIDAE

Lucanus Scop.

CERVUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, deux ex. ♀ (Bod.); Saverne; Eschau, sur cerisier, fin juin (Sch.);

Muttersholz, un ex. ♀, fin août (Kraencker); Mulhouse : au Rebberg (Klein).

v. CAPREOLUS L. — Haguenau; Saverne (Sch.). — La Malgrange (Vouaux).

Dorcus Mac Leay

PARALLELEPIPEDUS L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, durant l'hiver 1917-18, commun sous les écorces et dans les vieilles souches de saules (Boché, Klein); id., près de la digue du Rhin (Bod.); Saverne, fin mai (Klein, Sch.); Artolsheim; maison forestière de Moenkalb, près de Barr; Hohwald (Sch.). — Saint-Georges, en juin (Vouaux).

Systenocerus Weise

(**Platycerus** auct.)

CARABOIDES L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); ruine de Greifenstein, près de Saverne, en mai; Pulversheim (Klein); Urmatt; Schirmeck; Rothau; Trois-Epis (Sch.). — Plateau d'Amance, en novembre (Vouaux); forêt d'Uriménil, dans diverses souches, en février (de Brunier).

v. ♀ RUFIPES Herbst. — Plateau d'Amance, en novembre (Vouaux); forêt d'Uriménil, avec la forme typique (de Brunier); Epinal (Host).

Sinodendron Hellwig

CYLINDRICUM L. — Saverne (Host, Klein); id., vallée de Baerenbach et maison forestière de Haberacker; Her-

renwald, près de Vendenheim; forêts de Haguenau et de Brumath (Sch.).

SCARABAEIDAE

COPRINI

Sisyphus Latr.

Schaefferi L. — Westhoffen : côte du Geierstein (Weigand); Bollenberg, près de Rouffach (Hoermann, Sch.).

Gymnopleurus Illig.

pilularius Muls. — Plobsheim, dans des excréments humains (Sch.).

Copris Fabr.

lunaris L. — Strasbourg : au Neuhof; Saverne : côte du Brotschsberg; maison forestière de Haberacker; forêt de Brumath; Reichstett; Artolsheim; Tannenberg, près de Schirmeck; Hohwald (Sch.).

Onthophagus Latr.[1]

Amyntas Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Wiebolsheim, dans des crottins (Sch.).

1 Les nymphes des Onthophagus présentent sur le corselet une longue corne et de chaque côté du ventre quatre cornicules spiniformes, qui disparaissent chez l'insecte parfait. La corne thoracique existe aussi chez les nymphes de femelles. (Cf. J.-H. Fabre, *Souvenirs entomologiques*, 10e série, p. 138 et suiv.).

VERTICICORNIS Laich. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); forêt de Brumath; Gresswiller (Sch.). — Epinal (Host).

VACCA L. — Saverne (Sch.). — Epinal (Host).

V. MEDIUS Panz. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Rouffach (Sch.). — Epinal, avec la forme typique (Host).

COENOBITA Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Achenheim (Bod.).

LEMUR F. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Dingsheim, com. mai (Sch.).

CAMELUS F. — D'après M. Bedel, les indications dans le Fascicule IV (p. 288) et dans le Suppl. I (p. 170) doivent se rapporter à O. GIBBOSUS Scriba (*Ganglbaueri* Reitt.), espèce assez semblable au CAMELUS de Hongrie. Cet O. GIBBOSUS est décrit des provinces rhénanes et a été retrouvé depuis par M. Bedel dans la Haute-Marne (Cf. *Bull. Soc. ent. Fr.* 1919, p. 271).

FURCATUS F. — Capturé à une deuxième reprise à Turckheim, six ind. (Sch.).

Oniticellus Serville

FULVUS Gœze. — Rouffach; Guebwiller (Sch.).

APHODIINI

Aphodius Illig.

Colobopterus Muls.

ERRATICUS L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Klein); id., forêt du Neuhof (Bod.); Molsheim; Bouxwiller, côte du Bastberg; Hœrdt (Klein); Munster (Sch.).

Eupleurus Muls.

SUBTERRANEUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Saverne; Zeinheim; Reichstett; Grendelbruch (Sch.). — Jarny; Laître-sous-Amance (Vouaux).

Teuchestes Muls.

FOSSOR L. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Achenheim; Saint-Nabor; Ottrott (Bod.); Mundolsheim; Zeinheim; Willgottheim ; Hurtigheim; Gresswiller ; col de La Schlucht (Sch.). — Blainville; Epinal (Host).

V. SILVATICUS Ahr. (*brunneus* Muls.). — Strasbourg : La Robertsau (Boehé, Klein). — Epinal (Host).

Aphodius Muls.

FOETENS F. — Plateau d'Amance, en août (Vouaux).

SCYBALARIUS F. — Hœrdt (Sch.). — La Malgrange, en juillet (Vouaux).

V. NIGRICANS Muls. — Epinal (Host).

Aphodius s. str.

LUGENS Creutz. — Hohneck (Sch.). — Plateau de Vandœuvre, en juillet (Vouaux).

Volinus Muls.

MELANOSTICTUS Schmidt. — Epinal (Host).

STICTICUS Panz. — Laître-sous-Amance, en forêt, fin mai (Vouaux).

PICTUS Sturm. — Forêt de Vitrimont, en mai (Vouaux).

TESSULATUS Payk. — Baccarat, en octobre (Vouaux); Epinal (Host).

Melinopterus Muls.

PUBESCENS Sturm. — Hohneck, un ind., com. juin (Sch.).

CONSPUTUS Creutz. — La Malgrange, en octobre (Vouaux).

CONTAMINATUS Herbst. — Forêt de Brumath (Sch.). — Vandœuvre; La Malgrange, en novembre (Vouaux).

Nimbius Muls.

OBLITERATUS Panz. — Baccarat, en octobre; forêt de Champenoux (Vouaux).

Amidorus Muls.

* OBSCURUS F. — Hohneck (Sch.).

Orodalus Muls.

TRISTIS Panz. — Saverne; Zeinheim; Reitwiller; côte du Mont Sainte-Odile (Sch.). — La Malgrange, en mai (Vouaux).

PUSILLUS Herbst. — Laître-sous-Amance, dans les crottes de mouton, en mai (Vouaux).

Nialus Muls.

VARIANS Duft. — Messein, dans des débris (Vouaux).

NIGER Panz. — Zeinheim, deux ind. (Sch.).

Oromus Muls.

ALPINUS Scop. — Col de La Schlucht (Host); Hohneck (Sch.).

V. RUBENS Muls. — Avec la forme typique (Host); Tanneck, en juillet (Vouaux).

Biralus Muls.

SATELLITUS Herbst. — Champ-du-Feu (Sch.).

Acrossus Muls.

RUFIPES L. — Stambach (Klein); Saverne (Sch.); Ottrott; Klingenthal (Bod.); Hoerdt (Sch.).

DEPRESSUS Kugel. — Hohneck, en juin (Vouaux).

V. ATRAMENTARIUS Er. — Berstett (Sch.).

LURIDUS F. — Champigneulles ; Laître-sous-Amance (Vouaux).

V. GAGATES Mull. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Saverne; Brumath; Zeinheim; Hoerdt (Sch.). — Epinal (Host); avec le type (Vouaux).

Heptaulacus Muls.

* ALPINUS Drap. — Ballon de Guebwiller (Sch.). — Col de la Schlucht (Host).

TESTUDINARIUS F. — La Malgrange, dans des détritus, en mars (Vouaux).

Pleurophorus Muls.

CAESUS Panz. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

Psammodes Laporte

SULCICOLLIS Illig. — Messein, dans des détritus, en mars (Vouaux).

TROGINI

Trox Fabr.

PERLATUS Goeze. — Achenheim (Bod.); Saverne (Sch.). — Plateau d'Amance (Vouaux).

HISPIDUS Laichart. — Urmatt (Sch.).

SABULOSUS L. — Achenheim; Saint-Nabor (Bod.); Hoerdt. — Jarny; La Malgrange; plateau d'Amance (Vouaux).

SCABER L. — La Malgrange; Laître-sous-Amance; forêt de Champenoux (Vouaux).

GEOTRUPINI

Bolboceras Kirby

UNICORNE Schrk. — Dornach (Klein).

Odontaeus Klug

ARMIGER Scop. — Strasbourg : La Robertsau, digue du Rhin, en juillet; idem, au vol, après le coucher du soleil, en septembre (Klein).

* V. TESTACEUS Muls. — Strasbourg : forêt du Neuhof, fin octobre, un ind., sous un amas de feuilles mortes (Sch.).

Geotrupes Latr.

TYPHOEUS L. — Zeinheim; forêt de Brumath; forêt de Haguenau; Grendelbruch; côte du Donon (Sch.).

SPINIGER Marsh. — Strasbourg : La Robertsau (Klein); Hoenheim (Bod.); Bouxwiller, côte du Bastberg, en août (Boehé); Lac Blanc; Ballon de Guebwiller; Hohneck (Sch.).

HYPOCRITA Serv. — Saverne : vallée de Baerenbach, un ind. en juin (Boehé). — Blainville (Host).

Trypocopris Motsch.

VERNALIS L. — Stambach; vallée de Baerenbach; maison forestière Haberacker; côte du Brotschberg, partout en grand nombre dans les bouses, fin juin (Klein, Sch.); Molsheim; Ballon de Guebwiller; Hohneck (Sch.).

PYRENAEUS Charp. — Hohneck (Sch.). — Hautes-Vosges, environs de La Schlucht (Vouaux).

DYNASTINI

Oryctes Illig.

NASICORNIS L. — Barr; forêt de Haguenau; Saverne (Sch.). — Jarville, en juin (Vouaux); idem, en nombre dans de vieux amas de sciure de bois (Host); La Malgrange (Vouaux).

MELOLONTHINI

Rhizotrogus Latr.

Rhizotrogus Muls.

AESTIVUS Oliv. — Strasbourg : La Robertsau, digue du

Rhin, en très grand nombre, com. mai 1918; Habsheim (Klein); Saverne; Hoerdt (Sch.).

MACULICOLLIS Villa. — Urmatt, mi-mai (Sch.).

Amphimallon Serv.

SOLSTITIALIS v. OCHRACEUS Knoch. — Epinal (Host).

v. FALLENI Gyllh. — Schiltigheim, un ind., le 1er juillet 1917 (Sch.).

ATER F. — Wasselonne; Soultzbad (Sch.); Rouffach (Hoermann, Sch.).

Anoxia Laporte

VILLOSA F. — Lisière de la forêt de Brumath, un ind., fin mai (Sch.).

Polyphylla Harris

FULLO L. — Strasbourg : rue de l'Observatoire, sur un balcon, le soir, attiré par la lumière d'une lampe électrique, le 9 juillet 1915 (Kraencker).

Melolontha Fabr.

* HIPPOCASTANI v. NIGRICOLLIS Muls. — Strasbourg : au Wacken, mai 1916; forêt du Neuhof, en mai 1916 (Sch.); Haguenau (Werner).

VULGARIS v. LUGUBRIS Muls. — Plobsheim (Sch.).

v. DISCICOLLIS Muls. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Saasenheim (Bod.).

Serica Mac Leay

HOLOSERICEA Scop. — Strasbourg : au Wacken; Artolsheim; Lac Blanc (Sch.).

BRUNNEA L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, bords du Giessen, sur *Salix*, fin juin; idem, digue du Rhin, fin juillet, le soir au vol (Klein); moulin de Donnenbach (Kraencker); ballon de Guebwiller (Vouaux).

Homaloplia Steph.

RURICOLA F. — Saverne; Haguenau (Sch.); Colmar (Klein). — Plateau de Malzéville, en juillet (Vouaux).

V. ATRATA Geoffr. — Idem, avec le type (Vouaux).

RUTELINI

Anomala Samouelle

AENEA Deg. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Haguenau; Saverne; Zeinheim; Grendelbruch; Mollkirch (Sch.). — Plaine de Dogneville (Host).

Phyllopertha Kirby

HORTICOLA V. USTULATIPENNIS Vill. — Reichstett, maison forestière de Wasen (Kraencker); Zeinheim (Sch.). — Liverdun, en nombre et seulement quelques rares exemplaires de la forme typique (Host).

Anisoplia Serville

SEGETUM Herbst. — Plusieurs ex. étiquetés *Colmar* dans la collection de la Société industrielle de Mulhouse (com. de M. Klein).

Hoplia Illig.

PRATICOLA Duft. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en nombre; Hoerdt (Sch.).

PHILANTHUS Füssl. — Strasbourg : La Robertsau, en juin 1918 et 1919, en très grand nombre (Klein); Hoerdt; côte de l'Elsberg (Sch.). — Daspich, près de Thionville; les mâles beaucoup plus nombreux que les femelles (Vouaux).

FARINOSA L. — Saverne; Molsheim; Rothau; Urmatt; Thann (Sch.). — Epinal; Bouxières-aux-Dames, assez commun (Host).

CETONIINI

Epicometis Burm.

SQUALIDA Scop. — Ballon de Guebwiller (Sch.).

HIRTA Poda. — Saverne; Zeinheim; Plobsheim; Molsheim; Artolsheim; Richtolsheim; ballon de Guebwiller (Sch.). — Laître-sous-Amance, en juin (Vouaux); Epinal (Host).

Leucocelis Burm.

FUNESTA Poda. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Haguenau; Vendenheim; Plobsheim; Zeinheim; Rosheim (Sch.). — Laître-sous-Amance, dans les jardins (Vouaux).

Cetonia Fabr.

V. CUPRIFULGENS Muls. — Laître-sous-Amance; Jarny (Vouaux).

v. PILIGERA Muls. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, en janvier 1920, durant l'inondation (Klein); idem, forêt du Neuhof; Saverne; Côte du Donon; Plobsheim (Sch.). [1]

Potosia Reitter

MARMORATA F. — Strasbourg : La Robertsau (Boehé); idem, ♂ ♀ dans une poire pourrie tombée à terre; Haguenau; Kinzheim (Sch.). — La Malgrange, en juin (Vouaux).

SPECIOSISSIMA Scop. — Forêt de Haguenau, sur un chêne (Sch.).

CUPREA F. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Hoenheim; Illkirch; Mutzig; Urmatt; Schirmeck; Saverne; Guebwiller (Sch.). — Laître-sous-Amance, dans le jardin du presbytère (Vouaux).

v. OBSCURA Andersch. — Mutzig; Haguenau; Schlestadt; Schirmeck; Colmar (Sch.).

v. METALLICA Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Saverne; Molsheim; Plobsheim; Saint-Nabor; côte du Donon (Sch.).

MORIO F. — Strasbourg : à l'Orangerie, sur des roses, com. juin 1917 (Sch.); Mulhouse (Klein).

VALGINI

Valgus Scriba

HEMIPTERUS L. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Vendenheim; Dingsheim; Dreispitz, près de Mutzig; Richtolsheim; maison forestière de Haberacker (Sch.); sur la route entre Graffenstaden et Eschau, en juin; Mulhouse (Klein). — Environs de Nancy, sur l'au-

[1] Il est à remarquer que M. Klein n'a trouvé que la variété PILIGERA et non le type. Celle-ci n'est, à mon avis, que la forme qui vient d'éclore.

bépine, en mai (Dr Parizot). — La femelle se prend beaucoup plus rarement que le mâle.

TRICHIINI

Osmoderma Serv.

EREMITA Scop. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, dans la vermoulure d'un vieux saule, neuf ex. dont deux morts (Boehé, Klein); Saverne; Griesheim; Barr (Sch.).

Gnorimus Serv.

VARIABILIS L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, sur *Salix* et quelquefois aussi sur le sol, fin juin; id., près de troncs abattus, au vol, durant les fortes chaleurs, fin juin (Klein), Hoerdt (Sch.).

v. HEYDENI Becker. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, toutes les formes intermédiaires, avec le précédent et dans les mêmes conditions (Boehé, Klein).

Trichius Fabr.

* SEXUALIS Bedel. — Strasbourg : au Wacken, dans un jardin, un ex. le 26 juin 1916, parmi une vingtaine de T. FASCIATUS L. (Sch.); id., un second ind. en juin 1919 (Sch.).

BUPRESTIDAE

BUPRESTINI

Chalcophora Solier

MARIANA Lap. — Saverne : au-dessus d'Ottersthal, sur des

bûches de hêtre, fin mai (Klein); id. versant du Brotschberg (Sch.); Ottrott, sur pins abattus (Bod.).

Poecilonota Eschscholtz

Lampra Spin.

RUTILANS F. — Haguenau; Wangen; Heiligenberg; Saint-Nabor (Sch.).

Buprestis L.

RUSTICA L. — Orbey; Bollwiller; Lac Blanc; col du Bonhomme; ballon de Guebwiller (Sch.).

NOVEMMACULATA L. — Hermolsheim, près de Mutzig, Hohneck (Sch.).

OCTOGUTTATA L. — Heiligenberg; Schirmeck, sur *Pinus silvestris* (Sch.).

Phaenops Lacord.

CYANEA F. — Hohneck (Sch.). — La Malgrange, en juillet (Vouaux).

Anthaxia Eschscholtz

CICHORII Oliv. — Muttersholz (Kraencker); col de La Schlucht (Sch.).

* V. CHAMOMILLAE Mannh. — Dreispitz, près de Mutzig, en juin (Sch.).

MANCA F. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Klein); id., forêt du Neuhof, en grand nombre (Bod.).

CANDENS Panz. — Maison forestière du Moenkalb, près de Barr; Ottrott (Sch.). — Aydoilles; Petite-Fontaine (de Brunier).

SALICIS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof ♂ ♀ (Bod.). — La Malgrange; Laitre-sous-Amance; Jarny (Vouaux).

FULGURANS Schrk. — Colmar (Sch.). — Plateau de Vandœuvre; Jarny, en juin (Vouaux).

* V. AZUREUS Lap. — Colmar, avec le type (Sch.).

NITIDULA L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); côte du Scharrach; Grendelbruch; Turckheim; Bollenberg, près de Rouffach; Munster (Sch.). — La Malgrange; plateau d'Amance; Jarny, en mai et juin (Vouaux).

V. CYANIPENNIS Lap. — Barr (Sch.).

MORIO F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

SEPULCHRALIS F. — Trois-Epis (Sch.). — La Malgrange, en mai (Vouaux).

QUADRIPUNCTATA L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); id., forêt de La Robertsau, sur les *Composées* (Boehé); Saverne; Niederhausbergen; Reichstett; Hermolsheim; côte du Ballon de Guebwiller (Sch.). — La Malgrange; Jarny, de mai en juillet (Vouaux).

POLYCESTINI

Ptosima Sol.

UNDECIMMACULATA Herbst. — Riquewihr, un ind. (Bod.).

CHRYSOBOTHRINI

Chrysobothris Eschscholtz

AFFINIS F. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Klein); id., forêt du Neuhof (Bod.); Ottersthal, près de Saverne, sur des bûches de hêtre, fin mai (Klein); vallée de Baerenbach, sur des troncs de chêne abattus (Boehé).

ACRILINI

Coraebus Lap.

ELATUS Mars. et auct. — Côte de l'Elsberg (Sch.).

Agrilus Curtis

GUERINI Lac. — Laître-sous-Amance, le 20 juin 1914 (Vouaux).

BIGUTTATUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); id., forêt de La Robertsau (Klein); Mutzig; Wangenbourg (Sch.).

SINUATUS Oliv. — Laître-sous-Amance, dans le jardin du presbytère; Jarny (Vouaux).

SUBAURATUS Gebl. — Plateau d'Amance; forêt de Vitrimont; Jarny (Vouaux).

VIRIDIS L. — Forêt du Neuhof, en grand nombre (Bod.). — Forêt de Champenoux, en juillet (Vouaux).

V. NOCIVUS Ratz. — Maison forestière de Haberacker, près de Saverne; Mutzig; Schirmeck (Sch.).

V. FAGI Ratz. — Schirmeck (Sch.).

* V. ATER F. — Herrenwald, près de Vendenheim (Sch.).

COERULEUS Rossi. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Forêt de Champenoux, en juin (Vouaux); Epinal (Host).

PRATENSIS Ratz. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, près de la digue du Rhin, sur les jets de *Populus alba*, en nombre (Klein); id., forêt du Neuhof (Bod.). — Laître-sous-Amance, en juin (Vouaux).

ELONGATUS Herbst. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, en juin (Boché).

* V. CYANEUS Rossi. — Idem, avec le type (Boché).

ANGUSTULUS Illig. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en

grand nombre, sur un chêne; Rothau (Sch.). — Environs de La Malgrange (Vouaux).

LATICORNIS Illig. — Laître-sous-Amance, en juillet (Vouaux).

OLIVICOLOR Kiesw. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — La Malgrange, en juin (Vouaux).

CINCTUS Oliv. — Muttersholz (Kraencker).

AURICHALCEUS Redtb. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Bod.); Saverne, fin juin (Sch.).

INTEGERRIMUS Ratz. — Strasbourg : forêt du Neuhof, com. juin (Sch.).

HYPERICI Creutz. — Maison forestière de Haberacker, près de Saverne (Sch.).

TRACHYINI

Trachys Fabr.

MINUTA L. — Saverne : environs du Hohbarr (Sch.).

PYGMAEA F. — Laître-sous-Amance, un ex., en juillet (Vouaux).

PUMILA Illig. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Schirmeck; côte du Donon (Sch.) .— Plateau d'Amance, en sept. (Vouaux).

NANA Herbst. — Côte du Scharrach, fin juin; Zeinheim (Sch.). — Bouxières-aux-Dames (Host).

EUCNEMIDAE

THROSCINI

Throscus Latr.

DERMESTOIDES L. — Blainville, en juillet (Vouaux).

CARINIFRONS Bonv. — Jarny, en juin (Vouaux).

ELATEROIDES Heer. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Sch.).

* EXUL Bonv. — La Malgrange, dans des détritus, 2 ex., en octobre (Vouaux).

OBTUSUS Curtis. — La Malgrange, avec le précédent, en nombre; Jarny (Vouaux); Bouxières-aux-Dames (Host).

EUCNEMINI

Eucnemis Ahr.

CAPUCINA Ahr. — Blainville, en juin (Vouaux).

ELATERIDAE

AGRYPNINI

Adelocera Latr.

QUERCEA Herbst. — Côte du Schneeberg (Sch.).

ELATERINI

Elater L.

CINNABARINUS Esch. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Brumath (Sch.). — Rive droite de la Vologne, au-dessus de la « Glacière » (de Brunier).

SANGUINEUS L. — Brumath; Kriegsheim; Hochfelden; Sainte-Odile (Sch.). — Bourbach-le-Haut; Mandray; Arrentes-de-Corcieux; Kichompré. L'espèce était assez abondante dans les poteaux d'une ligne télégraphique établie le long du chemin vicinal Julienrupt-Cleurie, pour

nécessiter en mai 1918 le remplacement de ces poteaux (de Brunier).

POMONAE Steph. — Ottrott (Bod.); Muttersholz (Kraenecker); col de La Schlucht, en juillet (Vouaux).

* v. PICTAVIENSIS Buyss. — La Malgrange, sous les écorces des saules, en mai (Vouaux).

SANGUINOLENTUS Schrnk. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Truchtersheim; Rothau (Sch.). — Jarny, en avril (Vouaux).

v. EPHIPPIUM Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof, avec le type (Bod., Sch.).

ELONGATULUS F. — Forêt de Vitrimont, en avril (Vouaux).

* v. BALTEATULUS Reitt. — Etang de La Maix (du Buysson).

BALTEATUS L. — Strasbourg : La Robertsau; Illkirch; Brumath; Zeinheim; Barr (Sch.). — Arrentes-de-Corcieux (de Brunier).

CROCATUS Lac. — Laître-sous-Amance; La Malgrange, en mars et avril (Vouaux).

ERYTHROGONUS Müll. — Hautes-Vosges, en mai (Vouaux). — Cleurie; Kichompré; bords de la Vologne, très abondant sous les lichens des vieux sapins. Une centaine d'individus sur le même arbre (de Brunier).

* v. CONCOLOR Stierl. — Bords de la Vologne, avec la forme typique et presque aussi abondant (de Brunier).

NIGERRIMUS Lac. — Aydoilles, en juillet (Vouaux).

AETHIOPS Lac. — Hohneck (Sch.). — Kichompré; rive droite de la Vologne, au-dessus de la « Glacière » (de Brunier).

Betarmon Kiesenw.

BISBIMACULATUS Schoenh. — Zeinheim, sur terrain calcaire, sous des pierres, près de la carrière (Sch.).

Hypnoidus Steph.

RIPARIUS F. — Schirmeck (Sch.).

QUADRIPUSTULATUS F. — Jarny, en juillet (Vouaux).

PULCHELLUS L. — Messein, en mai (Vouaux).

DERMESTOIDES Herbst. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

V. TETRAGRAPHUS Germ. (4-*guttatus* Lap.). — Messein; Laître-sous-Amance; Jarny, en mai (Vouaux).

* BIPUSTULATUS Schils. — Messein, dans des détritus, en mars (Vouaux).

MERIDIONALIS Lap. — Idem (Vouaux).

Cardiophorus Eschscholtz

GRAMINEUS Scop. — Laître-sous-Amance; Jarny, dans le jardin de la cure (Vouaux).

RUFICOLLIS L. — Blainville, en avril (Vouaux).

NIGERRIMUS Er.— Barr, deux ind. sur *Daucus carota* (Sch.).

MUSCULUS Er. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Brumath (Sch.). — La Malgrange, en mai (Vouaux).

CINEREUS Herbst. — Reichstett ; Stutzheim ; Plobsheim (Sch.).

EQUISETI Herbst. — Forêt de Haguenau, sur *Carex* (Sch.).

Melanotus Eschscholtz

NIGER F. — Strasbourg : sur les remparts; Brumath; Trois-Epis (Sch.).

BRUNNIPES Germ. — Allenwiller; Eschau; Geispolsheim, toujours en nombre (Sch.).

CASTANIPES Payk. [1] — Ottrott (Bod.).

RUFIPES Herbst. [1] — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Wissembourg; Brumath (Sch.); Ottrott; Riquewihr (Bod.).

Limonius Eschscholtz

MINUTUS L. — Strasbourg : Fuchs-am-Buckel (Burr); moulin de Donnenbach (Kraencker).

PARVULUS Panz. — Zeinheim; Fessenheim; Reichstett, fin juin (Sch.).

Pheletes Kiesw.

QUERCUS Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); côte du Hohneck (Sch.).

AENEONIGER Deg. — Entre Tendon et Laveline, dans le chevelu des racines de bruyère poussant sur les roches qui émergent des prés (de Brunier).

Athous Eschscholtz

HIRTUS Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Hoenheim (id.); Barr; Artolsheim (Sch.). — La Malgrange, en juillet (Vouaux).

NIGER L. — Hohneck, en juin (Vouaux).

V. SCRUTATOR Herbst. — Schirmeck (Sch.).

* VITTATUS v. OCSKAYI Kiesw. — Zeinheim, un ex., parmi une vingtaine d'individus de la forme typique (Sch.).

LONGICOLLIS Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Hoenheim; Zeinheim; Brumath; Mittelschaeffolsheim (Sch.). — Plateau d'Amance, en juillet (Vouaux).

[1] M. H. du Buysson a bien voulu me faire remarquer que la réunion de ces deux espèces (Cf. Suppl. I, p. 189), est un tort et une erreur du *Catalogus Coleopterorum Europae, Editio secunda* de REITTER, qui est due à SCHWARZ. (Rev. D. 1892, p. 145-164.)

* v. UNICOLOR Torre. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Reichstett (Sch.).

SUBFUSCUS Müll. — Forêt de Vitrimont (Vouaux).

Ludius Eschscholtz

Corymbites Latr.

PECTINICORNIS L. — Reichstett; Kriegsheim; Urmatt; Schirmeck (Sch.).

CUPREUS F. — Saverne; Urmatt; Schirmeck; Barr (Sch.). — Vallée de la Madeleine (de Brunier).

v. AERUGINOSUS F. — Strasbourg : Fuchs-am-Buckel (Burr); Schirmeck (Sch.). — Vallée de la Madeleine, avec le type (de Brunier).

Calosirus Thoms.

PURPUREUS Poda. — Hermolsheim; Grendelbruch; Urmatt; Nieder-Haslach; Schirmeck; Rothau; Barr; Saint-Nabor (Sch.). — Epinal (Host).

CASTANEUS L. — Jarny, dans le jardin de la cure, en mai (Vouaux).

SULPHURIPENNIS Germ. — Vallée de la Madeleine (de Brunier).

Liotrichus Kiesw.

AFFINIS Payk. — Col de La Schlucht, en juin (Vouaux).

Haplotarsus Steph.

QUERCUS Gyllh. — Idem (Vouaux).

Selatosomus Steph.

IMPRESSUS F. — Ottrott (Bod.); Schirmeck (Sch.). — Col de La Schlucht, en juillet (Vouaux); roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville); Etueffont; Gérardmer (de Brunier).

NIGRICORNIS Panz. — Scharrachbergheim; côte du Schneeberg (Sch.). — Forêt de Champenoux, en juillet (Vouaux).

* RUGOSUS Germ. — Ballon de Guebwiller (Sch.).

CRUCIATUS L.— Maison forestière Hengst, entre le Hengstberg et l'Urstein; Orbey (Sch.).

Calambus Mots.

BIPUSTULATUS L. — Etueffont; Petite-Fontaine (de Brunier).

Hypoganus Kiesw.

CINCTUS Payk. — Kiehompré (de Brunier). — Environs de La Malgrange, en avril (Vouaux).

Steatoderus Eschscholtz

FERRUGINEUS L. — Bord de la route entre Willgottheim et Zeinheim (Sch.).

Agriotes Eschscholtz

Ectinus Eschsch.

ATERRIMUS L. — Ottrott, en nombre; Riquewihr (Bod.).

Agriotes in sp.

USTULATUS Schaller. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Zeinheim; Reichstett; Molsheim; Barr (Sch.).

v. FLAVICORNIS Panz. — Reichstett; Plobsheim (Sch.).

GALLICUS Lac. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); colline d'Ernolsheim (Sch.).

Sericus Eschscholtz

BRUNNEUS L. — Laître-sous-Amance, en mai; Aydoilles (Vouaux).

v. TIBIALIS Redtb. — Saverne : route du Haut-Barr; Soultzbad (Sch.).

Synaptus Eschscholtz

FILIFORMIS F. — Strasbourg : digue du Rhin, près de l'Altenheimer Hof (Bod.).

Adrastus Eschscholtz

NITIDULUS Marsh. — Zeinheim; Rumersheim (Sch.).

CAMPYLINI

Campylus Fischer

(**Denticollis** Piller, **Lepturoides** Herbst)

RUBENS Piller. — Col de La Schlucht, en juillet (Vouaux); Lac Blanc (Sch.). — Etueffont; pentes du Fayet, dans une vieille souche de hêtre (de Brunier).

LINEARIS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Mandray; Etueffont. Dans les pièces de bois des barrages, des vannes, etc. Sous l'écorce d'une pièce de bois servant de passerelle et toujours humide. La ♀ est beaucoup plus rare que le ♂ (de Brunier).

DASCILLIDAE

DASCILLINI

Dascillus Latr.

CERVINUS L. — Dingsheim, dans un pré (Sch.). — Vallée de la Madeleine, très abondant sur les fleurs (de Brunier).

HELODINI

Helodes Latr.

MARGINATUS F. — Docelles, en mai (Vouaux).

Microcara Thoms.

TESTACEA L. — Ittenheim, dans un pré marécageux (Sch.). — Forêt de Champenoux, en juillet (Vouaux).

Scirtes Illig.

HEMISPHAERICUS L. — La Malgrange, en juillet et août (Vouaux).

Cyphon Payk.

VARIABILIS Thunb. — Strasbourg : canal de la Bruche, ♂ ♀ (Burr). — Messein, en avril (Vouaux).

COARCTATUS Payk. — Laître-sous-Amance; Champigneulles, en mai (Vouaux).

PAYKULLI Guér. — Sundhausen (Sch.). — Laître-sous-

Amance, en juin; forêt de Champenoux (Vouaux); Epinal (Host).

EUBRIINI

Eubria Latr.

PALUSTRIS Germ. — Col de La Schlucht, deux ind., sur terrain tourbeux (Sch.).

CANTHARIDAE

HOMALISINI

Homalisus Oliv.

FONTIS-BELLAQUEI Geoffr. — Plateau d'Amance (Vouaux).

LYCINI

Dictyopterus Muls.

AURORA Herbst. — Côte du Mont Sainte-Odile; Schirmeck; Aubure (Sch.); côte du Donon, versant ouest, en mai (Vouaux, Sch.).

Pyropterus Muls.

NIGRORUBER Deg. — Hautes-Vosges, en septembre (Vouaux); Kichompré, sur les souches de pins (de Brunier).

LAMPYRIDINI

Phosphaenus Lap.

HEMIPTERUS Goeze. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Laître-sous-Amance, dans le jardin de la cure, mai et

juin (Vouaux); roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville); Nancy, dans les jardins (Host).

CANTHARINI

Podabrus Westw.

ALPINUS Payk. — La Croisette d'Hérival (Host).

* V. ANULATUS Fisch. — Versants sud du Ballon de Guebwiller et du Hohneck (Sch.). — Cette variété n'est pas exclusivement alpine (Cf. Fasc. IV, p. 354). Elle a été également trouvée dans le Hanovre, ainsi qu'en Thuringe.

Cantharis L.

* ANNULARIS Mén. — Rouffach : versant du Bollenberg, sur terrain calcaire (Sch.). — Signalé aussi des environs de Francfort-sur-Mein, de Wiesbaden et de Limbourg, dans le Taunus.

OBSCURA L. — Zeinheim; Grendelbruch (Sch.). — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

PULICARIA F. — Marbache, fin mai (Vouaux).

* NIGRICANS V. IMMACULATA Schils. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

FIGURATA Mannh. — Orbey (Sch.).

FULVICOLLIS F. — Saverne : environs du Haut-Barr; Barr (Sch.).

LATERALIS L. — Laître-sous-Amance, mi-juin (Vouaux).

* V. NIGRONOTATA Pic. — La Malgrange, en juin (Vouaux).

Metacantharis Bourg.

DISCOIDEA Ahr. — Plobsheim, en mai (Sch.).

HAEMORRHOIDALIS F. — Saverne; Schirmeck; Rothau;

Rhagonycha Eschscholtz

TRANSLUCIDA Kryn. — Hohneck (Sch.).

* NIGRICEPS Waltl. — Un ex. étiqueté *Alsace*, dans la collection de la Société industrielle de Mulhouse (com. de M. Klein). — Espèce alpine, dont la présence dans nos régions demanderait confirmation.

* STRAMINEA Kiesw. — Strasbourg : forêt du Neuhof, deux ex. (Bod., Fleischer *det.*). — Espèce méditerranéenne, dont la capture dans nos régions doit être accidentelle.

ELONGATA Fallèn. — Bois de Donnenheim; Kriegsheim (Sch.).

Pygidia Mulsant, Rey

DENTICOLLIS Schummel. — Sur la crête, entre La Schlucht et le Hohneck (Sainte-Claire Deville).

Malthinus Latr.

BIGUTTULUS Payk. — Erstein (Sch.). — Epinal, bois de la Voivre (Host).

FLAVEOLUS Kiesw. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Barr; Urmatt (Sch.).

FASCIATUS Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Barr (Sch.). — Espèce qui devient de plus en plus rare en Alsace. La citation « commun, etc. » (Fasc. IV, p. 361) est à rayer.

Malthodes Kiesw.

Malthodellus Bourg.

* TRIFURCATUS Kiesw. — Plateau d'Amance, mi-juin (Vouaux).

BREVICOLLIS Payk. — Strasbourg : dans un pré de la Schiffmatt, deux ind. (Sch.).

Malthodes in sp.

DISPAR Germ. — Champigneulles, en juin; Maxéville (Vouaux).

RUFICOLLIS Latr. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). Laître-sous-Amance, en juillet ; Conflans, en mai (Vouaux).

MAURUS Lap. — Plateau d'Amance, en mai (Vouaux).

MISELLUS Kiesw. — Col de La Schlucht, en juin (Vouaux).

HEXACANTHUS Kiesw. — Forêt de Champenoux; Gérardmer, ♂ ♀, com. juin (Vouaux).

MALACHIINI

Troglops Erichs.

ALBICANS L. — Moulin de Donnenbach (Kraenckер).

Charopus Erichs.

FLAVIPES Payk. (*plumbeomicans* Goeze, *pallipes* Er.). — Strasbourg, forêt du Neuhof (Bod.). — La Malgrange, en juin; Malzéville (Vouaux).

* CONCOLOR F. (*nigripes* Kolen., ♂ *furcatipennis* Villa). — Un ex. étiqueté *Alsace* dans la collection de la Société industrielle de Mulhouse (com. de M. Klein). — Signalé aussi de Saxe.

Hypebaeus Kiesw.

FLAVIPES F. — Laître-sous-Amance, dans le jardin de la cure (Vouaux).

Ebaeus Erichs.

THORACICUS Geoffr. — Winzenheim, sur *Artemisia campestris*, en juillet (Sch.). — Forêt de Champenoux, en juillet (Vouaux).

Axinotarsus Erichs.

RUFICOLLIS Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Champigneulles; forêt de Champenoux, en juillet (Vouaux).

Anthocomus Erichs.

SANGUINOLENTUS F. — Jarny, en mai (Vouaux).

Malachius Fabr.

SCUTELLARIS Er. — Messein, en mai (Vouaux).

AENEUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Kriegsheim (Sch.). — La Malgrange, en juin (Vouaux).

ELEGANS Oliv. — Epinal (Host).

VIRIDIS F. — Zeinheim; Ittenheim; Gerstheim (Sch.). — Jarny; plateau de Maxéville (Vouaux).

DASYTINI

Henicopus Stephens

* PILOSUS Scop. (*hirtus* L., *ater* F.). — Plusieurs ex. étiquetés *Alsace*, dans la collection de la Société industrielle de Mulhouse (com. de M. Klein).

Dasytes Payk.

Dasytes in sp.

ALPIGRADUS Kiesw. — Hohneck, vers la ferme de Schaeferthal (Sch.).

NIGER L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Haguenau; Saverne; Schirmeck; Wibolsheim (Sch.).

Hypodasytes Muls.

OBSCURUS Gyllh. — Côte du Donon, sur *Angelica silvestris* (Sch.).

Metadasytes Muls.

COERULEUS Dej. — Trois-Epis (Sch.). — Forêt de Champenoux, en mai (Vouaux); roches de La Burre (Sainte-Claire Deville).

Hapalogluta Thoms.

FUSCULUS Illig. — Laître-sous-Amance, sur l'aubépine, en mai (Vouaux).

SUBAENEUS Schoenh. — Plateau d'Amance, en juillet

Haplocnemus Steph.

PINI Redt. — Plateau d'Amance, en novembre; Champigneulles (Vouaux).

NIGRICORNIS F. — Schirmeck; Saint-Nabor; côte du Brézouard, vers les fermes de Voirimont (Sch.). — Champigneulles, en mai (Vouaux).

Danacaea Laporte

PALLIPES Panz. — Saverne (Sch.). — Laître-sous-Amance, en juin (Vouaux).

NIGRITARSIS Küst. — Côte du Petit-Donon (Sch.). — Forêt de Champenoux; Laître-sous-Amance, en juin et juillet (Vouaux).

CLERIDAE

CLERINI

Opilo Latr.

MOLLIS L. — Kinzheim (Sch.). — Laître-sous-Amance, sous les écorces, en avril (Vouaux).

DOMESTICUS Sturm. — La Malgrange, en juin (Vouaux).

Clerus F.

MUTILLARIUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en nombre (Sch.).

Trichodes Herbst

FAVARIUS Illig. — Lisière sud de la forêt de Haguenau, deux ind. sur *Pastinaca sativa*, en juin (Sch.).

CORYNETINI

Corynetes Herbst

V. RUFICORNIS Sturm. — Strasbourg : La Robertsau (Sch.); id., forêt du Neuhof (Bod.). — Epinal (Host). — Est à

considérer comme variété du C. COERULEUS Deg. (*violaceus* Oliv.).

LYMEXYLONIDAE

Hylecoetus Latr.

DERMESTOIDES L. — Barr; Rothau; Hohneck (Sch.). — Arrentes-de-Corcieux (de Brunier). [1]

Lymexylon F.

NAVALE L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, ♂ ♀ (Sch). — Golbey, près d'Epinal, en nombre sur des traverses de chemin de fer (Host).

PTINIDAE

GIBBIINI

Gibbium Scop.

PSYLLOIDES Czempinski. — Strasbourg, dans différentes habitations (Bod., Sch.). [2]

PTININI

Niptus Boield.

HOLOLEUCUS Falderm. — Strasbourg : dans de nombreux appartements et pendant toute l'année (Sch.). Dans le Lycée Saint-Jean (actuellement Lycée Kléber), transformé en lazaret pendant la guerre et où furent soignées les

1 Cf. Sup. I, p. 207. — M. de Brunier a observé une éclosion de cette intéressante espèce sur des troncs d'épicéas. Cet insecte est le premier qui attaque le bois; de plus il est si nombreux dans les souches qu'un carnassier aussi dense serait voué à la famine et la race disparaitrait vite. Il y avait en moyenne un trou de sortie par deux centimètres carrés de surface.

2 Durant la guerre cette espèce, généralement rare, se rencontrait en assez grand nombre dans les baraques militaires situées aux environs de Strasbourg. Elle devait certainement y faire la chasse aux larves de CIMEX LECTULARIUS L. qui pullulaient à certains endroits,

maladies vénériennes, il y eut en automne 1917 une véritable invasion de cette espèce (Kraencker); Ottrott (Bod.). [1]

CRENATUS F. — Aydoilles (Vouaux).

Ptinus L.

LICHENUM Marsh. — Laître-sous-Amance, ♂ ♀, dans des prunes, en juin (Vouaux).

RUFIPES Oliv. — La Malgrange, ♂ ♀, en janvier (Vouaux).

FUR L. — Strasbourg : à l'Hôpital civil, en très grand nombre, durant la guerre (Bod.).

BICINCTUS Sturm. — Reichstett, dans une ferme (Sch.).

PILOSUS Müll. — Strasbourg : dans un appartement (Sch.).

SUBPILOSUS Sturm. — Col de La Schlucht, en juin (Vouaux).

VARIEGATUS Rossi. — Strasbourg : à l'Hôpital civil, en compagnie de P. FUR L., mais en petit nombre (Bod.); id., dans un appartement (Sch.).

BIDENS Oliv. — La Malgrange, dans des débris, en novembre (Vouaux).

ANOBIIDAE

ANOBIINI

Dryophylus Chevrol.

PUSILLUS Gyllh. — La Malgrange, en mai; Champigneulles (Vouaux).

[1] Cette espèce, encore inconnue en Alsace il y a une dizaine d'années, se répand de plus en plus dans l'Europe occidentale. Trouvée par FALDERMANN en 1835 en Asie mineure, elle fut déjà rencontrée en 1838 pour la première fois à Londres. En 1840 on la trouve à Dresde dans des racines de Rhubarbe. En 1874 elle fit son apparition dans le Wurtemberg, et le Rhin lui forma longtemps une barrière,

Episernus Thoms.

GENTILIS Rosenh. — Jarny, en juillet (Vouaux).

Gastrallus Duval.

LAEVIGATUS Oliv. — Plateau d'Amance, en juillet; Jarny, en mai (Vouaux).

IMMARGINATUS Müll. — Forêt de Champenoux, fin juillet (Vouaux).

Anobium F.

DENTICOLLE Panz. — Froidefontaine (de Brunier).

FULVICORNE Sturm. — Daspich, près de Thionville. — Plateau d'Amance, en juillet (Vouaux).

NITIDUM Herbst. — Urmatt (Sch.). — Jarny, dans le jardin de la cure, en juillet (Vouaux).

RUFIPES F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Environs de La Malgrange (Vouaux).

Sitodrepa Thoms.

PANICEA L. — Strasbourg : à différentes reprises et quelquefois en grand nombre, dans du pain sec de guerre allemand, fait en majeure partie avec des pommes de terre, des navets et de la farine de bois (Sch.). — Cf. L. FALCOZ, *Altération du biscuit de troupe et du pain de guerre; Lyon médical, Communication à la Société médico-chirurgicale militaire de la XIV^e^ Région.* Séance du 19 sept. 1916.

Nicobium Leconte

(**Neobium** Muls.)

* CASTANEUM v. HIRTUM Illig. (*fasciatum* Dufour). — Laître-sous-Amance (Vouaux). — Capturé aussi, il y a une vingtaine d'années, aux environs de Francfort-sur-Mein, par le Dr Haag, de Rutenberg.

Ernobius Thoms.

MOLLIS L. — Jarny, dans la salle paroissiale, en juin (Vouaux); Rambervillers (Host).

HEDOBIINI

Hedobia Sturm

IMPERIALIS L. — Nancy (Vouaux).

* REGALIS Duft. — Metz, en juin, sur vieux lierre, vieux bois (de Brunier).

XYLETININI

Trypopitys Redtb.

CARPINI Herbst. — Moulin de Donnenbach (Kraencker). — Forêt de Champenoux (Vouaux).

Ptilinus F.

COSTATUS Gyllh. — Saverne (Sch.). — La Malgrange, ♂ ♀, en juin (Vouaux).

Ochina Steph.

HEDERAE Müll. — La Malgrange, sur le lierre, en mai (Vouaux).

Xyletinus Latr.

ATER Panz. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

PECTINATUS F. — Fleur-Fontaine, près de Laître-sous-Amance, mi-juin (Vouaux).

DORCATOMINI

Dorcatoma Herbst

DRESDENSIS Herbst. — Daspich, près de Thionville, en juillet. — La Malgrange, en août (Vouaux).

* SETOSELLA Muls. — Jarny, jardin du presbytère, en mai (Vouaux).

Coenocara Thoms.

BOVISTAE Hoffm. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Jarny, en mai (Vouaux).

SPHINDIDAE

Sphindus Chevr.

DUBIUS Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

LYCTIDAE

Lyctus F.

BRUNNEUS Steph. — Strasbourg, dans une maison d'habitation abandonnée (Sch.).

CIIDAE

Cis Latr.

NITIDUS Herbst. — Docelles, en avril (Vouaux).

SETIGER Mellié. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Laître-sous-Amance, dans les champignons ligneux, en octobre (Vouaux).

MICANS F. — Strasbourg : au Wacken, dans des champignons lignicoles (Sch.). — Laître-sous-Amance, en octobre; forêt de Champenoux (Vouaux).

COMPTUS Gyll. — Schirmeck, également dans des champignons lignicoles (Sch.).

BIDENTATUS Oliv. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Sch.); Ottrott (Bod.). — Bois de Bosserville (Host).

* BIDENTULUS Rosh. — La Malgrange, fin mai, au vol ♂ ♀ (Vouaux).

FESTIVUS Gyll. — Laître-sous-Amance, ♂ ♀ , en juillet (Vouaux).

Rhopalodontus Mellié

FRONTICORNIS Panz. — Laître-sous-Amance, dans les champignons, en juillet (Vouaux).

Enneathron Mellié

AFFINE Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Forêt de Champenoux, ♂ ♀ , en août (Vouaux).

CORNUTUM Gyllh. — Laître-sous-Amance, dans les champignons (Vouaux).

Octotemnus Mellié

MANDIBULARIS Gyllh. — Brumath : lisière ouest de la forêt, dans *Boletus edulis* (Sch.).

GLABRICULUS Gyllh. — Laître-sous-Amance, en avril (Vouaux).

TENEBRIONIDAE

BLAPTINI

Blaps E.

GIGAS L. — Strasbourg : dans une cave, un ex., com. mai 1918 (Sch.).

MORTISAGA L. (*acuminata* Deg.). — Hoenheim, dans une cave à betteraves, en juillet 1916 (Sch.).

ASIDINI

Asida Latr.

SABULOSA Goeze. — Zeinheim; Soultzbad, sur terrain calcaire; Ferrette (Sch.). — Plateau d'Amance, sous les pierres (Vouaux).

BOLITOPHAGINI

Eledona Latr.

AGARICOLA Herbst. — Strasbourg : au Wacken, dans des bolets, auprès d'une vieille souche de hêtre (Sch.). — La Malgrange, sous des pierres (Vouaux); Epinal (Host).

Diaperis Muller

BOLETI L. — La Malgrange; Champigneulles; forêt de Champenoux (Vouaux).

Scaphidema Redtb.

METALLICUM F. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

Platydema Lap.

VIOLACEA F. — Bois de Gircourt, en décembre, dans la mousse d'un chêne (de Brunier).

DEJEANI Lap. — Strasbourg : près du pont du Rhin, un ind. (Bod.).

Alphitophagus Steph.

BIFASCIATUS Say. — Strasbourg : Manutention militaire, en octobre 1917, en grand nombre dans de la balayure (Sch.).

ULOMINI

Tribolium Mac Leay

FERRUGINEUM F. — Strasbourg, en très grand nombre avec l'espèce précédente (Sch.).

Palorus J. Duv.

DEPRESSUS F. — Strasbourg, également en grande quantité, avec les précédents (Sch.).

Corticeus Crotsch

(**Hypophloeus** Fabr.)

FRAXINI Kugel. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

PINI Panz. — Forêt de Geudertheim, sous une écorce de pin sylvestre, fin janvier (Loppinet).

BICOLOR Oliv. — Strasbourg : au Jardin botanique (Burr).

LINEARIS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Laneuveville, sous les écorces d'un orme mort, mi-novembre (Vouaux).

Echocerus Horn

CORNUTUS F. — Strasbourg : sur un sac ayant contenu des poires sèches (Sch.). — Laître-sous-Amance, dans du pain (Vouaux).

Alphitobius Steph.

PICEUS Oliv. — Strasbourg : port du Rhin, dans un magasin de denrées coloniales (Sch.).

HELOPINI

Helops F.

* CONVEXUS Küst. — Ballon de Guebwiller, dans de la mousse, sur une vieille souche (Sch.).

STRIATUS Geoffr. — Strasbourg : à l'Orangerie, forêts de La Robertsau et du Neuhof; Herrenwald, près de Vendenheim, sous des écorces; Saint-Nabor (Sch.); côte de l'Elsberg; Sainte-Odile, au mur païen (Bod.). — Roches de La Burre (Sainte-Claire Deville).

LANIPES L. — Schirmeck; côte du Donon; Orbey (Sch.); Riquewihr (Bod.).

ALLECULIDAE

Eryx Steph.

(**Prionychus** Solier)

ATER F. — Blainville, en juin (Vouaux).

Gonodera Muls.

LUPERUS Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Champigneulles, en mai (Vouaux).

Isomira Muls.

MURINA L. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Eschau; Dingsheim; Schirmeck (Sch.). — Plateau d'Amance, en juin; Jarny; La Malgrange (Vouaux).

V. MAURA F. — Avec le type, mais plus rare (Sch.).

Mycetochara Berthold

BIPUSTULATA Illig. — Saint-Georges, en juin (Vouaux).

LINEARIS Illig. — La Malgrange, en juin (Vouaux).

Cteniopus Solier

FLAVUS Scop. — Ballon de Guebwiller, en juillet (Vouaux).

* V. ♂ PALPALIS Seidl. — Dossenheim (Burr).

Omophlus Sollier

LEPTUROIDES F.— Rothau; Trois-Epis; Col de La Schlucht; Hohneck (Sch.).

RUGOSICOLLIS Brull. — Côtes du Schneeberg et du Donon; Brézouard; Hohneck (Sch.). — Vallée de Champigneulles, en mai (Vouaux).

LAGRIIDAE

Lagria F.

ATRIPES Muls. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

MELANDRYIDAE

TETRATOMINI

Tetratoma F.

ANCORA F. — Col de La Schlucht; Vandœuvre, dans les mousses, en novembre (Vouaux).

ORCHESINI

Hallomenus Panz.

BINOTATUS Quens. — Kichompré, en piégeant dans les sapinières avec un amas de champignons, en septembre (de Brunier).

Orchesia Latr.

MICANS Panz. — Saverne (Host); Willgottheim, dans un champignon arboricole (Sch.).

MINOR Walk. — Hohneck (Sch.).

DIRCAEINI

Abdera Steph.

FLEXUOSA Payk. — La Malgrange, fin mai (Vouaux).

Serropalpus Hellenius

BARBATUS Schall. — Jarny, dans la salle paroissiale en construction, com. juillet (Vouaux).

HYPULINI

Hypulus Payk.

QUERCINUS Quens. — Willgottheim, dans un bolet (Sch.).

Zilora Muls.

* SERICEA Sturm. (*Eugeniae* Ganglb.).— Barr, sur l'écorce d'un arbre mort (Dr Sicard). — Cette espèce est signalée comme ayant été capturée dans la région par J. Linder, mais sans indication plus précise (*Cf.* W. F. ERICHSON, *Naturg. der Insekten Deutschlands, Melandryidae*, p. 613).

MELANDRYINI

Melandrya Fabr.

CARABOIDES L. — Hachimette (Sch.); Pfetterhouse, sous une écorce, en mai (de Brunier). — Etueffont, au soleil, sur le bois d'une scierie (de Brunier).

CONOPALPINI

Conopalpus Gyllh.

* BREVICOLLIS Kr. — Barr (Dr Sicard).

OSPHYINI

Osphya Illig.

BIPUNCTATA F. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Achenheim; Saint-Nabor (Bod.).

MORDELLIDAE

SCRAPTINI

Scraptia Latr.

DUBIA Oliv. — Strasbourg : Fuchs-am-Buckel (Burr). — Laître-sous-Amance (Vouaux); Blainville (Host).

MORDELLINI

Tomoxia Costa

BIGUTTATA Gyllh. — La Malgrange; en mai (Vouaux).

Mordella L.

* FASCIATA V. INTERRUPTA Costa. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Laître-sous-Amance (Vouaux).

Mordellistena Costa

ABDOMINALIS F. — Laître-sous-Amance, au vol, en mai (Vouaux).

NEUWALDEGGIANA Panz. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Forêt de Champenoux, en juillet; Champigneulles (Vouaux); Epinal (Host).

LATERALIS Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Laître-sous-Amance, dans un jardin, en juin (Vouaux).

NANA Mots. — Brumath, un ex., sur *Daucus carota* (Sch.). — Briey, fin juillet (Vouaux).

PARVULA Gyllh. — Forêt de Vitrimont, en mai (Vouaux).

PUMILA Gyllh. — Strasbourg : au Jardin botanique (Sch.), id., forêt du Neuhof (Bod.); Reichstett; Dingsheim (Sch.). — Forêt de Champenoux, en juin (Vouaux).

STENIDEA Muls. — Mutzig, sur *Cichorium intybus* (Sch.).

ANASPIDINI

Cyrtanaspis Emery

PHALERATA Germ. — Strasbourg : Jardin botanique, sur des fleurs à ombelle (Sch.).

Anaspis Latr.

GEOFFROYI Müll. — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

MACULATA Geoffr. — Idem; bords de l'étang de Champigneulles (Vouaux).

* FRONTALIS v. LATERALIS F. — Plateau d'Amance, fin mai (Vouaux).

RUFICOLLIS F. — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

PULICARIA Costa. — Idem, en juin (Vouaux).

SUBTESTACEA Steph. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

Nassipa Emery

FLAVA L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); id., au Wacken (Sch.). — Jarny, dans le jardin de la cure, com. juin; forêt de Vitrimont (Vouaux); Epinal (Host).

RUFILABRIS Gyllh. — Saverne; Holzheim; Barr (Sch.); col de La Schlucht, en juillet (Vouaux).

RHIPIPHORIDAE

RHIPIPHORINI

Rhipiphorus F.

PARADOXUS L. — Kriegsheim, aux abords d'un nid de *Vespa vulgaris* (Sch.); Kerzfeld (Musée de Strasbourg).

MELOIDAE

MELOINI

Meloë L.

CICATRICOSUS Leach. — Laître-sous-Amance, en avril (Vouaux).

CORIARUS Brandt. — Saverne; Hohneck; ballon de Guebwiller (Sch.).

VARIEGATUS Donov. — Saverne; Grendelbruch; Schirmeck; côte du Donon; Barr (Sch.).

RUGOSUS Marsh. — Schirmeck; Rothau (Sch.). — Plateau d'Amance; La Malgrange, en septembre (Vouaux); Epinal (Host).

SCABRIUSCULUS Brandt. — Hoenheim (Bod.); Brumath; Dingsheim; Lampertheim; Zeinheim, ♂ ♀, le 5 mai; Oberhausbergen; Kleinfrankenheim; Gerstheim; Plobsheim; Rhinau; Rothau (Sch.).

BREVICOLLIS Panz. — Reichstett (Sch.). — La Malgrange, com. mai (Vouaux).

LYTTINI

Lytta F.

VESICATORIA L. — Rothau; La Vancelle; Thann, sur *Syringa chinensis* (Sch.).

Sitaris Latr.

MURALIS Forst. — De nombreux ind. dans un bloc de *Loess*, contenant une colonie d'*Anthophora fulvitarsis* à Wolfisheim (Musée de Strasbourg).

PYROCHROIDAE

Pyrochroa Geoffr.

COCCINEA L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Klein, Sch.); id., forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Truchtersheim; Vendenheim (Sch.); Ottrott (Bod.). — Forêt de Champenoux, en mai (Vouaux); Epinal (Host); Vallée de la Madeleine (de Brunier).

SERRATICORNIS Scop. — Strasbourg : La Robertsau (Klein, Sch.); id., forêt du Neuhof (Bod.). — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

PECTINICORNIS L. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.); Pfetterhouse, en mai, dans les tranchées (de Brunier). — La Croisette d'Hérival (Host).

ANTHICIDAE

ANTHICINI

Notoxus F.

BRACHYCERUS Fald. — Strasbourg : forêt du Neuhof, près de l'Altenheimerhof (Sch.).

MONOCEROS L. — Strasbourg : La Robertsau, près d'une gravière, entre les racines des graminées, en mars (Klein); id., forêt du Neuhof (Bod., Sch.). — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

TRIFASCIATUS Rossi. — Messein, com. juillet (Vouaux).

Anthicus Payk.

INSTABILIS Schmidt. — Strasbourg : forêt du Neuhof, sur terrain sablonneux (Sch.).

ANTHERINUS L. — Idem (Bod.); Mittelschaeffolsheim, fin août (Sch.); côte de l'Elsberg (Bod.).

BIFASCIATUS Rossi. — Laître-sous-Amance, dans les jardins, en mars-avril (Vouaux).

FLAVIPES Panz. — Idem, dans des débris, en avril (Vouaux).

* V. FLAVESCENS Pic. — Avec la forme typique (Vouaux).

OEDEMERIDAE

Nacerdes Schmidt

Anoncodes Schmidt

RUFIVENTRIS Scop. — Strasbourg : La Robertsau, sur différentes ombellifères (Sch.).

USTULATA F. — Epinal (Host).

Pachychirus Redtb.

ADUSTA Panz. — Barr (Sch.).

Asclera Schmidt

SANGUINICOLLIS F. — Baerenkopf, entre la source de la Madeleine et de la Doller, en juin (de Brunier).

COERULEA L. — Dogneville (Host).

Oedemera Oliv.

PODAGRARIAE L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Sainte-Odile (Sch.).

FLAVESCENS L. — Châtenois; Sainte-Odile; Rouffach (Sch.).

TRISTIS Schmidt. — Col de La Schlucht, route de Munster (Vouaux).

* NOBILIS v. AURICEPS Rey. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

FLAVIPES F. — Strasbourg : au Wacken (Sch.); Saint-Nabor (Sch.).

LURIDA Marsh. — Reichstett; Rumersheim; Kleinfrankenheim; Artolsheim; Richtolsheim (Sch.).

Chrysantia Schmidt

VIRIDISSIMA L. — Strasbourg : au Wacken (Sch.). — Col de La Schlucht; ballon de Guebwiller (Vouaux).

VIRIDIS Schmidt. — Forêt de Vitrimont, en juin (Vouaux).

PYTHIDAE

PYTHINI

Pytho Latr.

DEPRESSUS L. — Côte de l'Elsberg (Bod.).

SALPINGINI

Lissodema Curtis

QUADRIPUSTULATUM Marsh. — Strasbourg : à l'Orangerie, sous les écorces (Sch.). — Lancuvelotte, sur un piquet, en juin (Vouaux).

Rhinosimus Latr.

VIRIDIPENNIS Latr. — La Malgrange, dans un fagot, en juin (Vouaux).

PLANIROSTRIS F. — Reichstett (Sch.); Barr; Klingenthal (Bod.). — Blainville, dans des débris, en avril; La Malgrange (Vouaux).

CURCULIONIDAE

OTIORRHYNCHINI

Otiorrhynchus Germar

ARMADILLO v. SCABRIPENNIS Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

SUBSTRIATUS Gyllh. — Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville, Vouaux). — Epinal (Host).

TENEBRICOSUS auct. *nec* Herbst. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

v. LUGDUNENSIS Boh. — Raon-l'Etape (Host).

NIGER v. VILLOSOPUNCTATUS Gyllh. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.). — Epinal (Host).

FUSCIPES Oliv. — Zeinheim; Mutzig (Sch.); Ottrott, en grand nombre sur *Fagus* (Bod.).

MORIO F. — Côte du Schneeberg (Sch.).

v. EBENINUS Gyllh. — Avec le type, mais plus rare (Sch.).

RAUCUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Forêt de Champenoux; Jarny (Vouaux).

UNCINATUS Germ. — Hohneck, en juin, un ind. (Sch.).

SCABER L. — Hoenheim, un ex. (Bod.). — Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville).

PORCATUS Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Saint-Nabor (Bod.). — Blainville (Host).

NODOSUS F. — Ottrott (Bod.); col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville).

* v. BRUCTERI Germ. (*demotus* Boh.). — Ballon de Guebwiller (Sch.). — Déjà signalé de la région du Harz.

* ARCTICUS F. (*alpinus* Richter, *laevigatus* Gyllh.). — Strasbourg : au marché aux fruits, dans un panier d'airelles (Sch.). — Probablement importé.

SINGULARIS v. CHEVROLATI Gyllh. — Epinal, avec le type (Host).

* AUSTRIACUS F. — Bois de Razimont, près d'Epinal (Host).

SULCATUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); id., à la Montagne-Verte (Sch.). — La Malgrange; forêt de Vitrimont (Vouaux); Tendon (Host).

LIGUSTICI L. — Saverne : côte du Brotschberg; Zeinheim; Ernolsheim; Kriegsheim; Gugenheim (Sch.). — Nancy; Epinal (Host).

OVATUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Hoenheim, sur des pommiers. — Epinal (Host).

LEUCOGRAMMUS Germ. — Strasbourg : au Heiritz, deux ind., sur un poirier (Sch.).

CALCARATUS v. DENSATUS Schilsky. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Sch.).

* URTICAE v. PIRI Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

* SCUTELLARIS Redtb. — Strasbourg : forêt du Neuhof, un ex. (Bod., Fleischer *det.*).

ALPINUS Stierl. — Ballon de Guebwiller (Vouaux).

* ARGENTATUS v. VIRIDANS Boh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

ARBORATOR Herbst. — Sainte-Odile (Sch.).

MACULICORNIS Germ. — Lac Blanc (Sch.). — Tendon (Host).

VIRIDICOLLIS F. — Forêts de Haguenau et de Brumath (Sch.). — Allarmont (Host).

PARVULUS Oliv. — Reichstett, lisière sud du Herrenwald (Sch.).

VIRIDIAERIS Laich. — Forêt de Champenoux, en mai (Vouaux).

SINUATUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Docelles (Vouaux).

BRACHYDERINI

Polydrosus Germ.

Metallites Germ.

IMPAR Gozis. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Munster; Thann (Sch.). — Laître-sous-Amance, en juin (Vouaux).

ATOMARIUS Oliv. — Idem, dans le jardin de la cure, en juillet (Vouaux).

MARGINATUS Steph. — Forêt de Vitrimont, en avril (Vouaux).

Chlorodrosus Daniel

AMOENUS Germ. — Ballon de Guebwiller, sur *Rosa alpina*, en juillet (Vouaux).

Eudipnus Thoms.

MOLLIS Stroem. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Barr; Thann (Sch.).

Eustolus Thoms.

FLAVIPES Deg. — Epinal (Host).

CERVINUS L. — Côte de l'Elsberg; Saint-Nabor (Bod.).

* V. MELANOTUS Steph. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

* PILOSUS Gredler (*binotatus* Thoms., *melanostictus* Chevr., *arvernicus* Desb.). — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

Polydrosus in sp.

PRASINUS Oliv. — Jarny; Laître-sous-Amance, en juillet (Vouaux).

Tylodrusus Stierl.

PTERYGOMALIS Boh. — Laître-sous-Amance, sur les buissons, en mai (Vouaux).

CORUSCUS Germ. — Epinal (Host).

Stasiodis Gozis

* PARVULUS F. — Ballon de Guebwiller (Sch.). — Déjà cité de la Forêt Noire.

Brachysomus Steph.

(**Platytarsus** Schoenh.)

ECHINATUS Bonsdorff. — Strasbourg : au Wacken; forêt de Haguenau (Sch.).

Barypithes Duval

MONTANUS Chevr. — Etueffont, Rougemont, commun toute l'année, en criblant le terreau au pied des arbres (de Brunier).

MOLLICOMUS Ahr. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en nombre, dans les mousses (Sch.).

Strophosomus Steph.

RUFIPES Steph. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Achenheim (Bod.). — Allarmont (Host).

RETUSUS Marsh. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

Eusomus Germ.

OVULUM Germ. — Bollenberg, près de Rouffach, sur terrain calcaire (Sch.).

Brachyderes Schoenh.

INCANUS L. — Saverne : côte du Brotschberg; Grendelbruch (Sch.). — Epinal (Host).

Sitona Germ.

GRESSORIUS F. — Strasbourg : à l'Orangerie (Sch.). — Epinal (Host).

REGENSTEINENSIS Herbst. — Schirmeck ; Saint-Nabor (Sch.). — Laître-sous-Amance, en mai et octobre (Vouaux).

CAMBRICUS Steph. — Idem, en été (Vouaux).

CRINITUS Herbst. — Idem, en juin (Vouaux).

TIBIALIS Herbst. — Zeinheim; Urmatt (Sch.). — Laître-sous-Amance, en juin et juillet (Vouaux).

HISPIDULUS F. — Idem, en juin (Vouaux).

* LANGUIDUS Gyllh. — Ottrott, un ex. (Bod.).

HUMERALIS L. — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

SUTURALIS Steph. — Idem, en été (Vouaux).

Trachyphloeus Germ.

ALTERNANS Gyllh. — Laître-sous-Amance, en été (Vouaux).

SPINIMANUS Germ. — Plateau d'Amance, en août (Vouaux).

SCABRICULUS L. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

ARISTATUS Gyllh. — Hoerdt, sur terrain sablonneux (Sch.).

CNEORRHININI

Liophloeus Germ.

PULVERULENTUS Boh. — Allarmont (Host).

TESSULATUS Müller. — Ingwiller (Bod.); forêt de Haguenau; Nideck; Rothau (Sch.). — Forêt de Champenoux, en juin (Vouaux).

v. AQUISGRANENSIS Foerst. — Climont; Hohwald (Sch.). — La Malgrange, en avril (Vouaux).

Barynotus Germ.

MOERENS F. — Lisière du Herrenwald, près de Vendenheim; Saverne : route vers Stambach (Sch.).

TANYMECINI

Chlorophanus Germ.

VIRIDIS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en nombre (Bod.); id., La Robertsau (Sch.).

v. SALICICOLA Germ. — Strasbourg, avec le type (Bod.); id., La Montagne-Verte (Sch.).

GIBBOSUS Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof, deux ind. (Sch.).

* DORSIGER Faust. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Aurait, d'après Lucas von Heyden, déjà été capturé à Strasbourg en 1897 (Cf. *Stettiner Ent. Z.* p. 86). Signalé aussi des environs de Mayence (Dr Zitz) et d'Andernach (Dr Carové), il y a une vingtaine d'années.

GRAMINICOLA Schoenh. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, deux ind. (Sch.).

Tanymecus Schoenh.

PALLIATUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Laître-sous-Amance, en juin (Vouaux).

CLEONINI

Cleonus Schoenh.

Plagiographus Chevr.

ERICAE Fahrs. — Plateau d'Amance, en avril (Vouaux).

GLAUCUS F. — Ottrott (Bod.).

V. TURBATUS Fahrs. — Forêt de Brumath (Sch.).

Chromoderus Mots.

FASCIATUS Müll. — Forêt de Vitrimont, en octobre (Vouaux).

Mecaspis Schoenh.

ALTERNANS Herbst. — Strasbourg : digue du Rhin, près de La Robertsau (Sch.). — La Malgrange, en mai (Vouaux); Epinal (Host).

COENOBITA Oliv. — Toul : Pain de Sucre, en avril (Vouaux).

Pseudocleonus Chevr.

CINEREUS Schrk. — Artolsheim, un ind., en juin, dans un champ de pois (Sch.).

Cleonus in sp.

PIGER Scop. — Achenheim, dans les briqueteries (Bod.); Colmar (Sch.). — Forêt de Champenoux, en septembre (Vouaux); Chaligny (Host).

Cyphocleonus Mots.

TRISULCATUS Herbst. — Jarny; forêt de Champenoux, en septembre (Vouaux).

TIGRINUS Panz. — Laître-sous-Amance, sur *Ombellifères*, en août (Vouaux).

Leucosomus Mots.

PEDESTRIS Poda. — Epinal (Host).

Lixus Fabr.

PARAPLECTICUS L. — Stambach; Hoerdt, près de la maison forestière Sandgrube (Sch.).

PUNCTIVENTRIS Boh. — Pompey, en mai (Vouaux).

ASCANII L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — La Malgrange, en mai (Vouaux).

ALGIRUS L. — Saverne; Schirmeck (Sch.). — Laître-sous-Amance, en juin (Vouaux).

V. FERRUGATUS F. — Epinal (Host).

CARDUI Oliv. — Hohwald (Sch.).

ELONGATUS Goeze. — Saverne (Sch.). — Laître-sous-Amance, en juin (Vouaux); Blainville (Host).

CRIBRICOLLIS Boh. — Blainville, en avril (Vouaux).

Larinus Germ.

TURBINATUS Gyllh. — Lac Blanc; col de La Schlucht (Sch.). — Plateau d'Amance, en juin (Vouaux).

STURNUS Schall. — Saverne; Zeinheim; Avolsheim (Sch.).

PLANUS F. — Plobsheim; Richtolsheim (Sch.). — Jarny; La Malgrange; Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

JACEAE F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Trois-Epis; col de La Schlucht (Sch.). — Jarny, en août; Laître-sous-Amance (Vouaux); Chavigny (Host).

Rhinocyllus Germ.

CONICUS Froelich. — Laître-sous-Amance; La Malgrange (Vouaux).

TROPIPHORINI

Tropiphorus Schoenh.

CARINATUS Müll. — Niederbronn (Sch.). — Pompey; Jarny, en mai (Vouaux).

RHYTIRRHININI

Minyops Schoenh.

CARINATUS L. — Messein, en mai; Laître-sous-Amance (Vouaux).

Gronops Schoenh.

LUNATUS F. — Forêt de Brumath (Sch.). — N'est pas synonyme de SEMINIGER Allard. (Cf. Fasc. VI, p. 454.) [1]

1 M. René Oberthür, de Rennes, possède le type du SEMINIGER Allard qui, à son avis, provient d'Alger et non d'Alsace et qui correspond en effet parfaitement à bon nombre de spécimens de sa collection. — Ernest Allard avait la déplorable habitude d'inscrire en abrégé les localités de ses insectes. Par exemple, *Alg.* pour *Algérie*, *Als.* pour *Alsace*. Il y a lieu de supposer qu'Allard aura lu *Als.* alors qu'il aurait dû lire *Alg.*, et de là son erreur.

Alophus Schoenh.

TRIGUTTATUS F. — Strasbourg : digue du Rhin, près de La Robertsau (Sch.). — Laître-sous-Amance, bords de l'Amezule, en avril (Vouaux); Epinal (Host).

HYLOBIINI

Lepyrus Germ.

PALUSTRIS Scop. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Rothau (Sch.). — Messein; Laître-sous-Amance, depuis mars (Vouaux).

CAPUCINUS Schall. — Saverne; Zeinheim (Sch.). — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux); Messein (Host).

Hylobius Schoenh.

FATUUS Rossi. — Messein, en mai (Vouaux).

Liparus Oliv.

(**Molytes** Schoenh.)

GERMANUS L. — Saverne (Host); Rouffach; Hohneck; Ferrette (Sch.). — Nancy : au Fond-de-Toul, en mai (Vouaux).

CORONATUS Goeze. — Strasbourg : au Wacken et près de la digue du Rhin, aux environs de La Robertsau; Urmatt (Sch.). — Nancy : forêt de Haye (Host); Laître-sous-Amance; La Malgrange, assez commun (Vouaux).

Plinthus Germ.

(**Meleus** Lacord.)

MEGERLEI Panz. — Longemer (Host).

Epipolaeus Weise

CALIGINOSUS F. — Ottrott (Bod.). — Jarny, dans de vieux fagots (Vouaux); Epinal (Host); Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

Liosoma Steph.

(**Leiosomus** Schoenh.)

DEFLEXUM Panz. — Saverne (Sch.). — La Malgrange, dans des débris, en mars (Vouaux).

OBLONGUM Boh. — Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville). — Froidefontaine, en criblant la mousse d'un chêne (de Brunier).

Trachodes Germ.

HISPIDUS L. — Forêt de Vitrimont, en mai (Vouaux).

HYPERINI

Hypera Germ

OXALIDIS v. OVALIS Boh. — Col de La Schlucht (Sch.).

Phytonomus Schoenh.

Donus Capiom.

FASCICULATUS Herbst. — Champigneulles, dans des débris, en avril (Vouaux).

Erirrhinomorphus Capiom.

ADSPERSUS L. — Blainville, fin novembre; forêt de Vitrimont (Vouaux).

RUMICIS L. — La Malgrange, en mai; plateau d'Amance, en mars (Vouaux).

Triginellus Capiom.

PASTINACAE v. TIGRINUS Boh. — Jarny, en juillet (Vouaux).

Dapalinus Capiom.

MELES F. — Jarny, commun (Vouaux).

Phytonomus in sp.

ARATOR L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Sainte-Anne (Sch.). — Nancy (Host); Etival, fin mai (Vouaux).

PEDESTRIS Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); La Wanzenau; Saverne (Sch.). — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

MURINUS F. — Dabo; Barr (Sch.). — Forêt de Champenoux, en mai (Vouaux).

PLANTAGINIS Deg. — Côte de l'Elsberg; Klingenthal (Bod.). — La Malgrange, en mai (Vouaux).

Phytonomidius Capiom.

TRILINEATUS Marsh. — Strasbourg : La Musau, dans les jardins, en juillet, sur différentes crucifères (Sch.). — Forêt de Champenoux, en mai (Vouaux).

* CONSTANS Boh. (*balteatus* Chevr.). — Un ind. provenant de la collection Berher et étiqueté *Epinal* (*in coll.* Host).

Limobius Schoenh.

BOREALIS Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof, La Ganzau (Sch.). — Plateau d'Amance, sous les écorces, en novembre (Vouaux).

Coniatus Germ.

REPANDUS F. — Bouxières-aux-Dames (Host).

ERIRRHININI

Pissodes Germ.

PINI L. — La Malgrange, en octobre (Vouaux); Epinal (Host).

HARCYNIAE Herbst. — Col de La Schlucht, en juin (Vouaux).

Grypidius Steph.

EQUISETI F. — Strasbourg : La Robertsau, La Montagne-Verte; Illkirch (Sch.). — Jarny, en juillet (Vouaux).

BRUNNEIROSTRIS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Bosserville, dans des débris, en mars; Messein; forêt de Vitrimont (Vouaux).

Pachytychius Jeckel

SPARSUTUS Oliv. — Blainville (Host).

Erirrhinus Schoenh.

FESTUCAE Herbst. — Etang de Champigneulles, en avril; plateau d'Amance (Vouaux).

NEREIS Payk. — Laître-sous-Amance, bords de l'Amezule, en avril (Vouaux).

Notaris Steph.

BIMACULATUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, dans terrain marécageux (Sch.).

SCIRPI F. — Ottrott (Bod.).

ACRIDULUS L. — Jarny ♂ ♀ (Vouaux).

Dorytomus Steph.

LONGIMANUS Forst. — Saverne, sur des peupliers, en nombre (Sch.).

TORTRIX L. — Ottrott (Bod.).

MINUTUS Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

VALIDIROSTRIS Gyllh. — Kaysersberg (Sch.).

HIRTIPENNIS Bedel. — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

FILIROSTRIS Gyllh. — Messein, un ex. ♂, en octobre (Vouaux).

DEJEANI Faust. — Saint-Nabor; côte de l'Elsberg (Bod.). — Epinal (Host).

AFFINIS Payk. — Forêt de Champenoux, sur *Salix*, en avril (Vouaux).

MELANOPHTALMUS Payk. — La Malgrange et environs, en mai (Vouaux).

SALICINUS Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Hoenheim (Bod.).

RUFULUS Bedel. — Environs de La Malgrange, en mai (Vouaux); Epinal (Host).

DORSALIS L. — Epinal (Host).

Smicronyx Schoenh.

JUNGERMANNIAE Reich. — Plateau d'Amance, en octobre (Vouaux).

Brachonyx Schoenh.

PINETI Payk. — Strasbourg : au Wacken, Kronenbourg (Sch.). — Docelles, en juin (Vouaux).

Anoplus Schoenh.

PLANTARIS Naezen. — Forêt de Vitrimont, en mai; La Malgrange, en juin (Vouaux); Epinal (Host).

ROBORIS Suffr. — Forêt du Neuhof (Bod.). — Forêt de Vitrimont, en août (Vouaux).

Tanysphyrus Germ.

LEMNAE Payk. — Riquewihr (Bod.). — Bosserville, bords de la Meuse, dans des débris, en mars (Vouaux).

Bagous Schoenh.

CYLINDRUS Payk. — Côte du Climont, près de la ferme Caroline (Sch.).

FRIT Herbst. — Etang de Champigneulles, en août (Vouaux).

CLAUDICANS Boh. — Bosserville, bords de la Meurthe, en avril (Vouaux).

LUTULOSUS Gyllh. — Sainte-Marie-aux-Mines (Sch.).

GLABRIROSTRIS Herbst. — Illkirch (Sch.).

Hydronomus Schoenh.

ALISMATIS Marsh. — Laître-sous-Amance, dans des débris, en avril (Vouaux).

Pseudostyphlus Tourn.

PILUMNUS Gyllh. — Niederbronn (Sch.).

COSSONINI

Cossonus Clairv.

LINEARIS F. — Brumath (Sch.). — Laître-sous-Amance; La Malgrange (Vouaux).

CYLINDRICUS Sahlb. — Strasbourg : La Robertsau, La Ganzau (Sch.). — Laître-sous-Amance; La Malgrange; forêt de Champenoux (Vouaux).

Codiosoma Bedel

SPADIX Herbst. — Strasbourg : deux ind., dans une vieille

maison d'habitation de la rue du Fossé-des-Tanneurs (Sch.). — Nancy, au Musée Lorrain (Host).

Rhyncolus Steph.

Eremotes Woll.

ELONGATUS Gyllh. — Col de La Schlucht, en juillet (Vouaux). — Epinal (Host).

ATER L. — Hohneck (Sch.).; Col de La Schlucht, en compagnie du précédent (Vouaux).

REFLEXUS Boh. — La Malgrange, sur érables, en avril (Vouaux).

Brachytemnus Woll.

PORCATUS Germ. — Versant est du Donon (Sch.).

CRYPTORRHYNCHINI

Cryptorrhynchus Illig.

LAPATHI L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); id., La Meinau (Sch.).

Acalles Schoenh.

CAMELUS F. — Hohneck (Sch.).

AUBEI Boh. — Bussang; Gérardmer (Sainte-Claire Deville).

PYRENAEUS Boh. — Ottrott, un indiv. (Bod.). — Parigoutte, en septembre (Vouaux).

ROBORIS Curtis. — La Maix, fin mai; Vitrimont (Vouaux).

LEMUR Germ. — Laître-sous-Amance, en avril (Vouaux).

ECHINATUS Germ. — La Malgrange, dans des débris en mars (Vouaux); Froidefontaine, dans le terreau d'un vieux saule (de Brunier).

HYPOCRITA Boh. — Plateau d'Amance, dans du vieux bois, en avril (Vouaux); Etueffont (de Brunier). [1]

CEUTORRHYNCHINI

Coeliodes Schoenh.

DRYADOS Gmel. — Forêt de Vitrimont, en juillet (Vouaux); Epinal (Host).

RUBER Marsh. — Blainville (Host).

ERYTHROLEUCUS Gmel. — Laître-sous-Amance, ♂ ♀, en mai (Vouaux).

CARDUI Herbst. — Strasbourg : Jardin botanique, sur *Oenothera biennis* (Sch.). — Plateau d'Amance, en novembre (Vouaux).

FULIGINOSUS Marsh.— Jarny, en juillet; Plateau d'Amance, en septembre (Vouaux).

EPILOBII Payk. — Col de La Schlucht, en mai et juin (Vouaux).

AFFINIS Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Ottrott (Bod.). — Epinal (Host).

EXIGUUS Oliv. — Plateau d'Amance, en mai, forêt de Champenoux (Vouaux).

1 DIOCLETIANUS Germ. — Cité des Vosges par Schilsky (Suppl. I, p. 242) est à rayer de notre faune. (Cf. *Ent. Blætter*, 15. Jahrg. Heft 1-3, p. 42 et suivantes.)

ROLLETI Germ. — Egalement cité d'Alsace par Schilsky, n'a jamais été trouvé dans nos régions.

Rhytidosoma Steph.

GLOBULUS Herbst. — Forêt de Vitrimont, en juin (Vouaux).

Rhinoncus Steph.

CASTOR F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, près de la digue du Rhin; Zeinheim (Sch.). — Messein, en mai (Vouaux).

BRUCHOIDES Herbst. — Strasbourg : au Wacken, dans des débris (Sch.). — Forêt de Champenoux, en juillet (Vouaux).

GRAMINEUS F. — Schirmeck (Sch.).

PERICARPIUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Ottrott Bod.); Vendenheim (Sch.). — Laître-sous-Amance, sur les graminées, en mai (Vouaux).

PERPENDICULARIS Reich. — Laître-sous-Amance, com. juin; Messein (Vouaux); Champigneulles (Host).

ALBICINCTUS Gyllh. — Epinal, à l'étang Florion (Host).

Phytobius Schoenh.

COMARI Herbst. — Illkirch, bords de l'Ill (Sch.). — Laître-sous-Amance, en octobre; Jarny, en juin (Vouaux).

QUADRITUBERCULATUS F. — La Malgrange, dans des débris, en mars; Laître-sous-Amance (Vouaux).

Pachyrrhinus Steph.

GRANATUS Gyll. — Messein, en avril (Vouaux).

QUADRINODOSUS Gyll. — Strasbourg : Fischerinsel (Sch.).

— Laître-sous-Amance et Jarny, en mars (Vouaux); Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

Litodactylus Redtb.

LEUCOGASTER Marsh. — Forêt de Champenoux (Vouaux).

VELATUS Beck. — Strasbourg : forêt du Neuhof, sur terrain marécageux (Bod.).

Amalus Schoenh.

HAEMORRHOUS Herbst. — Laître-sous-Amance; environs de La Malgrange, en mai (Vouaux).

Ceuthorrynchidius Duval

RUFULUS Dufour. — Jarny, en juillet (Vouaux).

TERMINATUS Herbst. — Sundhausen (Sch.). — Laître-sous-Amance, en octobre (Vouaux).

APICALIS Gyllh. — Clefcy, bords de la Moselle, dans des débris, en avril; Messein (Vouaux); Epinal (Host).

NIGRINUS Marsh. — La Malgrange, com. mai (Vouaux).

MELANARIUS Steph. — Idem, dans des débris, en mars; Jarny, en mai (Vouaux).

FLORALIS Payk. — Strasbourg : Jardin botanique, au Wacken (Sch.). — Jarny, jardin du presbytère, com. juillet (Vouaux).

POSTHUMUS Germ. — La Malgrange, com. mai (Vouaux).

Ceuthorrhynchus Germ.

VIDUATUS Gyllh. — Strasbourg : au Wacken, au bord d'une mare (Sch.).; Muttersholz (Kraencker). — Etang de Champigneulles, en avril; Jarny (Vouaux).

PUBICOLLIS Gyllh. — Forêt de Vitrimont, en juillet, un ♂ ; Saint-Georges, une ♀ (Vouaux).

SYMPHYTI Bedel. — Strasbourg : Jardin botanique (Burr). — Bosserville, dans des débris, en mars; Jarny (Vouaux).

ABBREVIATULUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); id., digue du Rhin, près de l'Altenheimerhof (Sch.).

ALBOSIGNATUS Gyllh. — Strasbourg : prés du Wacken, en fauchant (Sch.). — Blainville (Host).

GEOGRAPHICUS Goeze. — Strasbourg : La Robertsau, forêt du Neuhof (Sch.). — Forêt de Champenoux, en septembre (Vouaux).

* RADULA Germ. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

ASPERIFOLIARUM Gyllh. — Laître-sous-Amance; Messein; Champigneulles (Vouaux).

CRUCIFER Oliv. — Laître-sous-Amance, en mai; Vandœuvre (Vouaux).

ORNATUS Gyllh. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, Fuchs-am-Buckel (Sch.). — Jarny, fin août (Vouaux).

LITURA F. — Jarny, en septembre; forêt de Champenoux (Vouaux).

VARIEGATUS Oliv. — Laître-sous-Amance, en juin et juillet (Vouaux).

MELANOSTICTUS Marsh. — Barr (Sch.). — Jarny, ♂ ♀, en avril (Vouaux).

QUADRIDENS Panz. — Ottrott; côte de l'Elsberg (Bod.).

MACULA-ALBA Herbst. — Jarny, en juillet (Vouaux); Essey-les-Nancy (Host).

MARGINATUS Payk. — Laître-sous-Amance, en juin (Vouaux).

PUNCTIGER Gyllh. — Ottrott (Bod.).— Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

DENTICULATUS Schrk. — Jarny, dans la cuisine du presbytère, un ind., en avril (Vouaux).

VERRUCATUS Gyllh. — A rayer de notre faune jusqu'à plus ample informé (Suppl. I, p. 244). — L'exemplaire capturé au Neuhof est à rapporter à l'espèce précédente (Sainte-Claire Deville).

POLLINARIUS Forst. — Barr (Sch.). — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

PLEUROSTIGMA Marsh. — Forêt de Vitrimont, en avril; Laître-sous-Amance, en juillet (Vouaux).

RAPAE Gyllh. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

NAPI Gyllh. — Laître-sous-Amance, dans la cuisine du presbytère, un ind., fin avril (Vouaux).

HIRTULUS Germ. — Frolois, fin juin, un ex. (Vouaux).

CHALYBAEUS Germ. — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

ERYSIMI F. — Strasbourg : La Montagne-Verte (Sch.); Ottrott (Bod.); Sundhausen (Sch.). — La Malgrange, dans des débris, en avril (Vouaux); Blainville (Host).

CONTRACTUS Marsh. — Laître-sous-Amance; Champigneulles; Messein (Vouaux).

SUTURELLUS Gyllh. — Longemer (Host).

ALBOVITTATUS Germ. — Hohneck (Sch.).

SUTURALIS F. — Ottrott (Bod.).

CONSPUTUS Germ. — Jarny, en juillet (Vouaux).

SYRITES Germ. — Marbache, en mai, un ex. (Vouaux); Bosserville (Host).

ASSIMILIS Payk. — Plobsheim, sur *Brassica napus;* Duttlenheim, sur *Brassica rapa* (Sch.).

COCHLEARIAE Gyllh. — Vendenheim, en nombre sur les Crucifères (Sch.). — Forêt de Champenoux, en mai (Vouaux).

CONSTRICTUS Marsh. — Colmar (Sch.).

ERICAE Gyllh. — Laître-sous-Amance, en avril; La Malgrange; Jarny (Vouaux).

Poophagus Schoenh.

SISYMBRII F. — Bords de la Meurthe, aux environs de Blainville, en août (Vouaux).

Tapinotus Schoenh.

SELLATUS F. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, près de la digue du Rhin (Bod.); id., La Montagne-Verte (Sch.). — Etival, en mai; Jarny, ♂ ♀ (Vouaux).

Orobitis Mannh.

CYANEUS F. — Côte du Maennelstein, vers la maison forestière de Landsberg (Sch.). — Pompey, en mai; forêt de Champenoux, en juillet (Vouaux); Epinal (Host).

Coryssomerus Schoenh.

CAPUCINUS Beck. — Bosserville, bords de la Meurthe, en avril, ♂ ♀ (Vouaux).

Baris Germ.

MORIO Bohem. — Reichstett (Sch.).

ARTEMISIAE Herbst. — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux); Petite-Fontaine (de Brunier).

CUPRIROSTRIS F. — Epinal (Host).

LEPIDII Germ. — Brumath; Zeinheim (Sch.).

COERULESCENS Scop. — Laître-sous-Amance, dans des détritus, en avril (Vouaux).

V. CHLORIS F. — Idem (Vouaux); Epinal (Host).

CHLORIZANS Germ. — Achenheim; colline de Hangenbieten (Bod.). — Epinal (Host).

ANALIS Oliv. — Riquewihr (Bod.).

SCOLOPACEA Germ. — Dabo (Sch.).

Limnobaris Bedel

PUSIO Boh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

T-ALBUM L. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

CALANDRINI

Sphenophorus Schoenh.

ABBREVIATUS F. — Epinal (Host).

STRIATOPUNCTATUS Goeze. — Schlestadt, en juin, au pied des platanes, le long de la route vers Châtenois (Sch.).

TYCHIINI

Balaninus Germ.

VENOSUS Grav. — Nancy (Host).

TURBATUS Gyll. — Epinal (Host).

VILLOSUS F. — La Bouzule (Host).

RUBIDUS Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Forêt de Vitrimont, en septembre, un ex. (Vouaux).

Balanobius Jekel

CRUX F. — Moulin de Donnenbach (Kraencker); Saverne (Host).

SALICIVORUS Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

PYRRHOCERAS Marsh. — Schirmeck (Sch.).

Anthonomus Germ.

VARIANS Payk. — Forêt de Vitrimont, en septembre, un ind. (Vouaux).

PUBESCENS Payk. — Ottrott (Sch.).

CINCTUS Kollar. — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

RECTIROSTRIS L. — Ottrott (Bod.).

Acalyptus Schoenh.

CARPINI Herbst. — Barr; Klingenthal (Bod.).

V. ALPINUS Villa. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof (Sch.).

* V. SERICEUS Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

Ellescbus Steph.

SCANICUS Payk. — Strasbourg : au Wacken; Illkirch (Sch.).

BIPUNCTATUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Forêt de Vitrimont, en août (Vouaux).

Lignyodes Schoenh.

ENUCLEATOR Panz.— Strasbourg : Fuchs-am-Buckel, digue

du Rhin, près de La Robertsau, La Meinau (Sch.). — La Malgrange; forêt de Champenoux, en mai (Vouaux).

Tychius Germ.

5-PUNCTATUS L. — Laître-sous-Amance, en juin; La Malgrange (Vouaux).

FLAVICOLLIS Steph. — Laître-sous-Amance, en mai; Blainville (Vouaux); Nancy; forêt de Haye (Host).

CINNAMOMEUS Kiesw. — Rouffach : au Bollenberg, sur terrain calcaire (Sch.).

HAEMATOPUS Gyllh. — La Malgrange (Vouaux).

Miccotrogus Schoenh.

PICIROSTRIS F. — Ottrott (Bod.). — Champigneulles; Jarny; Laître-sous-Amance; La Malgrange (Vouaux).

Sibinia Germ.

(**Sibynes** Schoenh.)

SODALIS Germ. — Wissembourg (Sch.). — Plateau d'Amance, en septembre, un ind. (Vouaux).

PRIMITA Herbst. — Laître-sous-Amance, en septembre, un ind., plateau d'Amance, en juillet (Vouaux).

PHALERATA Stev. — Plateau d'Amance, en août, un ind. (Vouaux).

PELLUCENS Scop. — Saverne (Sch.).

VISCARIAE L. — Messein, en mai (Vouaux).

POTENTILLAE Germ. — Plateau d'Amance, en septembre (Vouaux).

Orchestes Illig.

ALNI v. SALTATOR Geoffr.— Willgottheim, com. juin (Sch.).

PILOSUS F. — Messein (Vouaux); forêt de Haye (Host).

SPARSUS F. — Forêt de Vitrimont, en juin (Vouaux).

JOTA F. — Idem; Laître-sous-Amance (Vouaux).

FAGI L. — Jarny; Champigneulles; Laître-sous-Amance (Vouaux).

TESTACEUS Müller. — Blainville (Host).

LONICERAE Herbst. — Strasbourg : au Wacken, dans un jardin (Sch.).

Tachyerges Schoenh.

SALICIS L. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Brumath; Vendenheim; Zeinheim; forêt de Gresswiller (Sch.); Ingwiller (Bod.).

FOLIORUM Müller. — Strasbourg : Jardin botanique (Sch.).

Rhamphus Clairv.

PULICARIUS Herbst. — Laître-sous-Amance, sur les buissons, en mai (Vouaux); Epinal (Host).

Mecinus Germ.

PYRASTER Herbst. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Hoenheim, fin mars; Plobsheim, mi-mai; Schlestadt, en décembre (Sch.); Ottrott (Bod.).

COLLARIS Germ. — Laître-sous-Amance, fin mai (Vouaux).

CIRCULATUS Marsh. — Rosheim, le long de la route menant à Boersch (Sch.).

Gymnetron Schoenh.

PASCUORUM Gyllh. — Plateau d'Amance, en août (Vouaux); forêt de Haye (Host).

LABILE Herbst. — Forêt de Haye (Host).

Rhinusa Steph.

ASELLUS Grav. — Riquewihr (Bod.). — Forêt de Haye (Host).

THAPSICOLA Germ. — Lac Blanc, deux ind. (Sch.).

NETUM Germ. — Laître-sous-Amance, sur une vitre d'un grenier, en juin (Vouaux).

BIPUSTULATUM Rossi. — Forêt de Haye (Host).

* v. FULIGINOSUM Rosenh. — Strasbourg : forêt du Neuhof, un ind. (Bod.).

ANTIRRHINI Payk. — Zeinheim; Plobsheim; Barr (Sch.).

Miarus Steph.

CAMPANULAE L. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

PLANTARUM Germ.— Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux); forêt de Haye (Host).

Cionus Clairv.

OLIVIERI Rosensch. — Forêt de Brumath, sur terrain sablonneux; Colmar : route de Winzenheim (Sch.).

HORTULANUS Geoffr. — Forêt de Champenoux, en août (Vouaux).

ALAUDA Herbst. — Ottrott (Bod.). — Forêt de Champenoux, en avril (Vouaux); forêt de Haye (Host).

Cleopus Steph.

PULCHELLUS Herbst. — Plateau d'Amance, en juillet; Messein (Vouaux).

Stereonychus Suffr.

FRAXINI Deg. — Strasbourg : La Robertsau, en forêt, près de la digue du Rhin (Bod.); id., La Meinau (Sch.). — Forêt de Champenoux, en juin (Vouaux).

V. FLAVOGUTTATUS Stierl. — Strasbourg : forêt du Neuhof et digue du Rhin, près de l'Altenheimer Hof (Bod.).

Nanophyes Schoenh.

HEMISPHAERICUS Oliv. — Forêts de Vitrimont et de Champenoux; Jarny (Vouaux).

* V. ULMI Germ. — Avec le type (Vouaux).

GLOBULUS Germ. — Laître-sous-Amance, un ind. (Vouaux).

GRACILIS Redtb. — Forêt de Vitrimont, un ind., commencement octobre (Vouaux).

MARMORATUS Goeze. — Messein; Champigneulles (Vouaux); Jarville (Host).

MAGDALIDINI

Magdalis Germ.

(**Magdalinus** Germ.)

RUFA Germ. — Saverne (Sch.).

VIOLACEA L. — Idem (Sch.).

FRONTALIS Gyll. — Côte du Mont Sainte-Odile (Sch.).

BARBICORNIS Latr. — Ottrott (Bod.).

RUFICORNIS L. — Forêt de Haye (Host).

ARMIGERA Geoffr. — Strasbourg : Jardin botanique (Burr). — Forêt de Haye (Host).

CERASI L. — Champigneulles (Host, Vouaux).

APIONINI

Apion Herbst

Oxystoma Dumér.

OCHROPUS Germ. — Achenheim (Bod.). — Forêt de Haye (Host).

CARDUORUM Kirby. — Strasbourg : La Montagne-Verte (Sch.). — Essey-les-Nancy (Host).

HOOKERI Kirby. — Strasbourg : Jardin botanique, en mai (Sch.).

Exapion Bed.

ULICIS Forst. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Blainville (Host).

DIFFICILE Herbst. — Côte du Scharrach (Sch.).

SEMIVITTATUM Gyllh. — Forêt de Haye, près des Quatre-Vents (Host).

URTICARIUM Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). Muttersholz (Kraencker). — Vandœuvre (Host).

ASTRAGALI Payk. — Zeinheim, un ind. (Sch.).

IMMUNE Kirby. — Barr (Sch.).

SIMILE Kirby. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — Bosserville (Host).

DISSIMILE Germ. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

ONONICOLA Bach. — Barr (Sch.).

VARIPES Germ. — Jarny (Vouaux); Vandœuvre (Host).

PLATALEA Germ. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

GRACILICOLLE Gyllh. — Idem (Sch.).

MELILOTI Kirby. — Champigneulles (Host).

LOTI Kirby. — Strasbourg : La Robertsau (Sch.).

VORAX Herbst. — Moulin de Donnenbach (Kraencker). — Champigneulles (Host).

SANGUINEUM Deg. — Herrenwald, près de Vendenheim, lisière sud (Weigand); Guebwiller, côte de l'Oberlinger, deux ind. (Sch.).

MALVAE F. — Ottrott (Bod.). — Houdemont (Host).

SIMUM Germ. — Saverne (Sch.).

Rhynchites Schneider

MANNERHEIMI Hummel. — Saverne (Sch.); tranchées près de la gare de Pont-d'Aspach, un ind., en juillet 1915 (de Brunier). — Blainville (Host).

COERULEOCEPHALUS Schall. — Wasselonne; Zeinheim; Trois-Epis (Sch.). — Blainville (Host).

OLIVACEUS Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en mai (Bod., Sch.); Herrenwald, près de Vendenheim (Sch.).

PUBESCENS F. — Hermolsheim, près de Mutzig; Châtenois; Kaysersberg (Sch.). — Forêt de Haye (Host).

TOMENTOSUS Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). — Bois de Bosserville (Host).

SERICEUS Herbst. — Saverne; Barr (Sch.). — Forêt de Haye (Host).

GERMANICUS Herbst. — Moulin de Donnenbach (Kraencker). — Epinal (Host).

PURPUREUS L. — Chavigny (Host).

CUPREUS L. — Côte du Mont Sainte-Odile (Bod.). — Forêt de Haye (Host).

AETHIOPS Bach. — Zeinheim, deux ind., sur *Prunus spinosa* (Sch.).

* VERSICOLOR Costa (*giganteus* Kryn. *rectirostris* Gyllh. ♀). — Chavigny, sur l'aubépine (Host).

AURATUS Scop. — Traenheim; Marlenheim; Plobsheim; Gresswiller; Schlestadt : en très grand nombre sous les écorces des platanes le long de la route vers Châtenois, fin décembre (Sch.). — Forêt de Haye; Bouxières-aux-Dames (Host).

BACHUS L. — Nancy (Host).

Attelabus L.

(**Cyphus** Thunb.)

NITENS Scop. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Soultzbad; côte du Scharrach (Sch.).

Apoderus L.

ERYTHROPTERUS Zschach. — Olima; Girancourt (Host).

NEMONYCHIDAE

Rhinomacer F.

(**Cimberis** Gozis)

ATTELABOIDES F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, un ind. (Bod.). — Epinal (Host).

ANTHRIBIDAE

TROPIDERINI

Tropideres Schoenh.

ALBIROSTRIS Herbst. — Epinal (Host); Froidefontaine, en criblant la mousse d'un chêne (de Brunier).

MARCHICUS Herbst. — Guebwiller, deux ind., sous un amas de feuilles mortes (Sch.).

NIVEIROSTRIS F. — Froidefontaine, en criblant la mousse d'un chêne (de Brunier).

SEPICOLA F. — Etueffont; Froidefontaine, dans les mêmes conditions que le précédent (de Brunier).

ANTHRIBINI

Platystomus Schneider

ALBINUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Saint-Nabor (Sch.).

Anthribus Geoffr.

NEBULOSUS Forst. — Strasbourg : La Montagne-Verte, au Wacken; Rothau (Sch.).

BRUCHIDAE

Bruchus L.

(**Mylabris** Geoffr.)

PALLIDICORNIS Bohem. (*sertata* Muls.). — Strasbourg : en grand nombre dans des sacs de lentilles (de provenance inconnue), empilés dans un magasin militaire de vivres, en octobre 1914 (Sch.).

* v. SIGNATICORNIS Gyllh. ♀. — Nancy (Host).

VICIAE Oliv. — Epinal (Host).

LOTI Payk. — Reichstett (Sch.).

Bruchidius Schilsky

BIMACULATUS Oliv. — Obernai (Bod.).

Pachymerus Latreille

* CHINENSIS L. — Strasbourg : dans différents magasins militaires de vivres, pendant la guerre (Bod.). — Nancy, dans les haricots nains (Host). — C'est une espèce d'origine asiatique, que le commerce avec les légumes secs disperse de plus en plus dans nos régions.

SCOLYTIDAE

HYLESININI

Hylastes Erichs.

(**Tomicus** Bedel)

ATER Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

CUNICULARIUS Er. — Ottrott (Bod.).

* V. BRUNNEUS (*ater* Duft.). — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

LINEARIS Er. — Strasbourg : au Neuhof, dans un jardin, sur *Pinus silvestris* (Sch.).

OPACUS Er. — Saverne : maison forestière de Haberacker (Sch.).

Dendroctonus Erichs.

MICANS Kugel. — Saverne (Bod.).

Polygraphus Erichs.

POLYGRAPHUS L. — Klingenthal (Bod.). — Epinal (Host).

Phloeosinus Chapuis

THUJAE Perris. — Schirmeck (Sch.).

Hylesinus Fabr.

CRENATUS F. — Barr (Sch.).

OLEIPERDA F. — Strasbourg : La Robertsau, dans un jardin, sur *Syringa persica* (Sch.).

VITTATUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, sur *Ulmus campestris*, en nombre (Sch.).

Phloeophthorus Moll.

RHODODACTYLUS Marsh. — Creux-d'Argent, entre le Lac Blanc et Orbey (Sch.).

SCOLYTINI

Scolytus Müller

(**Eccoptogaster** Herbst)

SCOLYTUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Ottrott (Bod.).

MALI Bechst. — Saverne, dans un jardin, sur un prunier (Sch.).

INTRICATUS Ratzb. — Col de La Schlucht, en juillet-août. — Capture assez difficile à expliquer, la région étant dépourvue de chênes. Les plus proches se trouvent à 7 kilomètres de distance (Sainte-Claire Deville).

MULTISTRIATUS Marsh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Herrenwald, près de Vendenheim (Sch.).

IPINI

Cryphalus Er.

PICEAE Ratzeb. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

Pityophthorus Eichh.

LICHTENSTEINI Ratzeb. — Lac Blanc (Sch.).

Pityogenes Bedel

CHALCOGRAPHUS L. — Côte du Donon (Sch.).

BIDENTATUS Herbst. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

QUADRIDENS Hartig. — Côte de l'Elsberg (Bod.).

Xylocleptes Ferrari

BISPINUS Duft. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

Ips Degeer

(**Tomicus** Latr., **Bostrychus** Fabr.)

SEXDENTATUS Boerner. — Saverne; Trois-Epis (Sch.); fo-

rêt de Geudertheim, fin janvier, sous une écorce de pin silvestre (Loppinet).

TYPOGRAPHUS L. — Environs du Lac Blanc (Sch.).

PROXIMUS Eichh. — Ottrott (Bod.).

LARICIS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.); Saverne ; environs du Brotschberg (Host).

CURVIDENS Germ. — Saverne : route du Haut-Barr, en très grand nombre, sur *Abies pectinata* (Sch.).

SPINIDENS Reitt. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

V. HETERODON Wachtl. — Col de La Schlucht (Sch.).

Taphrorychus Eichh.

BICOLOR Herbst. — Saint-Nabor (Bod.).

VILLIFRONS Dufour. — Schirmeck (Sch.).

Thamnurgus Eichh.

KALTENBACHI Bach. — Saverne; Mollkirch (Sch.).

Xyleborus Eichh.

CRYPTOGRAPHUS Ratzeb. — Grendelbruch (Sch.).

PFEILI Ratzeb. — Côte du Donon, deux ind., sur *Alnus* (Sch.).

SAXENSENI Ratzeb. — Strasbourg : La Robertsau, sur un pommier (Sch.).

Xyloterus Er.

DOMESTICUS L. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

SIGNATUS F. — Barr (Bod.).

LINEATUS Oliv. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof; Heiligenberg; côte du Schneeberg (Sch.).

PLATYPINI

Platypus Herbst

CYLINDRUS F. — Saint-Nabor (Bod.).

CYLINDRIFORMIS Reitt. — Côte de l'Elsberg (Bod.).

CERAMBYCIDAE

PRIONINI

Prionus Müller

CORIARIUS L. — Saverne : vallée de Baerenbach; Stambach, en août (Boehé); Ottersthal (Klein); forêt de Brumath (Sch.); Barr (Bod.).

Ergates Serv.

FABER L. — Niederbronn; Saverne; forêt de Haguenau; Herrenwald, près de Vendenheim; Ballbronn (Sch.). — Localisée et toujours rare, cette espèce disparaît de plus en plus de nos forêts.

Aegosoma Serville

SCABRICORNE Scop. — Strasbourg : au Wacken, deux ind., sur *Juglans nigra* (Noeldner); forêt de Brumath, lisière ouest, un ind.; Hermolsheim, sur une souche de hêtre, un ind. (Sch.). — Devient également d'année en année plus rare dans nos régions.

LEPTURINI

Rhagium Fabr., Ganglb.

v. UNIFASCIATUM Muls. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Sch.).

Rhamnusium Latreille

BICOLOR Schrnk. — Strasbourg : forêt du Neuhof; côte du Hohneck, vers le Fischboedle; Ferrette (Sch.).

v. GLAUCOPTERUM Schall. — Trois-Epis, deux ind., en juin (Sch.).

Oxymirus Mulsant

CURSOR L. — Strasbourg : forêt du Neuhof; forêt de Brumath; côte de l'Elsberg; Hermolsheim; Barr (Sch.).

Toxotus Serville

MERIDIANUS L. — Forme typique. Strasbourg : forêt du Neuhof, en nombre (Bod., Sch.); Zeinheim; côte du Kochersberg, en juillet (Sch.).

* v. RUFIVENTRIS Marsh. — Strasbourg : forêt du Neuhof, avec la forme typique (Bod., Sch.); Brumath; Vendenheim; Zeinheim (Sch.).

v. CHRYSOGASTER Schrank. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Sch.); id., forêt du Neuhof (Bod.).

v. RUFICRUS Scopol. (*laevis* Oliv.). — Strasbourg : Jardin botanique; forêt de La Robertsau (Sch.); id., forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Mutzig (Sch.).

v. CANTHARINUS Herbst (*geniculatus* Geoffr.). — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Sch.); id., forêt du Neuhof (Bod.); id., prés du Wacken; Zeinheim; Vendenheim (Sch.).

Anisorus Mulsant

QUERCUS Goetz. — Brumath (Bod.). — Epinal (Host).

v. DISPAR Panz. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.); Hohneck (Burr).

Acimerus Serville

SCHAEFFERI Laich. — Col de La Schlucht, en dessous de l'hôtel Altenberg; Hohneck (Sch.). — Signalé également de la Forêt-Noire.

Brachyta Fairmaire

(**Pachyta** Muls., **Evodinus** Leconte)

INTERROGATIONIS L. — Les indications de Wencker et de Silbermann *rare, sur les fleurs,* se rapportent probablement à la variété suivante. La forme typique n'a pas encore été signalée de nos régions (Cf. Suppl. I., p. 580).

* v. MARGINELLUS F. — Rouffach, trois ind., en juin, sur ombellifères (Sch.).

CLATHRATA F. — Les indications de Wencker *sur les fleurs, rare* et de Kampmann *Alsace* se rapportent sans doute à la variété suivante. La forme typique n'a pas encore été trouvée chez nous.

* v. BRUNNIPES Muls. — Cernay, deux ind. (Sch.).

Acmaeops Leconte

Dinoptera Mulsant

COLLARIS Laich. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Schlestadt, en juin (Sch.).

Gaurotes Leconte

(**Carilia** Mulsant)

VIRGINEA L. — Saint-Nabor; côte de l'Elsberg (Bod.); Barr; Schirmeck; côte du Schneeberg; Donon; Trois-Epis; Lac Blanc (Sch.); Hohneck (Sainte-Claire Deville, Sch.); Lac de Soultzern (Musée de Strasbourg). — Xonrupt; Lac de Lispach; Kichompré (de Brunier).

* V. VIDUA Muls. — Barr (Bod.).

Cortodera Mulsant

HUMERALIS Schall. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, près de la digue du Rhin (Sch.).

V. SUTURALIS F. — Trois-Epis (Sch.).

Pidonia Mulsant

LURIDA F. — Saint-Nabor; Rothau; col de La Schlucht (Sch.).

Leptura L.

Anoplodera Mulsant

SEXGUTTATA F. — Etueffont; vallée de la Madeleine (de Brunier).

Vadonia Mulsant

UNIPUNCTATA F. — Urmatt, deux ind., sur ombellifères (Sch.).

Leptura Mulsant

* HYBRIDA Rey. — Baerenkopf, un ind. (de Brunier); Hohneck, deux ind. (Sch.). — Très voisine de L. MACULICORNIS Deg., elle diffère de celle-ci par les extrémités des élytres et épipleures non enfumées.

MACULICORNIS Deg. — Saverne : côte du Brotschberg; Stambach, fin juin (Sch.). — Vallée de la Madeleine; Kichompré, sur les ombellifères, de mai en septembre (de Brunier).

SCUTELLATA F. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Ottrott (Bod.); forêt de Haguenau; Mutzig (Sch.).

* VIRENS L. — Barr, en juin; Rouffach (Sch.).

SANGUINOLENTA L. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Saverne : côte du Brotschberg et environs du Haut-Barr; Hohwald (Sch.).

Judolia Mulsant

CERAMBYCIFORMIS v. 10-PUNCTATA Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.); Saverne, en nombre sur les ombellifères (Klein, Boehé); Barr; Saint-Nabor; Hohwald; Schirmeck; Molsheim; Trois-Epis (Sch.).

v. 4-MACULATA Scop. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.); Saverne (Klein, Boehé, Sch.); Brumath; Mutzig; Molsheim; Schirmeck; Rothau; côte du Schneeberg; Grendelbruch; Dorlisheim; Thann (Sch.).

* v. 6-PUNCTATA Muls. — Strasbourg : forêt de La Robertsau et du Neuhof; Saverne; Haguenau; Mutzig;

Molsheim; Heiligenberg; Hohwald; Châtenois; Thann (Sch.).

ERRATICA Dalm. — Hohneck, com. juin, en nombre (Sch.).

Strangalia Serville

AURULENTA F. — Muttersholz (Kraencker).

QUADRIFASCIATA L. — Moulin de Donnenbach (Kraencker); Urmatt; Nideck; Hohwald (Sch.); Ottrott (Bod.). — Etueffont (de Brunier).

* v. INTERRUPTA Heyd. (*Lederi* Ganglb.). — Saverne; Urmatt; Grendelbruch (Sch.).

* MACULATA v. IMPUNCTATA Muls. — Moulin de Donnenbach (Burr).

* v. EXTERNEPUNCTATA Muls. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.); Ottrott (Bod.).

ARCUATA Panz. — Ottrott (Bod.).

AETHIOPS Poda. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Sch.); id., forêt du Neuhof; Achenheim; Ottrott (Bod.); Kriegsheim; Artolsheim (Sch.).

* v. LETZNERI Gabriel. — Einvaux, 4 juin 1914 (Vouaux).

SEPTEMPUNCTATA F. — Colmar, 4 ind. (Sch.).

NIGRA L. — Reichstett; Zeinheim; Kriegsheim (Sch.). — Etueffont (de Brunier).

Typocerus Leconte

ATTENUATA L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

Allosterna Mulsant

TABACICOLOR Deg. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Herrenwald, près de Vendenheim; Molsheim; Grendelbruch; Barr (Sch.); Ottrott (Bod.).

Grammoptera Serville, Fairmaire

RUFICORNIS F. — Zeinheim (Sch.); Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

VARIEGATA Germ. — Plobsheim, en juin (Sch.).

* v. NIGRESCENS Weise (*griseipes* Pic). — Einvaux, 4 juin 1914 (Vouaux).

CERAMBYCINI

Stenopterus Stephens

ATER L. — Barr, un ind. ♂ ; Hohneck, en juin (Sch.).

Cartallum Serville

EBULINUM L. — Deux ind. étiquetés *Vosges*, sans indication plus précise (*ex. coll.* Blind).

Obrium Curtis

CANTHARINUM L. — Etueffont, au vol (de Brunier).

BRUNNEUM F. — Oberbronn; Heiligenberg; Barr; Thann (Sch.).

Cerambyx Linné

CERDO L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); id., forêt de La Robertsau, le soir, sur le tronc d'un vieux chêne, en nombre (Klein); id., près de la digue du Rhin; forêt de Haguenau; Saverne; Schirmeck; Saint-Amarin (Sch.). — Cette espèce, toujours localisée, devient toujours plus rare dans nos régions.

MILES Bon. — Versant sud du Grand-Hohnack, deux ind. ♀ (Sch.).

Criocephalus Mulsant

RUSTICUS L. — Saverne; Stambach; maison forestière de Haberacker (Sch.). [1]

* POLONICUS Motsch (*ferus* Kr., *epibata Schioedte*). — Forêt de Haguenau, un ind., en juin (Sch.).

Asemum Eschscholtz

STRIATUM L. — Wangenbourg, côte du Schneeberg; maison forestière de Haberacker; Barr; Dorlisheim (Sch.). — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

V. AGRESTE F. — Heiligenberg; Barr (Sch.).

Tetropium Kirby

CASTANEUM L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Lingolsheim (Sch.). — Cleurie; Mandray; Tête de Behouille (de Brunier).

V. LURIDUM L. — Heiligenberg (Sch.). — Gérardmer, au Saut-des-Cuves (de Brunier).

V. AULICUM F. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, en mai; Heiligenberg; Rothau (Sch.).

V. FULCRATUM F. — Zeinheim (Sch.).

Phymatodes Mulsant

TESTACEUS L. — Ottrott, en grand nombre, dans une scierie (Bod.).

1 M. de Brunier m'a signalé une belle éclosion de C. RUSTICUS dans des abris boisés de Champagne, en face de Cornillet, en juillet 1916, *quelques jours après des émissions de gaz par nappe.*

v. variabilis L. — Strasbourg : Hôpital civil (Bod.); id., forêts de La Robertsau et du Neuhof; Zeinheim (Sch.).

v. fennicus F. — Epinal (Host).

v. praeustus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

fasciatus Villers. — Chaligny (Host).

Poecilium Fairm.

alni L. — Strasbourg : La Robertsau, dans un bûcher; Guebwiller (Sch.).

Pyrrhidium Fairm.

sanguineum L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); id., au Jardin botanique (Sch.).

Callidium Fabr.

violaceum L. — Saverne; Stambach; Dingsheim; Kleinfrankenheim; Haguenau (Sch.).

Hylotrupes Serville

bajulus v. lividus Muls. — Hoenheim, un ind., parmi une dizaine de types (Sch.).

Rhopalopus Mulsant

hungaricus Herbst. — Ottrott (Bod.); un ind. étiqueté *Vosges*, dans la collection de la Société industrielle de Mulhouse (com. de M. Klein).

Rosalia Serville

alpina L. — Hohneck (coll. de la Société industrielle de Mulhouse, com. de M. Klein).

Aromia Serville

MOSCHATA v. NIGRA Schilsky. — Reichstett, un ind.; Hohneck, un ind. (Sch.).

Purpuricenus Fischer

KAEHLERI L. — Sur la route, entre Truchtersheim et Kleinfrankenheim, fin juillet; Berstett, dans un jardin; Hangenbieten, en juin; Riquewihr (Sch.).

Plagionotus Mulsant

DETRITUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en grand nombre (Bod.); id., forêt de La Robertsau (Klein); Hoerdt; Barr (Sch.).

ARCUATUS v. REICHEI Thoms. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); La Robertsau; Brumath; Illkirch; Plobsheim (Sch.).

FLORALIS Pall. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

Xylotrechus Chevrolat

RUSTICUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Saverne; côte du Schneeberg (Sch.).

ARVICOLA Oliv. — Colline de Mutzig (Sch.).

Clytanthus Thoms.

HERBSTI Brahm. — Zeinheim, un ind., le 7 juin 1917 (Sch.).

GLABROMACULATUS Goeze. — Dingsheim, en juillet (Sch.).

SARTOR F. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Saverne; Dorlisheim (Sch.). — Dogneville (Host).

FIGURATUS Scop. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Klein); Saverne; Orbey (Sch.).

Anaglyptus Mulsant

Cyrtophorus Leconte

MYSTICUS L. — Saverne; Saint-Blaise (Sch.).

LAMIINI

Dorcadion Dalman, Ganglbauer

* FULIGINATOR v. QUADRILINEATUM Küst. — Un ind. étiqueté *Alsace,* dans la collection de la Société industrielle de Mulhouse (com. de M. Klein).

Monochamus Curtis

SUTOR L. — Côte du Brotschberg, près de Saverne (Sch.).

Acanthoderes Serville

CLAVIPES Schrank. — Col de La Schlucht, deux ind.; Schirmeck, un ind. (Sch.).

Acanthocinus Stephens

(**Astynomus** Stephens)

AEDILIS L. — Saverne (Host, Sch.); Hoerdt; Plobsheim; Eschau; Holzheim; Ostwald; Barr; Sainte-Odile; Schir-

meck; Trois-Epis (Sch.). — Roches de la Burre, en avril (Sainte-Claire Deville); Rambervillers (Host).

RETICULATUS Razumowsky. — Kichompré (de Brunier).

Liopus Serville

NEBULOSUS L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau; Mutzig; Ottrott; Barr (Sch.). — Bois de Fulleren (de Brunier).

Pogonochaerus Gemminger

HISPIDULUS Pill. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Urmatt (Sch.). — Petite-Fontaine, dans un poirier; Froidefontaine, en criblant des mousses de pommiers (de Brunier).

HISPIDUS L. — Strasbourg : La Montagne-Verte, en nombre, en juillet (Sch.).

Pityophilus Mulsant

FASCICULATUS Degeer. — Saverne : côte du Brotschberg, un ind., sous des branches mortes de *Pinus silvestris* (Sch.).

DECORATUS Fairm. — Saverne : route du Haut-Barr, un ind., dans les mêmes conditions (Sch.).

OVATUS Goeze. — Saverne, deux ind. (Sch.). — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

Haplocnemia Stephens

CURCULIONOIDES L. — Marlenheim, sous un fagot de bois mort; côte du Ballon de Guebwiller (Sch.).

NEBULOSA F. — Saverne : côte du Brotschberg (Sch.).

Niphona Mulsant

PICTICORNIS Muls. — Strasbourg : dans un chantier de

bois, 6 ind. (Sch.). — C'est une espèce méridionale importée chez nous avec du bois de construction.

Agapanthia Serville

DAHLI Richter. — Saverne; côte du Donon, vers Grandfontaine; Trois-Epis; Ballon de Guebwiller (Sch.).

VILLOSOVIRIDESCENS Deg. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Zeinheim; Grendelbruch; Schirmeck; côte du Donon (Sch.). — Vallée de la Madeleine (de Brunier).

Saperda Fabr.

Anaerea Muls.

CARCHARIAS L. — Strasbourg : un ind. dans la rue Herder, en juillet; forêts de Haguenau et de Brumath (Sch.); La Wanzenau; Auburc, en août (Boehé).

Compsidia Muls.

POPULNEA L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Boehé, Klein, Sch.), forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Saverne (Sch.).

Saperda in sp.

SCALARIS L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Boehé, Klein, Sch.), forêt du Neuhof (Bod.); Stambach (Sch.).

PERFORATA Pall. — Strasbourg : forêt de La Robertsau ♂ ♀ (Sch.).

Tetrops Stephens

PRAEUSTA L. — Strasbourg : dans un appartement, en mai; id., forêt du Neuhof (Sch.); Ottrott (Bod.).

Stenostola Muls.

FERREA Schrank. — Forêt de Brumath; Saverne; Zeinheim (Sch.).

NIGRIPES F. — Saint-Nabor (Bod.).

Phytoecia Muls.

Phytoecia in sp.

EPHIPPIUM F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

NIGRICORNIS F. — Idem (Sch.); Ingwiller (Bod.).

Opsilia Muls.

COERULESCENS Scop. — Strasbourg : digue du Rhin, près de La Robertsau (Klein); Saverne; Schirmeck (Sch.).

Oberea Muls.

LINEARIS L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Sch.).

ERYTHROCEPHALA Schrank. — Strasbourg : forêt du Neuhof, digue du Rhin, près de l'Altenheimerhof (Sch.).

CHRYSOMELIDAE

DONACIINI

Haemonia Latr.

(**Macroplea** Curtis)

APPENDICULATA Panz. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du Neuhof (Sch.).

Donacia Fabr.

CRASSIPES F. — Strasbourg : au Wacken; La Robertsau; Colmar (Sch.).

DENTATA Hoppe. — Brumath (Sch.); Achenheim (Bod.).

SPARGANII Ahr. — Munster (Sch.).

LIMBATA v. UNICOLOR Westh. — Saverne : bords de la Zorn (Host).

THALASSINA Germ. — Illkirch, bords de l'Ill (Sch.).

SIMPLEX v. SANGUINEA Westh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bód.).

v. PULCHERRIMA Hummel. — Achenheim, bords de la Bruche (Bod.).

CINEREA Herbst. — Schiltigheim (Sch.).

Plateumaris Thomson

DISCOLOR Panz. — Epinal (Host).

BRACCATA Scop. — Plobsheim, bords du Rhin-Tortu (Sch.).

CONSIMILIS Schrank.— Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Achenheim (Bod.).

CRIOCERINI

Lema Lacordaire

PUNCTICOLLIS Curt. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

SEPTENTRIONIS Weise. — Strasbourg : Fuchs-am-Buckel (Burr).

CLYTRINI

Labidostomis Lacordaire

TAXICORNIS F. — Hohneck (Sch.).

TRIDENTATA L. — Saverne; Schirmeck; Ribeauvillé (Sch.).

Lachnaea Lacordaire

SEXPUNCTATA Scop. — Saint-Nabor (Bod.). — Epinal (Host).

Gynandrophthalma Lacordaire

AURITA L. — Lisière sud du Herrenwald, près de Reichstett (Sch.).

Coptocephala Chevrolat

UNIFASCIATA Scop. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

CRYPTOCEPHALINI

Cryptocephalus Geoffroy

CORDIGER L. — Wolxheim; Artolsheim, en juin (Sch.).

OCTOPUNCTATUS Scop. — Strasbourg : forêt du Neuhof, fin mai (Sch.).

SIGNATUS Laich. — Idem (Bod.).

BIPUNCTATUS v. SANGUINOLENTUS Scop. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, La Montagne-Verte (Sch.).

Proctophysus Redtb.

PARVULUS Müll. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

* FLAVIPES v. OBSCURUS Ws. — Idem (Bod.).

FRONTALIS Marsh. — Saverne (Sch.).

BILINEATUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, digue du Rhin, près de l'Altenheimerhof (Sch.).

Pachybrachis Suffrian

SUTURALIS Ws. — Strasbourg : près de l'Ecluse du Rhin (Sch.).

HALICIENSIS Mill. — Strasbourg : au Wacken, en juin (Sch.).

HIPPOPHAËS Suffr. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

FIMBRIOLATUS Suffr. — Schirmeck (Sch.).

EUMOLPINI

Pachnephorus Redtenbacher

* TESSELLATUS Duft.— Strasbourg : forêt du Neuhof, près de la digue du Rhin, en amont de l'Altenheimerhof (Bod.).

CHRYSOMELINI

Gastroidea Hope

* V. PENNINA Ws. — Ballon de Guebwiller, deux ind. (Bod., Fleischer *det.*).

Timarcha Latreille

* PRATENSIS Duft. — Hoenheim, un ind. (Bod.); côte du Hohneck, vers la ferme de Schaeferthal, plusieurs ind., com. juin (Sch.).

Chrysomela Linné

RUFA Duft. — Epinal (Host).

LIMBATA F. — Guebwiller (Sch.).

BANKSI F. — Ballon de Guebwiller (Sch.).

GYPSOPHILAE Küst. — Bollwiller (Sch.).

MARGINATA L. — Mutzig, en nombre (Sch.).

ORICHALCEA Müll. — Allenweiler, en juillet (Sch.).

BRUNSVICENSIS Grav. — Châtenois; Eguisheim (Sch.). — Etueffont (de Brunier).

GEMINATA Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Saverne (Sch.).

HYPERICI Forst. — Strasbourg : forêt du Neuhof, Achenheim; Ottrott (Bod.); col de La Schlucht (Sch.).

DIDYMATA Scriba. — Clairlieu, com. juillet (Vouaux).

COERULANS Scriba. — Froidefontaine (de Brunier).

GRAMINIS L. — Schirmeck; Rothau (Sch.).— Epinal (Host).

V. FULGIDA F. — Saint-Nabor (Bod.).

MENTHASTRI Suffr. — Saverne (Host); Heiligenberg; côte du Donon; Schirmeck; Orbey; Eguisheim; col de La Schlucht (Sch.).

VARIANS V. CENTAURA Herbst. — Saverne; pavillon de La Galz, près des Trois-Epis (Sch.).

V. PRATENSIS Ws. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); forêt de La Robertsau; Saverne : route du Haut-Barr; Zeinheim (Sch.).

Orina Motchulsky, Chevrolat

(**Chrysochloa** Hope)

INTRICATA Germ. — Sommet du Hohneck (de Brunier).

ALPESTRIS Schumm. — Hohneck, chemin du Schiessrotried (Sch.).

* VITTIGERA Suffr. — Ballon de Guebwiller (Sch.).

CACALIAE Schrank. — Aubure; Lac Blanc; Hohneck (Sch.); Molkenrain (Gruardet). — Xonrupt; Le Rudlin (de Brunier).

V. COERULEOLINEATA Duft. — Hohneck; col de la Schlucht (Sch.).

V. SENECIONIS Schumm. — Hohneck (Sch.).

SPECIOSISSIMA Scop. — Hohneck, vers la ferme de Schaeferthal (Sch.).

Phytodecta Kirby

(**Gonioctena** Redtenbacher)

* VIMINALIS V. BICOLÒR Kraatz. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Illkirch (Sch.).

V. 10-PUNCTATA L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

V. CALCARATA F. — Idem (Bod.).

RUFIPES Deg. — Illkirch; Mutzig (Sch.).

LINNAEANA Schrank. — Plusieurs individus étiquetés *Vosges*, dans la collection de la Société industrielle de Mulhouse (com. de M. Klein).

V. DECASTIGMA Duft. — Saverne (Sch.).

Spartophila Chevrolat, Küster

(**Goniomena** Motsch.)

OLIVACEA Forst. — Achenheim (Bod.).
V. FLAVICANS F. — Schirmeck; Lac Blanc (Sch.).
V. LITURA F. — Saint-Nabor (Sch.).
5-PUNCTATA F. — Ottrott (Bod.).
V. UNICOLOR Ws. — Hohneck (Sch.).
V. NIGRIVENTRIS Penecke. — Saint-Nabor (Bod.).
V. FLAVICOLLIS Duft. — Ottrott, avec le type (Bod.).

Phyllodecta Kirby

VITELLINAE V. BREVICOLLIS Motsch. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).
LATICOLLIS Suffr. — Strasbourg : Jardin botanique; forêt de Brumath, en mai (Sch.).

Hydrothassa Thomson

(**Eremosis** Gozis)

AUCTA V. GLABRA Herbst. — Strasbourg : La Robertsau (Sch.).
MARGINELLA L. — Barr (Sch.).

Prasocuris Latreille

JUNCI Brahm. — Strasbourg : forêt du Neuhof, aux bords des eaux mortes du Rhin (Bod.).

Sclerophaedon Weise

CARNIOLICUS Germ. — Lac Blanc; Hohneck, versant vers le Schiessrotried, com. juin (Sch.).

Phaedon Latreille

PYRITOSUS Rossi. — Hurtigheim (Sch.).

* ARMORACIAE v. CONCINNUS Steph. — Dieuze, dans les prés des terrains salifères (Sch.).

Melasoma Stephens

(**Lina** Redtenbacher)

CUPREA F. — Entre-deux-Eaux (de Brunier).

LAPPONICA L. — Grendelbruch; Schirmeck (Sch.).

V. BULGHARENSIS F. — Schirmeck (Sch.).

20-PUNCTATA Scop. — Strasbourg : La Robertsau, près de la digue du Rhin, sur *Salix,* fin avril; forêt du Rhin, mi-juin (Klein); Mutzig (Sch.). — Tranchées du bois de Michelbach (de Brunier).

* V. PUSTULATA Ws. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

COLLARIS L. — Forêt de Brumath; bois de Donnenheim (Sch.).

SALICETI Ws. — Plobsheim, sur les saules, en juin (Sch.).

GALERUCINI

Luperus Geoffroy

XANTHOPUS Schrank. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Bod.); Zeinheim, deux ind., sur un saule (Sch.).

SAXONICUS Gmel. — Strasbourg : digue du Rhin, près de La Robertsau (Sch.).

Galerucella Crotsch

Pyrrhalta Joann. (**Trirrhabda** auct.)

VIBURNI Payk. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, sur *Viburnum lantana* (Klein).

Galerucella i. spec.

CALMARIENSIS v. LYTHRI Gyllh. — Mutzig (Sch.).

PUSILLA Duft. — Molsheim, en juin (Sch.).

TENELLA L. — Blainville (Host).

Galeruca Geoffroy

(**Adimonia** Laicharting)

LATICOLLIS Sahlb. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en fauchant, 4 ind. (Sch.).

Haptoscelis Weise

MELANOCEPHALA Ponza. — Strasbourg : forêt du Neuhof, près de la digue du Rhin (Sch.).

Crepidodera Chevrolat

MELANOSTOMA Redtb. — Ballon de Guebwiller, deux ind. sur *Calluna vulgaris* (Sch.).

Arrhenocoela Foudras

LINEATA Rossi. — Lac Blanc (Sch.).

Chalcoides Foudras

(**Foudrasia** Gozis)

AUREA Geoffr. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Zeinheim, sur terrain calcaire (Sch.).

Hypnophila Foudras

IMPUNCTICOLLIS All. — Ottrott (Bod.); col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville).

Chaetocnema Stephens

(**Plectroscelis** Redtb.)

SEMICOERULEA Koch. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

V. SALICETI Ws. — Achenheim (Bod.).

SAHLBERGI V. CYANESCENS Ws. — Ottrott (Bod.).

Psylliodes Latreille

THLASPIS Foudr. — Achenheim (Bod.). — Clairlieu, en juin (Vouaux).

CUPREA Koch. — Environs de La Malgrange (Vouaux).

DULCAMARAE Koch. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

HYOSCYAMI L. — Schirmeck (Sch.).

V. CHALCOMERA Illig. — Rosheim (Sch.).

Haltica Geoffroy

(**Graptodera** Chevrolat)

QUERCETORUM Foudr. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.); Saint-Nabor (Bod.).

SALICETI Ws. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

ERICETI All. — Schirmeck, un ind., sur *Calluna vulgaris* (Sch.).

Hermaeophaga Foudras

CICATRIX Illig. — Barr (Sch.).

Phyllotreta Foudras

OCHRIPES Curt. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

VITTULA Redtb. — Jarny, en mai (Vouaux).

AEREA All. — Champigneulles (Vouaux).

CRASSICORNIS All. — La Malgrange, fin avril (Vouaux).

CONSOBRINA Curt. — Muttersholz (Kraencker).

PROCERA Redtb. — Saint-Nabor, un ind. (Bod.).

Aphthona Chevrolat

ABDOMINALIS Duft. — Urmatt, deux ind. (Sch.).

LUTESCENS Gyll. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.).

VENUSTULA Kutsch. — Idem (Sch.).

METALLICA Ws. — Laître-sous-Amance (Vouaux).

OVATA Foudr. — Col de La Schlucht, environs de l'hôtel Altenberg (Sch.).

ATROVIRENS Foerst. — Riquewihr (Bod.).

Longitarsus Latreille

(**Thyamis** Steph., Bedel, **Teinodactyla** Chevr.)

LINNAEI Duft. — Saint-Nabor (Bod.).

* ANCHUSAE v. PUNCTATISSIMUS Foudr. — Clairlieu, en juillet (Vouaux).

ABSINTHII Kutsch. — Klingenthal, un ind. (Bod.).

NIGER Koch. — Strasbourg : forêt du Rhin, près de l'Ochsenwœrth (Bod.).

NIGERRIMUS Gyllh. — Côte de l'Elsberg (Bod.).

HOLSATICUS L. — Hohwald (Sch.).

QUADRIGUTTATUS Pont. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

BRUNNEUS Duft. — Sainte-Marie-aux-Mines (Sch.).

RUBELLUS Foudr. — Ottrott, un ind. (Bod.).

STRAGULATUS Foudr. — Jarny, en juin (Vouaux).

NASTURTII F. — Strasbourg : Fuchs-am-Buckel, forêt du Neuhof (Bod.). — La Malgrange, en mai (Vouaux).

SUTURELLUS Duft. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en très grand nombre; Ottrott, idem (Bod.). — Clairlieu, com. juillet (Vouaux).

CURTUS All. — Barr, route du Maennelstein (Bod.).

MELANOCEPHALUS Deg. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); id., La Montagne-Verte (Sch.); Willgottheim, com. mars (Sch.).

V. ATRICEPS Kutsch. — Strasbourg, avec le type (Bod.).

PULMONARIAE Ws. — Ottrott (Bod.).

EXOLETUS L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, un ind. (Bod.); id., bords du Rhin-Tortu (Sch.).

LATERALIS Illig. — Soultzmatt (Sch.).

* V. PATRUELIS All. — Idem, deux ind., avec la forme typique (Sch.); Lac Blanc, en juillet (Rihn).

LYCOPI Foudr. — Ottrott (Bod.).

* MENTHAE Bed. — Jarny, fin août (Vouaux).

PRATENSIS V. MEDICAGINIS All. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

BALLOTAE Marsh. — Strasbourg : La Meinau (Sch.); Saint-Nabor (Bod.).

AERUGINOSUS Foudr. — Barr (Bod.).

RUBIGINOSUS Foudr. — Artolsheim, sur *Medicago sativa* (Sch.).

MEMBRANACEUS Foudr.— Côte du Mont Sainte-Odile (Bod.).

Dibolia Latreille

FEMORALIS Redtb. — Orbey (Sch.).

CRYPTOCEPHALA Koch. — Boersch (Bod.).

Apteropeda Chevrolat

SPLENDIDA All. — Côte de l'Elsberg, un ind. (Bod.).

Sphaeroderma Stephens

TESTACEUM F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en nombre (Bod.).

HISPINI

Hispa Linné

TESTACEA L. — Saverne, une dizaine d'ind. sur *Helianthemum* (Sch.).

CASSIDINI

Cassida Linné

Odontionycha Weise

CANALICULATA Laich. — Zeinheim, com. mai; Schirmeck (Sch.).

Cassida i. spec.

MURRAEA L. — Saverne (Host); Hoerdt (Sch.).
v. IMMACULATA Desbr. — Hangenbieten, un ind. (Sch.).
CHLORIS Suffr. — Ottrott (Bod.).

Chelysida Fairmaire

(**Cassidula** Weise)

VITTATA Villers. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Saverne (Sch.).
HEMISPHAERICA Herbst. — Zeinheim; Brumath; Dingsheim; Plobsheim (Sch.). — Froidefontaine (de Brunier).

COCCINELLIDAE

PHYTHOPHAGAE

Epilachna Redtenbacher

ARGUS Geoffr. — Strasbourg : La Ganzau, dans un jardin; Mutzig; Andlau (Sch.).

Subcoccinella Huber, Guérin

(**Lasia** Muls., Ganglb.)

24-PUNCTATA v. 4-NOTATA F. — Saverne (Host).
v. ZONATA Heyd. — Reichstett, deux ind. (Sch.).
v. HAEMORRHOIDALIS F. — Blainville (Host).

Cynegetis Redtenbacher

IMPUNCTATA L. — Avolsheim; Gresswiller; Zeinheim; Rhinau (Sch.).

APHIDIPHAGAE

HIPPODAMIINI

Hippodamia Mulsant

TREDECIMPUNCTATA v. SPISSA Ws. — Strasbourg : La Robertsau; Hangenbieten (Sch.).

7- MACULATA Deg. — Côte de l'Elsberg (Bod.).

Adonia Mulsant

VARIEGATA v. 5- MACULATA F. — Nancy (Host).

v. CONSTELLATA Laich. — Strasbourg; Kronenbourg; La Ganzau, forêt du Neuhof; Reichstett; Stutzheim; Kinzheim (Sch.).

v. CARPINI Geoffr. — Strasbourg : sur les remparts, La Robertsau, au Wacken; Saverne; Brumath; Hoerdt; Zeinheim; Schirmeck (Sch.).

v. NEGLECTA Ws. — Strasbourg : La Robertsau, forêt du Neuhof; Plobsheim (Sch.). — Blainville (Host).

Semiadalia Crotsch

NOTATA Laich. — Schirmeck; Hohneck, en juin (Sch.).

11- NOTATA Schneid. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Gresswiller (Sch.).

* v. 9- PUNCTATA Fourcr. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

COCCINELLINI

Adalia Mulsant

OBLITERATA v. LIVIDA Deg. — Trois-Epis (Sch.).

v. FENESTRATA Ws. — Strasbourg : à l'Orangerie (Sch.).

* BIPUNCTATA v. BIOCULATA Say. — Strasbourg : Jardin botanique; Illkirch; Fessenheim (Sch.).

v. ANNULATA L. — Strasbourg : au Wacken (Sch.).

v. PANTHERINA L. — Strasbourg : à l'Orangerie (Sch.); id., forêt du Neuhof (Bod.).

v. CONJUNCTA Schneider. — Strasbourg : Jardin botanique, au Wacken (Sch.).

v. 4-MACULATA Scop. — Idem, forêt du Neuhof (Bod.).

* v. SESQUIPUNCTATA Haw. (*Stephensi* Ws.). — Strasbourg : dans un terrain vague, près du couvent du Bon-Pasteur (Sch.). — Nancy (Host).

* MARGINATA Rossi. — Nancy (Host).

Coccinella Linné

11-PUNCTATA L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.).

v. TRIPUNCTATA L. — Idem, avec le type (Bod.).

v. VICINA Ws. — Nancy (Host).

HIEROGLYPHICA v. AREATA Panz. — Epinal (Host).

10-PUNCTATA v. LUTEA Rossi. — Strasbourg : à l'Orangerie (Sch.).

v. 13-MACULATA Forst. — Epinal (Host).

v. HUMERALIS Schall. — Strasbourg : La Robertsau (Sch.); id., forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Brumath (Sch.).

* v. PELLUCIDA Ws. — Epinal (Host).

Harmonia Mulsant

4- PUNCTATA v. SORDIDA Ws. — Ottrott (Bod.).

v. 16- PUNCTATA F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en nombre (Sch.).

LYNCEA Oliv. — Forêt de Haye (Host).

Micraspis Redtenbacher

* 16- PUNCTATA v. COMMUNIS Ws. — Zeinheim, un ind., com. mai (Sch.).

Sospita Mulsant

20- GUTTATA v. TIGRINA L. — Muttersholz (Kraencker). [1]

Propylaea Mulsant

14- PUNCTATA v. TETRAGONATA Laich. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

v. CONGLOMERATA F. (*suturalis* Ws.). — Strasbourg : La Montagne-Verte; Saverne; Brumath; Mutzig (Sch.).

v. 12- PUSTULATA Pont. — Saint-Nabor (Bod.).

v. FIMBRIATA Sulz. (*perlata* Ws.). — Strasbourg : Ile des Epis; Ottrott (Bod.); côte du Mont Sainte-Odile (Sch.). — Nancy (Host).

* v. LEOPARDINA Ws. — Hoenheim; Rouffach (Sch.). — Nancy (Host).

1 A propos de cette coccinelle, M. H. du Buysson m'écrit le 3 déc 1918 : « ... de plus, sur les bords de la Sioule, j'ai observé que S. 20- GUTTATA, à cette époque (en automne !), désertait complètement les aulnes pour venir sur les aubépines avec le SCYMNUS ARCUATUS. Cela demande une modification à la note que vous avez donné sur S. 20- GUTTATA, selon mes observations nombreuses précédentes ». — (Cf. Fasc. IX, p. 760.)

CHILOCORINI

Platynaspis Redtenbacher

LUTEORUBRA Goeze. — Strasbourg : forêt du Neuhof, digue du Rhin; Zeinheim (Sch.).

HYPERASPINI

Hyperaspis Redtenbacher

CAMPESTRIS v. CONCOLOR Suffr. — Klingenthal (Bod.).

RHIZOBIINI

Rhizobius Stephens

LITURA F. — Moulin de Donnenbach (Kraencker).

CHRYSOMELOIDES Herbst. — Ottrott (Bod.). — C'est une espèce valable et non une variété de R. LITURA (Cf. Fasc. IX, p. 766).

SCYMNINI

Scymnus Kugelann

Pullus Mulsant

IMPEXUS Muls. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

CELER Ws. — Saint-Nabor, un ind. (Bod.).

Scymnus Mulsant

RUFIPES F. — Riquewihr (Bod.).

Nephus Mulsant

BIPUNCTATUS Kugelann. — Saverne (Host).

REDTENBACHERI Muls. — Côte du Mont Sainte-Odile (Bod.).

ERRATA

au Supplément (FASC. X.) du Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges.

page 9, ligne 12, *au lieu de :* Labouge, *lire* : Lapouge.
— 14, — 8, — Weterh., *lire* : Waterh.
— 26, — 1, — **Olistopus** *lire :* **Olisthopus**
— 26, — 14, *au lieu de :* * FLAVICORNIS, *lire :* * V. FLAVICORNIS.
— 35, — 20, *au lieu de :* PARALLELLUS, *lire :* PARALLELUS.
— 40, — 17, *au lieu de :* GASSIDEUS, *lire:* CASSIDEUS.
— 59, — 18, — * SMARAGDINUS, *lire :* * V. SMARAGDINUS.
— 61, — 20, ALUTACEUS etc. *est à placer après* V. REGULARIS etc.
— 63, — 20, *au lieu de : bolitophagum, lire : boletophagum.*
— 70, — 11, *au lieu de : latus, lire : latens.*
— 80, — 32, — Wat., *lire :* Woll.
— 89, — 8, — * NIGROCOERULEUS, *lire* * V. NIGROCOERULEUS. *Cette variété est à placer après* * OCHRIPENNIS.
— 99, — 9, *au lieu de :* Eaugrosse, *lire :* Eaugronne.
— 103, — 7, *au lieu de :* COERULEUS, *lire :* COERULESCENS.
— 103, — 23, *à biffer : circularis* Grav.

page 112, ligne 28, *au lieu de :* ANGUSTATUS, *lire :* ANGUSTATA.

— 121, — 15, *au lieu de :* Pin, *lire :* Pain.

— 142, — 26, — FILUM, *lire :* * FILUM.

— 144, — 6, — Helwig, *lire :* Hellwig.

— 149, — 4, GRACILIS *est à placer après* * v. AZUREUS.

— 159, — 1, *au lieu de :* FRISCHII, *lire :* FRISCHI.

— 162, — 1, — AUROTAPUNCTATUS, *lire :* AURATOPUNCTATUS.

— 165, — 3, *au lieu de :* HETAERINI, *lire :* HETAERIINI.

— 165, — 8, *au lieu de :* SAPRINI, *lire :* SAPRININI.

— 167, — 14, *au lieu de :* Strasbourg [1], *lire :* Strasbourg. [2]

— 171, — 1, *au lieu de:* **Eupleurus**, *lire:* **Eupleurus** Muls.

— 180, — 14, *au lieu de :* Andersh., *lire :* Andersch.

— 184, — 6, — AFFINIS, *lire :* AFFINIS F.

— 191, — 23, — AERUGINOSUS, *lire :* v. AERUGINOSUS.

— 197, — 16, *au lieu de :* NOCTILUGA, *lire :* NOCTILUCA.

— 197, — 24, *biffer le signe :* *.

— 217, — 5, *ajouter le signe :* * *devant* CONFUSUM.

— 220, — 4, *au lieu de :* MINOR, *lire :* MINOR Walk.

— 222, — 18, * v. FUSCA *est à placer après* SUBTESTACEA.

— 229, — 26, *au lieu de :* ERYTHROPUS, *lire :* ERYTHROPUS Boh.

— 231, — 5, *ajouter le signe :* * *devant* v. DENSATUS.

— 241, — 10, *intercaler :* **Cossonus** Clairv. *entre les lignes* 9 *et* 10.

page 243, ligne 5, *au lieu de :* GRAMINOUS, *lire :* GRAMINEUS.

— 243, — 25, *au lieu de :* Gyllh., *lire :* Bris.

— 245, — 12, — Jeckel, *lire :* Jekel.

— 259, — 8, — Serv., Latr., *lire :* Serv., Fairmaire.

— 267, — 6, *au lieu de :* 16- PUNCTATA, *lire :* v. 16-PUNCTATA.

TABLE DES MATIÈRES.

Abdera 163
Ablattaria 91
Acalles 187
Acalyptus 195
Acanthocinus 218
Acanthoderes 218
Acimerus 210
Aclypea 91
Acmaeops 211
Acritus 119
Acrossus 125
Acrotona 51
Actobius 65
Acupalpus 31
Adalia 236
Adelocera 137
Aderces 96
Adimonia 229
Adonia 235
Adrastus 143
Aegosoma 208
Aëtophorus 35
Agabus 38
Agapanthia 220
Agathidium 93
Agonum 23
Agrilus 135
Agriotes 142
Airaphilus 111
Aleochara 48
Alianta 52
Allosterna 213
Aloconota 53
Alophus 180
Alphitobius 160
Alphitophagus 159
Amalus 190
Amara 27
Amauronyx 83
Amidorus 124
Amphimallon 128
Amphotis 106
Anaerea 220
Anaglyptus 218
Anaspis 165
Anchomenus 22
Anchus 22
Anisoplia 129
Anisorus 210
Anisotoma 93
Anobium 154
Anodus 64
Anomala 129
Anoncodes 168
Anoplodera 211
Anoplus 185
Anoxia 128
Anthaxia 133
Anthicus 168
Anthobium 80

Anthocomus 149
Anthonomus 195
Anthophagus 78
Anthrenus 113
Anthribus 203
Aphodius Ill. 122
Aphodius Muls. 123
Aphthona 231
Apion 200
Apoderus 202
Apteropeda 233
Argutor 25
Aromia 217
Arrhenocoela 229
Asclera 169
Asemum 215
Asida 158
Astenus 72
Astynomus 218
Atemeles 49
Atheta 52
Athous 140
Atomaria 101
Attelabus 202
Autalia 54
Autocarabus 13
Axinotarsus 149

Badister 32
Bagous 186
Balaninus 194
Balanobius 195
Balius 32
Baptolinus 68
Baris 193
Barynotus 176
Barypithes 174
Batenus 23
Batrisodes 83
Batrisus 83
Bembidion 18
Betarmon 138
Biralus 125
Bisnius 64
Blaps 158
Blechrus 34
Bledius 76
Blethisa 17
Blitophaga 90
Bolbocerus 126
Bolitobius 59
Bolitochara 54
Bostrychus 206
Bothriopterus 25
Brachida 56
Brachonyx 185
Brachyderes 174
Brachynus 36
Brachypterus 105
Brachysomus 174
Brachyta 210
Brachytemnus 187
Bracteon 18
Bradycellus 31
Bradytus 28
Broscus 18
Bruchidius 204
Bruchus 203
Bryaxis 84
Brychius 36
Bryocharis 60
Buprestis 133

Byrrhus L. 114
Bythinus 84

Calambus 142
Callidium 216
Calosirus 141
Calosoma 11
Campylus 143
Cantharis 146
Carabus L. 11
Carabus Thoms. 13
Carcinops 117
Cardiophorus 139
Carilia 211
Carpophilus 105
Cartallum 214
Cartodere 103
Cassida 233
Cassidula 234
Catops 88
Celia 28
Cephennium 86
Cerambyx 214
Cercyon 42
Cerylon 110
Cetonia 130
Ceuthorrhynchidius 190
Ceuthorrhynchus 190
Chaetocarabus 12
Chaetocnema 230
Chalcoides 230
Chalcophora 132
Charopus 148
Chelysida 234
Chilopora 47
Chlaenius 33
Chlorodrosus 172
Chlorophanus 176
Choleva 88
Chromoderus 177
Chrysanthia 169
Chrysobothrys 134
Chrysocarabus 12
Chrysochloa 226
Chrysomela 225
Cicindela 11
Cimberis 202
Cionus 198
Cis 157
Clambus 94
Claviger 85
Cleonus 177
Cleopus 199
Clerus 151
Clibanarius 24
Clivina 17
Clytanthus 217
Cnemidotus 37
Coccinella 236
Codiosoma 186
Coelambus 37
Coeliodes 188
Coenocara 156
Colenis 92
Colobopterus 122
Colon 89
Colpodota 50
Compsidia 220
Coniatus 183
Coninomus 103
Conopalpus 164
Conurus 59

Copelatus 40
Copris 121
Coprophilus 78
Coptocephala 223
Coraebus 135
Corticaria 103
Corticarina 104
Corticeus 160
Cortodera 211
Corylophus 95
Corymbites 141
Corynetes 151
Coryssomerus 193
Cossonus 186
Coxelus 109
Crepidodera 229
Criocephalus 215
Cryphalus 206
Cryptarcha 108
Cryptobium 69
Cryptocephalus 223
Cryptophagus 100
Cryptopleurum 42
Cryptorrhynchus 187
Cteniopus 161
Ctesias 113
Cybocephalus 94
Cychramus 107
Cychrus 15
Cyllodes 107
Cymatopterus 40
Cymindis 35
Cynegetis 235
Cyphocleonus 178
Cyphon 144
Cyphus 202
Cyrtanaspis 165
Cyrtophorus 218
Cyrtoscydmus 86
Cyrtusa 93
Cytilus 114

Dacne 98
Danaeaea 151
Dapalinus 182
Dascillus 144
Dasycerus 102
Dasytes 150
Deleaster 78
Demetrias 35
Dendroctonus 204
Dendrophagus 110
Dendrophilus 117
Denticollis 143
Dermestes 112
Deronectes 37
Diachromus 31
Dianous 72
Diaperis 159
Dibolia 233
Dichirotrichus 31
Dictyopterus 145
Dinaraea 51
Dinarda 49
Dinoptera 211
Diodesma 109
Dolicaon 69
Domene 71
Donacia 222
Donus 182
Dorcadion 218
Dorcatoma 156

Dorcus 120
Dorytomus 184
Dromius 34
Dryophilus 153
Dryops Oliv. 45
Dyschirius 17
Dytiscus 40

Ebaeus 149
Eccoptogaster 205
Echocerus 160
Ectinus 142
Elaphrus 17
Elater 137
Eledona 158
Elleschus 195
Elmis 44
Emphanes 19
Emphylus 100
Emus 62
Encephalus 55
Endomychus 99
Engis 98
Enneartbron 157
Ephistemus 102
Epicometis 130
Epilachna 234
Epipolaeus 181
Episernus 154
Epuraea 105
Eremotes 187
Eremosis 227
Ergates 208
Eriglenus 39
Erirrhinomorphus 182
Erirrhinus 184
Ernobius 155
Eryx 161
Esolus 45
Euaesthetus 75
Eubria 145
Eucnemis 137
Euconnus 87
Eudipnus 173
Eulissus 68
Euplectus 83
Eupleurus 123
Europhilus 24
Euryporus 60
Euryusa 54
Eusomus 174
Eusphalerum 80
Eustolus 173
Euthia 86
Evodinus 210
Exapion 200

Falagria 54
Foudrasia 230

Gabrius 66
Galeruca 229
Galerucella 229
Gastrallus 154
Gastroidea 224
Gaurodytes 38
Gauropterus 68
Gaurotes 211
Gefyrobius 67
Georyssus 44
Geostiba 51
Geotrupes 127

Gibbium 152
Glischrochilus 108
Gnathoncus 118
Gnorimus 132
Gonodera 161
Gonioctena 226
Goniomena 227
Grammoptera 214
Graptodera 230
Graptodytes 38
Gronops 179
Grypidius 183
Gymnetron 198
Gymnopleurus 121
Gymnusa 57
Gynandrophthalma 223
Gyrinus 41
Gyrophaena 55

Haemonia 221
Haliplus 36
Hallomenus 162
Haltica 230
Hapalogluta 150
Haplocnemia 219
Haplocnemus 156
Haploderus 76
Haplotarsus 141
Haptoderus 26
Haptoscelis 229
Harmonia 237
Harpalus 30
Hedobia 155
Helmis 45
Helodes 144
Helophorus 43
Helops 160
Hemistenus 74
Henicopus 149
Heptaulacus 125
Hermaeophaga 231
Hetaerius 118
Heterhelus 105
Heterocerus 46
Heterothops 61
Hippodamia 235
Hispa 233
Hister 116
Hololepta 115
Homalisus 145
Homaloplia 129
Homalota 55
Homoeusa 49
Hoplia 130
Hydraena 43
Hydrobius 41
Hydrochus 43
Hydronomus 186
Hydroporus 38
Hydrothassa 227
Hygronoma 56
Hygrotus 37
Hylastes 204
Hylecoetus 152
Hylesinus 205
Hylobius 180
Hylotrupes 216
Hypebaeus 148
Hypera 181
Hyperaspis 238
Hyphydrus 37
Hypnoidus 139

Hypnophila 230
Hypocyptus 57
Hypodasytes 150
Hypoganus 142
Hypophloeus 160
Hypostenus 74
Hypulus 163

Idiochroma 24
Ilybius 39
Ilyobates 47
Ips 206
Ischnoglossa 47
Ischnopoda 53
Isomira 161

Judolia 212

Labidostomis 223
Laccobius 41
Lachnaea 223
Laemophloeus 110
Lagria 162
Lampra 133
Lamprinodes 59
Lamprinus 59
Lareynia 45
Larinus 178
Lasia 234
Lasiotrechus 21
Latelmis 44
Lathridius 102
Lathrimaeum 79
Lathrobium 69
Lebia 33
Leiosomus 181
Leïstotrophus 63
Leïstus 16
Lema 222
Leptacinus 68
Leptinus 87
Leptura L. 211
Leptura Muls. 212
Lepturoides 143
Leptusa 55
Lepyrus 180
Lesteva 78
Leucocelis 130
Leucosomus 178
Licinus 32
Lignyodes 195
Limnebius 41
Limnichus 115
Limnius 44
Limnobaris 194
Limobius 183
Limodromus 22
Limonius 140
Lina 228
Liodes 92
Liogluta 51
Liophloeus 175
Liopterus 40
Liopus 219
Liosoma 181
Liotrichus 141
Liparus 180
Lissodema 170
Litodactylus 190
Lixus 178
Lomechusa 49
Longitarsus 231

Lopha 19
Lorocera 17
Lucanus 119
Ludius 141
Luperus 228
Lycoperdina 99
Lyctus 156
Lymexylon 152
Lytta 167

Macroplea 221
Magdalis 199
Magdalinus 199
Malachius 149
Malthinus 147
Malthodellus 147
Malthodes 147
Mecaspis 177
Mecinus 197
Medon 70
Megarthrus 81
Megodontus 12
Melandrya 163
Melanophthalma 104
Melanotus 139
Melasoma 228
Meleus 180
Meligethes 107
Melinopterus 124
Meloë 166
Melolontha 128
Menas 35
Mesocarabus 12
Mesostenus 74
Metabletus 34
Metacantharis 146
Metadasytes 150
Metallina 18
Metallites 172
Miarus 198
Miccotrogus 196
Micrambe 101
Micraspis 237
Microcara 144
Microlestes 34
Micropeplus 82
Micrurula 106
Minyops 179
Molops 27
Molytes 180
Monochamus 218
Monotoma 111
Mordella 164
Mordellistena 165
Mycetina 99
Mycetochara 161
Mycetophagus 105
Mycetoporus 60
Mylabris 203
Myllaena 56
Myrmedonia 50
Myrmetes 119

Nacerdes 168
Nanophyes 199
Nargus 88
Nassipa 166
Nebria 16
Necrophilus 92
Necrophorus 89
Nemadus 89
Neobium 155

Nephus 238
Neuglenes 96
Neuraphes 86
Nialus 124
Nicobium 155
Nimbius 124
Niphona 219
Niptus 152
Nitidula 106
Nosodendron 113
Notaris 184
Notiophilus 16
Nototheeta 50
Notoxus 168
Nudobius 68

Oberea 221
Obrium 214
Ocalea 46
Ochina 155
Ochthebius 43
Octotemnus 158
Ocypus 63
Ocys 21
Ocyusa 47
Odacantha 35
Odontaeus 126
Odontionycha 233
Oeceoptoma 90
Oedemera 169
Olibrus 98
Olisthopus 24
Olophrum 79
Omalium 80
Omophlus 162
Omophron 16
Omosita 106
Oniticellus 122
Ontholestes 63
Onthophagus 121
Onthophilus 119
Oodes 32
Ophonus 29
Opilo 151
Opsilia 221
Orchesia 162
Orchestes 197
Orina 226
Orites 26
Orobitis 193
Orochares 79
Orodalus 124
Oromus 125
Orthoperus 95
Oryctes 127
Osmoderma 132
Osphya 164
Othius 67
Otiorrhynchus 170
Oxymirus 209
Oxypoda 48
Oxyporus 75
Oxystoma 200
Oxytelus 76

Pachnephorus 224
Pachybrachis 224
Pachychirus 169
Pachymerus 204
Pachyrrhinus 189
Pachyta 210
Pachytychius 184

Paederus 72
Palorus 159
Panagaeus 33
Paramecosoma 100
Parastenus 74
Pardileus 30
Parnus 45
Paromalus 117
Parophonus 30
Patrobus 22
Pedilophorus 115
Peryphus 19
Phaedon 228
Phaenops 133
Phalacrus 97
Pheletes 140
Philochthus 20
Philonthus 65
Philydrus 41
Phloeocharis 82
Phloeophthorus 205
Phloeopora 47
Phloeosinus 205
Phloeostichus 110
Phosphaenus 145
Phosphuga 91
Phyla 20
Phyllodecta 227
Phyllopertha 129
Phyllotreta 231
Phymatodes 215
Phytobius 189
Phytodecta 226
Phytoecia 221
Phytonomidius 183
Phytonomus 182
Pidonia 211
Pissodes 183
Pityogenes 206
Pityophagus 108
Pityophilus 219
Pityophthorus 206
Placusa 55
Plagiographus 177
Plagionotus 217
Platambus 39
Plateumaris 222
Platus 30
Platycerus 120
Platydema 159
Platynaspis 238
Platynus 22
Platypus 208
Platysma 25
Platysoma 115
Platystethus 75
Platystomus 203
Platytarsus 174
Plectroscelis 230
Plegaderus 119
Pleurophorus 125
Plinthus 181
Podabrus 146
Poecilium 216
Poecilonota 133
Poecilus 24
Pogonochaerus 219
Pogonus 22
Polydrosus 172
Polygraphus 205
Polyphylla 128
Poophagus 193

Porcinolus 114
Potosia 131
Prasocuris 227
Princidium 18
Prionus 208
Prionychus 161
Procrustes 11
Proctophysus 224
Prognatha 82
Pronomaea 56
Propylea 237
Proteinus 81
Psammodes 126
Psammoecus 111
Pselaphus 85
Pseudocechenus 12
Pseudocleonus 177
Pseudostyphlus 186
Pseudotasgius 64
Pseudotriphyllus 104
Psylliodes 230
Ptenidium 95
Pterostichus 25
Ptilinus 155
Ptilium 96
Ptinus 153
Ptomaphagus 89
Ptosima 134
Pullus 238
Purpuricenus 217
Pygidia 147
Pyrochroa 167
Pyropterus 145
Pyrrhalta 229
Pyrrhidium 216
Pytho 169

Quedius 61

Rabigus 67
Rhagium 209
Rhagonycha 147
Rhamnusium 209
Rhamphus 197
Rhantus 40
Rhinocyllus 179
Rhinomacer 202
Rhinoncus 189
Rhinosimus 170
Rhinusa 198
Rhipiphorus 166
Rhizobius 238
Rhizophagus 108
Rhizotrogus 127
Rhopalodontus 157
Rhopalopus 216
Rhynchites 201
Rhyncolus 187
Rhytidosoma 189
Riolus 45
Rosalia 216

Saperda 220
Saprinus 118
Scaphidema 159
Scaphidium 97
Scaphosoma 97
Sciodrepa 88
Scirtes 144
Sclerophaedon 227
Scolytus 205
Scopaeus 71
Scraptia 164

Scybalicus 29
Scydmaenus 87
Scymnus 238
Scytodytes 39
Selatosomus 142
Semiadalia 235
Serica 128
Sericoderus 95
Sericus 143
Serropalpus 163
Siagonium 82
Sibinia 196
Sibynes 196
Silpha 91
Silvanus 111
Simplocaria 115
Sinodendron 120
Sipalia 51
Sisyphus 121
Sitaris 167
Sitodrepa 154
Sitona 175
Smicronyx 185
Sospita 237
Spartophila 227
Sphaerites 92
Sphaeroderma 233
Sphenophorus 194
Sphindus 156
Staphylinus 63
Stasiodis 173
Steatoderus 142
Stenelmis 45
Stenolophus 31
Stenopterus 214
Stenostola 221
Stenus 72
Stereonychus 199
Steropus 26
Stichoglossa 47
Stilbus 98
Stilicus 71
Stomis 27
Strangalia 213
Strophosomus 174
Subcoccinella 234
Synaptus 143
Syncalypta 114
Synechostictus 19
Syntomium 78
Synuchus 24
Systenocerus 120

Tachinus 57
Tachyerges 197
Tachyporus 58
Tachypus 18
Tachys 21
Tachyusa 54
Taenosoma 77
Tanymecus 176
Tanysphyrus 185
Taphria 24
Taphrorychus 207
Tapinotus 193
Tasgius 64
Teinodactyla 231
Telmatophilus 99
Tenebroides 109
Teretrius 119
Tesnus 73
Testedium 18

Tetratoma 162
Tetropium 215
Tetrops 220
Teuchestes 123
Thamiaraea 50
Thamnurgus 207
Thanatophilus 90
Thectura 51
Thinobius 77
Thinodromus 77
Thyamis 231
Timarcha 225
Tomicus Bedel 204
Tomicus Latr. 206
Tomoxia 164
Toxotus 209
Trachodes 181
Trachyphloeus 175
Trachys 136
Trechoblemus 21
Trechus 21
Trepanes 20
Triaena 27
Tribolium 159
Trichius 132
Trichodes 151
Trichophya 57
Trichopteryx 96
Triginellus 182
Trimium 82
Triplax 99
Trirrhabda 229
Troglops 148
Trogoderma 112
Trogophloeus 77
Tropideres 202
Tropiphorus 179
Troscus 136
Trox 126
Trypocopris 127
Trypopitys 155
Tychius 196
Tychus 85
Tylodrusus 173
Typocerus 213
Tyrus 85

Uleiota 111

Vadonia 212
Valgus 131
Volinus 123

Xantholinus 69
Xyleborus 207
Xyletinus 156
Xylocleptes 206
Xylodrepa 91
Xylodromus 79
Xyloterus 207
Xylotrechus 217

Zabrus 29
Zilora 163
Zyras 50

TABLE DES MATIÈRES

DU

BULLETIN

Pages

PARTIE ADMINISTRATIVE . . . . . III-XXXIII

Deuxième Supplément au Catalogue des Coléoptères de la Chaine des Vosges par Paul SCHERDLIN 1-255

Buchdruckerei Decker
Colmar · Gegründet 1679

SMITHSONIAN INSTITUTION THE LIBRARY

QL
591
F8S3
V.11
Ent.

Scherdlin, Paul.
Catalogue des
Coléoptères de la Chaîne
des Vosges, et des regions
limitrophes.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00356752 6
nhent QL591.F8S3
fasc. Catalogue des Coléoptères de la